MMS Health Recovery Guidebook

FIRST EDITION

Jim Humble *with Cari Lloyd*

Guia de recuperação de saúde

Jim Humble
com Cari Lloyd

Guia de recuperação de saúde MMS, primeira
edição por Jim Humble com Cari Lloyd

Copyright O 2016 de James V. Humble e Cart Lloyd

Todos os direitosreservado. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou por qualquer sistema de recuperação de armazenamento de informações sem a permissão por escrito dos autores. A única exceção é por um revisor que deseja citar breves passagens em conexão com uma revisão escrita para inclusão em uma revista, jornal, site, blog ou transmissão. Páginas únicas podem ser copiadas com crédito dado aos Autores ou em ocasiões várias páginas podem ser copiadas quando necessário para ajudar alguém a recuperar sua saúde. No caso de morte (ou desaparecimento por mais de 2 meses) de qualquer um dos autores listados acima, os direitos autorais são integralmente atribuídos ao autor remanescente. Em caso de morte ou desaparecimento de ambos os autores mencionados acima, este livro torna-se de domínio público e qualquer pessoa pode copiá-lo, vendê-lo ou distribuí-lo. Em caso de morte de ambos os autores, toda pessoa que se beneficiou do MMS é incentivada a comprar, imprimir, copiar ou, de alguma forma, compartilhar o máximo possível de cópias com amigos e familiares.

Publicado por
James V.
Humblesales@jhbo
oks.org

ISBN: 978-0-9908945-2-0

Primeiro Pré-LançamentoEdição: Lançada Junho de 2015, segunda edição de pré-lançamento: lançado em outubro de 2015, primeiroEdição: Lançado em outubro de 2016

Email de

contato:healthrecovery@jimhumble.isDesign da

capa: Rev. Paul Beaudry e Cindy Stoe

Ao longo deste livro, você encontrará links para sites externos que fornecemos para sua conveniência, o leitor. Embora tenhamos feito todos os esforços para garantir que esses links sejam precisos, atualizados e relevantes, não podemos nos responsabilizar por páginas mantidas por fornecedores externos.

Isenção de responsabilidade

Este livro está repleto de protocolos alternativos de restauração da saúde que funcionam a partir da experiência de esforços populares de muitas pessoas em todo o mundo. Cada indivíduo é pessoalmente responsável por sua decisão sobre seou como eles usam essas informações,ou se procuram ou não atendimento médico oficialmente reconhecido.

As informações contidas neste livro são estritamente para fins educacionais. Nada neste livro se destina a constituir aconselhamento ou tratamento médico. Os protocolos aqui descritos não foram aprovados pela US Food and Drug Administration (FDA). Esses protocolos são sacramentos oficiais da Igreja de Saúde e Cura de Genesis II. Se você deseja aplicar os protocolos deste livro, assume total responsabilidade por suas ações. Você aceita 100% de responsabilidade por todo e qualquer uso feito de qualquer informaçãoaqui em.

Não reivindicamos, nem acreditamos que esses protocolos curem o corpo humano. MMS1, MMS2, argila bentonita (argila asteca), Aloe vera, DMSO e todas as outras substâncias, naturais ou não, mencionadas neste livro não curam ou curam de forma alguma o corpo. MMS1 e MMS2 são oxidantes que destroem venenos e matam patógenos por oxidação. MMS2 (ácido hipocloroso [HOCl]) é o mesmo oxidante que o sistema imunológico humano gera para destruir patógenos e venenos. A argila bentonita não é um agente de cura, mas absorve venenos e patógenos e os leva para fora do corpo. Uma grande quantidade de evidências fornecidas pelo FDA, EPA e várias corporações industriais provam cientificamente que o MMS1 (dióxido de cloro) mata e / ou oxida patógenos e venenos em alimentos, sistemas públicos de água, hospitais e até mesmo matadouros.

Anedóticoevidências de milhares de pessoas em todo o mundo indicam que há pouca dúvida de que MMS1 (dióxido de cloro) e MMS2 (quando dissolvido em água se transforma em ácido hipocloroso [HOCl]) têm a capacidade de matar patógenos e / ou oxidar venenos no corpo humano. Os regulamentos do FDA especificam que o dióxido de cloro (MMS1) e o hipoclorito de cálcio (MMS2) podem ser usados em sistemas públicos de água para purificar a água, e o dióxido de cloro é usado para conservar vegetais, carnes e outros itens. O corpo humano em média é 60-75% de água. É lógico que o dióxido de cloro também pode purificar a água no corpo da mesma forma que o faz nos sistemas públicos de

água. Uma vez que a água do corpo é purificada,e muitos dos venenos oxidados, o corpo pode então curar o corpo.

Não reivindicamos que haja prova médica / de que qualquer uma das afirmações aqui contidas seja verdadeira. No entanto, há provas para aqueles que se preocupam em verificar e observar. Aludimos ao fato de que temos evidências anedóticas. Algumas pessoas cientificamente treinadas tentam desconsiderar nossas evidências porque são anedóticas. Quando alguém tem três ou quatro confirmações anedóticas que podem ser um tanto questionáveis, mas quando as confirmações estão na casa dos milhares, então isso muda o caso. Até a ciência nos diz que, quando há milhares de casos de evidências anedóticas, é provável que hajaalguma correlação.

Aceitar ou não o MMS é uma decisão pessoal. Cada indivíduo deve assumir a responsabilidade por sua própria saúde. O autor e co-autor deste livro não pode assumir responsabilidade por quaisquer efeitos adversos de desintoxicação ou consequências resultantes do uso de quaisquer sugestões ou procedimentos descritos nestas páginas. Leia a seção “É seguro levar MMS?”na página 12.

Novamente, nenhum dos protocolos neste livro pode curar uma doença, ou mesmo fornecer nutrientes para a cura do corpo humano. Não reivindicamos a cura desses métodos. Os protocolos descritos neste livro matarão a maioria dos patógenos de doenças e oxidarão vários venenos no corpo humano. Então o corpoé capaz de se curar.

This book is dedicated to the
many suffering people
of this world.
Jim Humble

Agradecimentos

Seriam necessárias páginas para expressar de forma adequada minha sincera gratidão a todos aqueles que contribuíram de alguma forma para este livro - conscientemente ou não. Não consigo encontrar palavras para expressar suficientemente o apreço, mas estou confiante de que cada um, de alguma forma, em algum momento - receberá o troco. Quando você faz a coisa certa, sempre volta para você. No entanto, aqui quero destacar alguns indivíduos que merecem especialobrigado.

Milhares e milhares de pessoas necessitando de recuperação de saúde têm sido a força motriz para mim documentar esta informação. Quero agradecer especialmente a todos aqueles que participaram de seminários e contribuíram com sua energia e zelo, seu conhecimento e experiência e sua inspiração. O mesmo agradecimento vai para as inúmeras pessoas que escreveram de todo o mundo com perguntas, sugestões, ideias e testemunhos sobre o que vocês fizeram e funcionou - minha mais profunda gratidão e apreço a todos vocês.

Muito obrigado a todos aqueles que leram este livro em seu estado de pré-lançamento e ofereceram sugestões. E um agradecimento muito especial aoa Principalrevisores: DD, Jan Wallace, Daniel Bender, Manuel Catedra e CharloNe Lackney. Obrigado por todas as horas dedicadas - cada um de vocês fez contribuições importantes emsua própria maneira única.

Obrigado, Arcebispo Mark Grenon e filhos, Bispo Jon Grenon, e Bispo Joe Grenon, por contribuir com o Procedimento de Vacina para superar os ferimentos causados pela vacina. Além disso, Mark também desenvolveu o protocolo de patch MMSl / DMSO. Você continuará a ser recompensado por seu tremendo trabalho nesta vida enas próximas.

Obrigado, Andreas Ludwig Kalcker, por compartilhar comigo a ideia de começar com dosagem muito baixa de MMS, o que me inspirou a desenvolver o Procedimento de Inicialização - um marco parao uso de MMS.

Clara Beltrones criou o que agora é conhecido como Protocolo 6 e 6 para salvar sua filha de uma operação de apêndice que pode ter tirado sua vida. Depois dessa experiência, ela usou os protocolos 6 e 6 para ajudar centenas de pessoas. Agora, outras pessoas ao redor do mundo ajudaram milhares usando os Protocolos 6 e 6. Obrigado, Clara, por esta contribuição importante.

Um agradecimento especial ao Rev. Paul Beaudry e Cindy Stoe que criaram a capa do livro. E um agradecimento especial emra a Cindy Stoe por apresentar este livro da maneira que queríamos. Espero que não tenhamos sido muito exigentes com você, Cindy. Obrigado por suportarconosco.

Obrigado, Daniel Bender e Rev. Paul Beaudry, por contribuir com as ilustrações deste livro.

Nem é preciso dizer obrigado ao MaG, por todo o seu suporte técnico.

E, por fim, mas certamente não menos importante, um grande "zikomo kwambiri" para Cari, minha coautora, que trabalhou o que pareceram horas intermináveis, certificando-se de que o que eu queria dizer fosse apresentadode forma clara e compreensível, sem falar no manuseio de todos os ajustes e tantos detalhes! Sem Cari, este livro serianão ser. Eu sou confiante,que daqui a alguns anos, milhares de pessoas terão recuperado a saúde - e isso não aconteceram sem Cari.

Conteúdo

Agradecimentos.VII.....

Preface.XV.....

Introdução.1.....

Capítulo 1 - ObtendoIniciado.5.....
Definição deTermos.5.....
Esclarecimento. 8.....
Medições usadas nesteLivro 10.....
CDS eCDH.12.....
É seguro tomarNIMS? .12.....
O que é MMSNot.13.....
EntendimentoOxidação 15.....
Oxidação.....
MMS eOxidação.....
Outro OxidanteProcessos.16.....
Uma palavra para oWise.17.....

Capítulo 2 - SegurançaPrecauções.....
MMS/MMS1.....19
Hipoclorito de cálcio(MMS2) 22.....
Ácido cítrico / ácido clorídrico(HCI) 24.....
DMSO.25.....

Capítulo 3 - MMS BásicoEssentials.29.....
AtivandoMMS30.....
Ácido cítrico e ácido clorídrico(HCI) 30.....
Alguma AlternativaAcids.30.....
Misturando uma dose básica de MMS1,32.....
De hora em horaDoses.34.....
A Importância do ConsecutivoDoses.35.....
Dose diáriaBottle.36.....
Como testar se o seu MMS éBom. 39.....
Água - o líquido ideal para misturar um MMS1Dose.41. .
Fator Gosto / Como Melhorar o Gosto deMMS142.....
MMS1 em uma cápsula (para eliminarSabor) 45.....
Simplesmente não consigo aguentar mais umDrop47....

StoingMMS.49.....
Sentindo-meDoente.50.....
Mulheres grávidas eMMS.50.....
Comer enquanto está no MMSProtocolos.51.....
Suplementos Nutricionais e oHRP.53.....
Alimentos e bebidas a evitar quando em um MMSProtocolo. 56.....

Capítulo 4 -**DMSO (DimetilSulfóxido) 57.....**
DMSO - onde e o queCompre. 58.....
DMSO — AlergiaTeste.59.....
DMSO-SegurançaPrecauções.60.....

Capítulo 5 -**Plano de recuperação da saúde(HRP) 63...**
Background.63.....
Como issoWorks.63.....
Visão geral dos principais protocolos / recuperação de saúdePlan.64.....
FundamentalPrinciples.66.....
Linha de protocolos para a recuperação da saúdePlan.67 .....
Exceção aoRegra 70.....
Protocolos de suporte - quando adicionarThem.71.....
Uma palavra sobre o adicionalProtocolos.72.....
Dois procedimentos fundamentais de saúde para oHRP.73.....
1. Escovar o seuTeeth.73.....
2. Pulverizando SeuSkin.76.....

Capítulo 6 - A ChaveProtocolos.79.....
IniciandoProcedimento.79.....
Três regras de ouro deMMS.83.....
Protocolo1000,84.....
Protocolo 1000Plus87.....
Protocolo2.000,89.....
Protocolo3.000,95.....
Molde / FungoProtocolo.99.....
Um importanteRevisão 108.....

Capítulo 7 - HRP e váriosDoenças. 109.....
Usando o HRP em conjunto com o apoio
Protocolos para váriosDoenças. 109.....
Doenças geralmente consideradasIncurável.117.....

Capítulo 8 – RealidadeCheck.121.....
Razões pelas quais você pode não ter completado
Sucesso comNINIS.121.....
Capítulo 9 - ApoioProtocolos.....131
TosseProtocolo.....131
Patch MMS1 / DMSOProtocolo.135.....
Olhos, orelhas e narizProtocolos. 136.....
Banho e pedilúvioProtocolo. 142.....
EnemaProtocolo.....148
Colonics.152.....
BabacaProtocolo.....153
Bolsa MMSProtocolo.....156
PulmãoProtocolo (oCopa) 159.....
Capítulo 10 - Erva indiana - A recuperação definitiva da saúdeEsforço.....165
PretoSalve.....167
Capítulo 11 - AdicionalProtocolos. 169.....
Protocolo 6 e6,169.....
Protocolo4000.....171
VacinaProcedimento.....173
MaláriaProtocolo.....180
Ações adicionais / malária básicaDose. 182.....
Ajudando as massas a se recuperaremMalaria.185...
Microscópio. 185.....
Cepas mais fracas do que as normais deMalaria.187
.....
Mais fortes do que as tensões normais deMalária.. .188
Filhos (eMalária).....189
Chikungunya e DengueFebre. 190.....
EbolaVírus.195.....
ZikaVírus.195.....
NlosquitoMordidas.....196

NIRSAProtocolo.....196
Manutenção diária MMS1Dose.200.....
Capítulo 12 - EmergênciaProtocolos 203.....
Picadas eBites.204.....

EscorpiãoStings.204.....
Abelha e VespaStings.206.....
AranhaBites.210.....
Brown ReclusеProtocolo.....213
Viúva NegraProtocolo.....217
Mordida de cobraProtocolo.....219
Intoxicação alimentarProtocolo.....223
ConcussãoProtocolo.....226
DerrameProtocolo.....227
Ataque cardíacoProtocolo.....236
QueimarProtocolo.....245
Uma semana de vidaProtocolo. 249.....
Capítulo 13 -**Ajustando Dosagens paraCrianças.255**
Uma palavra paraPais.255.....
Procedimento de partida paraCrianças.....256
Protocolo 1000 paraCrianças.....257
Protocolo 1000 Plus paraCrianças.....258
Protocolo 2000 paraCrianças.....258
Protocolo 3000 paraCrianças.....260
Protocolo 6 e 6 paraCrianças.....264
Protocolo de patch para bebês, crianças e pessoas com ConfidencialSkin.265.....
Dose de manutenção diária MMS1 paraFilhos. 266.
Como ajustar protocolos de suporte e adicionais paraFilhos. 266.....
Capítulo 14 - Informações adicionais importantes. 273
Biofilmes. 273.....
MMS2—Detalhes.....274
Testando se os líquidos são compatíveis comMMS1.278
.....

DorRelevo. 282.....
Parasitas. 283.....
Purificação de Água comMMS.287.....
Capítulo 15 -Animals.289.....
Protocolo paraAnimals.289.....
Dosagem oral de MMS para umAnimal.290.....

Em geralMal-estar / doença.....291
Se o animal foiDiagnosed.292.....
Calculando Doses / Explicação deMedições. 293...
Protocolo para animaisLenda.....294
Explicação de como usar a dosagemCharts.294....
Protocolo AnimalDosagemCharts.300.....
BebendoÁgua.....302
Protocolo3000.....303
Eyes.303.....
Boca eDentes.....303
PeleProblemas.....304
Apoiante e AdicionalProtocolos.....304
Três regras de ouro paraAnimais.....305

nn)nNNN

X

Prefácio

Desde a descoberta da Solução Mineral Mestre,a consciência do MMS continuou a crescerem todo o mundo. Há uma razão muito simplespara isso: A saúde é um bem muito precioso. Mais e mais pessoas descobriram que o MMS pode ser a solução para um problema de saúde quando nada mais funcionou. Portanto, não deve ser surpresa que as pessoasque tiveram resultados positivos com MMS compartilham seushistória com seus amigos, família e até mesmo publicamente. Então, a palavra se espalha.

Infelizmente, há muita desinformação circulando sobre o MMS. Grande parte dessa desinformação vem de histórias falsas da mídia que atacam intencionalmente o MMS e outros métodos alternativos.

No entanto, parte da desinformação também vem de pessoas bem-intencionadas. Isso se deve a muitas razõesfilhos. Algumas pessoas zelosas espalham a palavra, masfalhou em se manter atualizado com os novos desenvolvimentos;portanto, eles estão transmitindo informações desatualizadas.Outras autoridades em potencial e / ou proprietários de sites, por uma série de razões, simplesmente erram.Seja qual for o caso, há confusão suficientepercepção e desinformação em torno do MMS, e este tem sido um fator importante que me levou aescreva este livro.

Escrevi este guia para ajudá-lo a aprender os fundamentos da Master Mineral Solution (MMS) emde forma clara e concisa. Pela minha experiência, eusaiba que a maioria das pessoas pode se recuperar de qualquer doença que exista. Você não precisa saber todospequenos detalhes de como funciona o MMS. Você só precisa sabercomo usar o MMS.

Este livro, por exemplo, não vai te ensinar como fazer seu próprio MMS. É um pouco como eletricidade. Não é necessário conhecer toda a ciência por trás de como a eletricidade funciona para se beneficiar dela. Tudo que você precisa saber é como ligar um interruptor e voilà - a luz se acende. Meu objetivo é fazer com que seja o mais simples possível para qualquer recém-chegado ao MMS assumir a responsabilidade por sua própria recuperação de saúde - ficar bem e permanecer bem.

É muito importante entender um princípio básicoaqui e isto é: simples não é sinônimo de lánão há trabalho envolvido. Eu quero ser bem claro, se você forbuscando a recuperação da saúde, vai levar algum esforçode sua parte. Vai exigir que você tomeresponsabilidade por sua própria saúde e bem-estar.

Considere que se você estiver com a saúde debilitada, provavelmentelevou um bom tempo, talvez anos, para chegar lá. Então você pode esperar que demore algum tempo, e com certezaalgum trabalho, para voltar a ter uma boa saúde. eu às vezesdizem que o MMS pode ser como uma bala mágica, mas você tempara tomar as medidas necessárias para colocar a bala em movimento. Se você assim escolher o caminho da boa saúde, ummercadoria mais preciosa, posso garantir quefiz tudo ao meu alcance para torná-lo não sem trabalho, mas o mais simples possível. Se você forsiga o Plano de Recuperação da Saúde conforme descrito nestespáginas, você pode começar a seguir as instruções neste livro hoje e possivelmente começar a ver resultados positivoslogo amanhã.

Além disso, gostaria de salientar que embora, como o título deste livro sugere, este guia aborda a

recuperação da saúde, per se, também é muito sobreprevenção e, consequentemente, longevidade. Aqui estáalgum alimento para o pensamento: no mundo de hoje, somosbombardeado com toxinas diariamente - há

dificilmente escapando dele. Eu descobri sobre oanos que muitas pessoas pensam que estão indo "bem" emo departamento de saúde. Eles não têm doenças graves,e nenhuma condição de saúde particular para se preocuparsobre o que eles estão cientes. No entanto, uma vez que incluem o MMS em sua rotina diária, eles muitas vezes descobrem umnovo mundo de bem-estar! Eles descobrem que começampara perder peso indesejado, e seu pensamento im-prova - névoa do cérebro, pensamento confuso,e baixa concentraçãotração sair pela porta. Eles têm mais energia, sua pele fica mais lisa e ganha um novo toque especial*brilho.*Em suma, uma variedade de pequenos problemas incômodoseles aprenderam a conviver por anos desaparecem. Emboraeles estavam “OK” em termos de saúde, agora estão melhorando! Como você vê, o MMS oferece muito maisdo que se possa pensar.

Se você tiver um problema sério de saúde de um tipo ououtro do qual você precisa se recuperar - este livro épara você. Da mesma forma, se sua saúde parece estar "OK", masvocê gostaria, no entanto, de alcançar uma saúde ótima, este livro também é para você. Qualquer categoriavocê se encaixa - uma rotina básica contínua com MMS pode ajudá-lo a ficar saudável, mantê-lo saudável e ajudá-lo a manter uma boa qualidade de vida em seus anos dourados.

Para aqueles de vocês que já entendem,de MMS, você pode notar que existem algumas variações do que já foi publicado em meus outros livros ou postado em meus sites. Este volume contém as informações mais recentes e atualizadas, bem como um pouco de informações completamente novas. Inclui imagens recentesprovas que eu e outros determinamosatravés do uso contínuo de MMS em todo o mundo. O mundo do MMS é vasto e estamos aprendendo coisas novas o tempo todo, então

certifique-se de verificar periodicamenteatualizações em:

http://www.mmswiki.is

Se você deseja fazer seu próprio MMS em vez de encomendá-lo on-line, adquira meu livro*The NasterSolução Mineral do 3º Milênio*que contém instruções detalhadas e muitas outras fórmulas. Use este livro, entretanto, para suas instruções de recuperação de saúde.

Para sua saúde,

JimHumilde

Introdução

Este livro é um guia para o uso de uma das soluções minerais mais saudáveis do nosso tempo, a Master Mineral Solution, ou MMS para shol. É produzido quando uma substância simples retirada de um mineral é misturada com qualquer um dos vários ácidos de qualidade alimentar. Quando os dois são combinados adequadamente, ele produz MMS1, que é altamente eletivo na eliminação de toxinas e patógenos de doenças no corpo.

Em 1996, durante uma expedição de mineração de ouro no sulAmérica, descobri que o MMS restaurou rapidamente a saúde devítimas da malária. Desde então, provou querestaure a saúde do paciente ou plena saúde para centenas de milhares de pessoas que sofrem de uma ampla gama de doenças, incluindo câncer, diabetes, hepatite A, B, C, doença de Lyme, MRSA, esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, HIV / AIDS,malária,autismo, infecções de todos os tipos, altrite, ácidorefluxo, doença renal ou hepática, dores, alergias,infecções do trato urinário, problemas digestivos, hipertensão, obesidade, parasitas, tumores e cistos, depressãodoença, problemas de sinusite, doenças oculares, infecções de ouvido, dengue, problemas de pele, problemas dentários, problemasc o m p r ó s - tate (altoPSA), disfunção erétil e muitos outros.Os protocolos MMS neste livro também foram usados parasupere o vício em álcool e drogas, como heroína e outras, sem efeitos colaterais, e a lista continua. estede longe não é uma lista abrangente. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas de acordo com os resultados que vimosde todo o mundo, acho que é seguro dizer quando usadocorretamente, o MMS tem o

potencial de superar a maioria das doençases conhecido pela humanidade.

Os procedimentos de recuperação da saúde dados neste livro são osresultado de 20 anos ensinando pessoas a usar o MMS para recuperar a saúde. Dezenas de pessoas em todo o mundo usaram e aplicaram os princípios delineadosnos meus primeiros livros, ou ensinadoem seminários. Como resultado, ao longo dos anos recebi muitos comentários, muitos dos quaiscontribuiu para este livro. Os sucessos, mesmo no início, foram muito além de tudo que eu já tinha ouvido falar. No entanto, o que conquistamos ao longo do caminho nos ajudou a chegar a algo tão fantástico que muito poucospodem acreditar no começo, mas quem tenta logo descobrepara eles mesmos.

A chave é usar o MMS corretamente. Quero salientar que, antes dessa época, várias listas de doenças circularam com conselhos dadossobre como usar os protocolos MMSpara qualquer uma das muitas doenças específicas. As informações nessas várias listas são inadequadas, desatualizadas e, às vezes, erradas.

Ao longo dos meus anos de experiência, cheguei à conclusão de que, com o MMS, existe de facto, como às vezesdigamos, apenas um protocolo MMS. Esse protocolo é o da SaúdePlano de recuperação (HRP) conforme apresentado neste livro. Isto é umdescoberta de marcos e um novo conceito de usode MMS. Eu percebi que se os 50 ímparesprotocolosdescritos neste livro são colocados juntos corretamentee usados na sequência adequada, os melhores resultados serão alcançados. Isso não quer dizer que seja necessário usar todos os protocolos deste livro. O Plano de Recuperação de Saúde (ver*Capítulo 5)*explica as etapas e a sequência adequada parasiga para recuperar a saúde - e isso se aplica a praticamente todas as doenças e enfermidades. MMS não é preto ou branco. Masse

você vai aprender e aplicar os princípiosEu delineei no HRP, estou confiante de que você tem uma boa possibilidadepara recuperar sua saúde. Não importa qual seja o seu problema,continuar com o Plano de Recuperação de Saúde. Se você seguir essas orientações e prestar muita atenção aos sinais que seu corpo está emitindo, a recuperação da saúde será possível.

Algo de significativa impolência neste livro é a lista das Três Regras de Ouro do MMS (ver páginas 66, 83, 84, 130). Essas regras são absolutamente essenciais para o Plano de Recuperação da Saúde e, devo acrescentar, essas mesmas regras podem ser aplicadas a qualquer outro programa de recuperação da saúde.pode tentar. O Plano de Recuperação da Saúde, juntamente com as Três Regras de Ouro do MMS, são novos conceitos emo mundo MMS que todos deveriam prestar atençãoatenção a.

Quero esclarecer um ponto muito indelicado. Muitas pessoas dizem naturalmente “cura MMS” isso ou aquilo. Eu mesmo fiz esta mesma declaração de vez em quando em celainsituações, quando colocadas no local, ou quando as palavras foram colocadas na minha boca, ou como uma questão de acompanhar o fluxo determinologia que outros usam. Em nosso discurso e em nossosociedade global, muitas vezes confundimos as linhas com palavras e seussignificados. Mas, para registro, quero esclarecer aqui, MMSnão cura doenças. MMS mata patógenos e destrói (oxida) venenos. Quando os patógenos e venenos do corpo são reduzidos ou eliminados, então ocorpo pode funcionar adequadamente e, assim, curar. Eu olen dizer,“O corpo cura o corpo”. MMS ajuda a alinhar as coisas parao corpo pode fazer exatamente isso.

Se você decidir colocar em prática o que este livro ensina, espero ouvir falar de sua recuperação da saúde. Eu agradeceria (e a humanidade também) ouvir seu testemunho quando você se recuperasse. Por favor, compartilhe sua experiênciarience para que outros também possam se beneficiar. Vamos para:

http://mmstestimonials.is

Capítulo 1

Começando

Bem-vindo ao Guia de recuperação de saúde NNS. Eu verdadeiramenteespero que este livro seja útil para você, seja qual for o seucondição de saúde pode ser. Nós passamos muitas horastentar colocar essas informações na ordem adequada e em linguagem compreensível. Antes de ficarmos travados, existem alguns termos que você deve saber para entendero mundo do MMS. Familiarize-se com a definição dos termos abaixo e consulte esta lista sempre quenecessários em sua jornada para a recuperação da saúde.

Definição de termos

Ativação: A adição de uma substância a uma segunda substância para provocar uma mudança química (reação) de algum tipo. Quando um ácido alimentar é adicionado ao clorito de sódio para liberar dióxido de cloro, diz-se que ele está ativado.

Cor âmbar: Quando o ácido cítrico ou clorídrico é adicionado ao clorito de sódio (nas porcentagens mencionadas neste livro), após 30 segundos as gotas devem ficar com a cor âmbar. Neste livro, quando dizemos âmbar, estamos nos referindo a uma cor marrom. Isso pode ser em qualquer lugar de marrom claro a escuro, mas não amarelo. A cor âmbar das gotas ativadas por MMS antes de adicionar água, é muito parecida com a cor de uma garrafa de vidro âmbar (como é usada para óleos essenciais, várias

poções medicinais ou para garrafas de cerveja), quando colocada contra a luz.

Dióxido de cloro: um composto químico (ClO2) retirado de um mineral natural. É usado no programa de recuperação da saúde deste livro para destruir patógenos e neutralizar venenos.

DMSO (Dimetil Sulfóxido): Um naturalsubstância de-proveniente de polpa de madeira. É um solvente que dissolve muitas coisas que a água não consegue dissolver, incluindo coágulos sanguíneos e, portanto, é conhecido por interromper derrames. É conhecido por ter muitas outras qualidades curativas próprias, bem comoaumentando a ePetividade do MMS, ajudando a carregá-lomais profundamente nos tecidos.

Reação de Hemheimer:A qualquer momento, grandes quantidades deos patógenos estão sendo mortos oP no corpo mais rápido do que o corpo é capaz de eliminar as toxinas que o patógeno mortoa gens produz, pode causar náuseas, vômitos, dores de cabeça, diarréia ou outro desconforto, como cansaço excessivo.Isso é chamado de reação de Herxheimer e é comum ao passar por um programa de desintoxicação, como seguir os protocolos deste livro. Observe que embora oexperiência pode não torná-lo 7ee / pacilarlmente bom,experimentando uma reação Herxheimer é geralmente um sinal de quea cura está ocorrendo. Este livro contém orientações sobrecomo facilitar o processo de desintoxicação e esperançaajudar totalmente a minimizar os efeitos de uma reação de Herxheimerção

Master Mineral Solution (MMS): O nome de uma solução mineral / química usada para ajudar pessoas doentes a recuperarem a saúde.

Mineral: A definição da palavra mineral conforme usada nesteO livro é retirado da terceira definição do Dicionário Random House e da definição foulh do Dicionário Merriam-Webster, que são semelhantes. Um

mineral é “qualquer substância que não seja animal nem vegetal”.

MMS: MMS não ativado, que é um 22,4%/ o solução declorito de sódio (NaClO2) em água. (Isso é feito de80% de clorito de sódio em pó ou flocos.)

MMS1: também conhecido como*NNS ativado.*(Observe o "1" adicionado ao MMS.) É MMS (clorito de sódio) mais umativador (ácido alimentar). Quando os dois estão misturadoseles produzem MMS1 (dióxido de cloro [ClO2]).

Nota: Embora a fórmula química do cloro seja "Cl",*a fórmula química Cl também é encontrada no produto químicofórmula para dióxido de cloro (ClO2), e também é encontradona fórmula química do sal de cozinha (NaCl). O dióxido de cloro é totalmente diferente do alvejante doméstico comum (hipoclorito de sódio, que também tem Cl em sua fórmula química, NaCl0), que é tóxico e conhecido por causar câncer. O dióxido de cloro (ClO2) não causa câncer e tem uma incrível capacidade de destruir (por meio da oxidação) microorganismos causadores de doenças que podem estar no corpo humano, sem causar danospara o corpo. Por causa dea natureza química do dióxido de cloro, ele destrói essesmicroorganismos de tal forma que também são destruídos ao mesmo tempo, deixando para trás apenas alguns grãos de planíciesal de cozinha, átomos de oxigênio descarregados e microou mortosganismos, que o corpo pode facilmente lavar para fora do sistema.*

Gotas de dose MMS1: a qualquer momento neste livro que nos referimospara “gotas” de MMS1 (MMS ativado), contamos apenas as gotas reais de MMS (clorito de sódio). Assim, embora nósadicionar gotas de ativador adicionais a uma dose de MMS1, não contamos as gotas de ativador adicionadas quando nos referimos aocai na dose. Por exemplo, uma dose de 3 gotas de MMS1terá 3 gotas de MMS e 3 gotas de ácido ativadorfazendo na verdade 6 gotas de líquido total, mas ainda assim dizemosque é uma dose de 3 gotas.

MMS2: hipoclorito de cálcio, Ca (ClO) 2, quando misturado comaguase transforma em uma solução de ácido hipocloroso, que é um ácido oxidante que o sistema imunológico humano produz naturalmente para destruir germes de doenças e limpar venenos no sistema.

Patógenos: Todo e qualquer microrganismo que causa doença em seu hospedeiro. O hospedeiro pode ser humano, animal, planta, fungo ou mesmo outro microrganismo.

Clorito de sódio: fabricado a partir de uma substância química retirada do cloreto de sódio (NaCl, sal puro), que é um produto naturalmineral encontradoem grandes depósitos em todo o mundo.Existem muitos processos diferentes para fazer clorito de sódio (NaClO2). Não pode ser feito em sua cozinha. Deve ser feito em uma fábrica. Quando este processo industrial éconcluído, você tem clorito de sódio (NaClOz), que éa matéria-prima para fazer MMS. MMS é um 22,4^{O}/ o solução de clorito de sódio em água.

WPS: Purificação de ÁguaS o l u ç ã o , e s t a é a m e s m a f ó r m u l a la como MMS. É 22,4% de clorito de sódio (NaClO2), em água purificada ou destilada.

Esclarecimento

MMS é o termo geral da sigla usado em todo o mundo para indicar muitos dos diferentes usos de uma soluçãode clorito de sódio na água. O clorito de sódio é um mineral / produto químico que, quando misturado com um ácido de qualidade alimentar, gera dióxido de cloro. O dióxido de cloro mata doenças dentro e fora do corpo humano, e é o dióxido de cloro que é o ingrediente ativo usado na maioria de nossos protocolos.

Portanto, às vezes surge a pergunta: O que é MMS? É clorito de sódio? Ou é dióxido de cloro? A resposta é:

São ambos! Como eudito acima, o termo MMS é freqüentemente usado como um termo genérico para descrever o que chamei de Solução Mineral Milagrosa no passado, e o que agora chamo de Solução Mineral Mestre. Neste contexto, pode-se dizer: "Bem, é a solução mineral, portanto, é dióxido de cloro." Sim, mas, novamente, uma solução de clorito de sódio a 22,4% também é normalmente vendida com o nome de MMS, e é chamada de MMS neste e outros livros e sites.

Em nossos livros, e conforme observado acima na lista de definições, nósreferir-se a MMS comouma solução de 22,4% de clorito de sódio emágua, e use o acrônimo MMS1 para indicar que um ácido alimentar foi adicionado ao MMS que gera um clorosolução de dióxido. Tecnicamente MMS é clorito de sódio (a 22,4^{0}/ o solução em água), e MMS1 é MMS mais umativador, que produz dióxido de cloro. No entanto, na conversa do dia-a-dia, ambos são frequentemente chamados simplesmente de MMS. Umpode dizer: "É hora da minha dose de MMS", (ou seja,ativadoMMS cai na água), ou “Mãoeu oMMS para que eu possa misturar minha dose ”, significando me passar o frasco de22,4^{0}/ solução de clorito de sódio que será então misturadacom ácido de qualidade alimentar para produzir dióxido de cloro. Ou,tomando fulher, pode-se dizer: “Eu tenho que pedir um pouco de MMS”, o que provavelmente significa que ele vai pedir uma garrafa de clorito de sódio 22,4^{0}/ o, mais uma garrafa de ácido de qualidade alimentar.

Alguns se referem ao MMS simplesmente como “CD” para dióxido de cloro. Pessoalmente, não gosto desse termo porque apenas adiciona mais confusão ao tópico. Estou entrando nesta longa explicação, não com a intenção de confundir, mas espero esclarecer,

porque o termo MMS foi amplamente utilizado e é usado em todo o mundo dessa maneira geral - na minha opinião, não há como pará-lo. Concluí que simplesmente temos que seguir o fluxo.

Pense assim - muitas vezes comparo MMS ao termo genérico para coPee. Pode-se dizer que gostam de beber cope. Mas o

pergunta-se: Que tipo de copee? Acima de tudo, existem muitos tipos e variações de copee e maneiras de fazê-lo.Há coPee de gotejamento / filtro, coPee feito em uma prensa francesa, ou um coador ou em uma máquina de café expresso, ou o coPee instantâneo rápido e fácil. Há uma variedade de grãos de coPee e ainda mais variedadesde misturas coPee. Existem todos os tipos de formas de preparar e beber café. Alguém podecomo um Cappuccino, outro um Mocha Late, outro umEspresso simples, um Americano, Turco CoPee, IrlandêsCoPee, Vienna CoPee, Café Cubano, CaPe Latte ou ao bom e velho copo de Juan Valdez. A questão é, olen quandoreferindo-se a todas essas e muitas outras variaçõesde coPee, se você estivesse saindo com amigos, provavelmente diria: "Vamos para o coPee", mas quando você chegar à loja do coPee, uma variedade de coPee será pedida. Nesse sentido,coPee é um termo amplo e o mesmo pode ser dito para otermo, MMS.

Então, quando se trata de misturar doses de MMS e usá-lo para restaurar a saúde de acordo com este livro, por favorsiga diligentemente os termos do MMS, conforme listado nodefinições acima, e saiba que, ao falar em termos gerais, a sigla MMS é usada em uma variedade demaneiras.

Medidas usadas neste livro

As principais medidas usadas neste livro são quedas,onças fluidas, mililitros e xícaras. Essas medidas variam ligeiramente de país para país. Por exemplo, uma onça fluida do Reino Unido = 28,41 mililitros, uma onça fluida americana = 29,57mililitem.

Muitas operações de cozimento e até mesmo laboratórios em torno do OPas figuras acima, e eu faço o mesmo. Para simplificar e porque este livro foi escrito para um público global, arredondamos o seguinte: 1 fluido

onça a 30 mililitros; 1/2 xícara a 4 onças fluidas ou 120 mililitros. (Onde quer que se encontre onças ou onças escritas neste livro, estamos nos referindo a uma onça fluida ou onças fluidas.)

Além disso, o mesmo se aplica à medição de quedas. Existem vários fatores que pesam para medir uma queda. Neste livro, escolhi seguir uma regra geral(com base no sistema métrico)de 20 gotas é igual a 1 mililitro. É importante notar que o tamanho da gota pode diferir entre diferentes conta-gotas, frascos com tampas de conta-gotas, etc. Em geral, se você estiver usando bons frascos, as gotas caem facilmente, uma gota de cada vez, e os frascos não vazam, ou tendem a causar quedas descontroladas - tudo deve ficar bem. Se seus frascos conta-gotas não funcionarem bem, considere encontrar outro fornecedor para seu MMS e ativador.

Recuperação de saúde MMS Legenda do Guia	
MMS	MMS não ativado
MMS1	MMS ativado
MMS2	hipoclorito de cálcio
HCI	ácido clorídrico
ml	mililitro
1 ml	20 gotas
1 onça	30 ml
1 colher de sopa	15 ml
1 colher de chá	5 ml
1/2 xícara	4 onças / 120 ml
cc	Centímetro cúbico
1 ml	1 cc

CDSe CDH

Além do MMS1, existem duas outras formas de MMS—CDS (solução de dióxido de cloro) e CDH (dióxido de cloro-ide Holding). Embora todas as três formas funcionem ligeiramenteDe maneiras diferentes, todos os três tiveram sucesso em ajudar as pessoas a restaurar sua saúde. No entanto, neste Guia, nos referiremos apenas ao MMS original - que é oFórmulaque até agora foi o mais experimentado e comprovadodurante um longo período de tempo. Um dos objetivos deste livro épara dar a você, leitor, uma boa base no uso da Master Mineral Solution. Este entendimento básicoé necessário para usar todas as formas de MMS. Se vocêsobter esses fundamentosvocê estará no caminho para uma saúde melhor. Os mesmos princípios neste livro podem ser aplicados aas outras formas de MMS. (Veja o Apêndice A.)

É seguro receber MMS?

Em 20 anos, desde a descobertad e MMS, Não estamos cientesde qualquer ummorrendo ou alguém sofrendo lesões permanentescomo resultado do uso de MMS (dióxido de cloro em uma solução,qual é o jeito que éé usado 99% o do tempo ao longoo mundo). Nós só sabemos de uma morte registrada (umacidente industrial) causado pelo gás dióxido de cloro muitos anos antes da descoberta do MMS. Isso apesar do fato de que o dióxido de cloro tem sido amplamente utilizado parapurificar água, higienizar pisos de hospitais, desinfetar matadouros e purificar vegetais, junto com centenas de outros usos. Mais do que qualquer outro mineral / produto químico, o dióxido de cloro, por meio desses e de outros meios, melhorou a saúde e a vida de centenas de pessoas.dragas de milhões de pessoas em todo o mundo e ainda nenhuma morteou lesões permanentes

foram registradas causadas pelouso de dióxido de cloro em 100 anos. Isso também inclui os muitos milhões de pessoas que tomaram MMS oralmente poro propósito de restauração da saúde. Não compare nenhuma morte,

exceto um único acidente industrialnão relacionado ao MMS, às aproximadamente 950.000 mortes causadas por fármacos anualmente, ou às 15.000 mortes causadas por ibuprofeno e Aspirina, apenas nos Estados Unidos. Considerando todas as coisas, o dióxido de cloro é um dos produtos químicos mais seguros, senão o mais seguro conhecido. Para obter mais detalhes, consulte:

http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf

DMSO (dimetilsulfóxido) também é usado em alguns de nossosprotocolos. Nos 60 anos desde que o DMSO foi introduzido nos EUA, nunca houve um repol dedanos ou morte causados por DMSO. O DMSO foi cientificamente comprovado por ter qualidades curativas próprias, comoalém de aumentar a ePetividade do MMS.

O que MMS não é

Houve críticos que tentaram desacreditar o MMSdizendo que é "alvejante" ou derivado de alvejante,portanto, gostaria de explicar alguns princípios básicos aqui. Para*completamente*Para abordar este assunto, é necessário aprofundar-se na química. No entanto, o básico é bastantesimples e é isso que irei abordar aqui. Embora o dióxido de cloro (ClO2) e o sal de cozinha (NaCl) tenham acloroelemento em sua composição(novamente, observe que o "Cl" em ambas as fórmulas significa cloro), neste caso o cloro está em uma forma que não é perigosa e é de fatoútil. Por outro lado, alvejante doméstico que é hipoclorito de sódio (NaClO), também tem Cl na fórmula,mas, neste caso, o cloro (Cl) está em uma forma diferente epode ser, em alguns casos, muito perigoso. (Observeque essas três substâncias, embora todas tenham "Cl" de alguma forma na fórmula, são todas completamentediferente.)

Você pode procurar na Internet a MSDS (Material Safety Data Sheet) para obter essas informações. Estes dados de segurançafolha mostra em “EstabilidadeDados ”de que o hipoclorito de sódio (NaClO), que por sua vez, é alvejante doméstico, pode reagircom produtos de limpeza de vasos sanitários, removedores de ferrugem, vinagre, ácidos e produtos de amônia para produzir gases perigosos que causaram hospitalização e até morte. Até 2.200 incidentes de hospitalização ocorrem a cada ano com o Brit-assuntos ish. Quando misturado com várias águas da torneira ecolocado em contato com o corpo humano, pode produzir produtos químicos que causam câncer, que o dióxido de cloroe o sal de mesa não pode servir.

O dióxido de cloro é fabricado em um dos vários diPer-Esses processos a partir de minerais e produtos químicos retirados do mineral natural, cloreto de sódio (NaCl), que na verdade é sal de cozinha. Assim, o sal de mesa comum, cloreto de sódio (NaCl), por meio de vários processos de fabricação, torna-se clorito de sódio (NaClOz). Quimicamente, isso é feito adicionando-se dois átomos de oxigênio (O2) a cada molécula de sal (NaCl) para produzir (NaClO2), que é o clorito de sódio. Então, quando esse clorito de sódio é misturado a um ácido alimentar fraco, ele se torna dióxido de cloro (ClOz), que é o principal ingrediente ativo nos protocolos discutidos neste livro.

O dióxido de cloro tem centenas de utilizações na indústria e é mais de 1.000 vezes mais forte do que a solução MMS Health Recovery deste livro. Nossa dose padrãode 3 gotas de solução de clorito de sódio (22,4^{0}/ o sódioclorito em água) em 4 onças / 120 ml (1/2 xícara) de águanão faz nenhum tipo de solução que pode ser chamada“Alvejante” se referindo a algo forte o suficiente para limpar umbanheiro, etc. Os críticos que falam sobre o MMS ser alvejante só conseguem

assustar desnecessariamente as pessoas e causaraqueles que eles assustam para continuar sofrendo ou mesmo morrer. Somenteolhe para a fórmula - NaClO2 (clorito de sódio / MMS) é

diPerente do que NaClO (hipoclorito de sódio) - diPerentefórmula, substâncias diferentes. Portanto, seja pequeno, não deixe que os outros o enganem!

Compreendendo a oxidação

Oxidação

As minúsculas palículas do universo são mantidas juntas pelos elétrons que as cercam. Qualquer ação que resulte na mudança dos elétrons que mantêm a matéria unida é considerada oxidação. Você pode ter pensado que a oxidação é de alguma forma adicionar oxigênio ao que está sendo oxidado, mas não é assim. Basicamente, a oxidação remove ou altera a posição dos elétrons que mantêm as coisas unidas. Isso destrói completamente as substâncias ou as transforma em outra coisa.

MMS e Oxidação

O MMS1 (dióxido de cloro) destrói os patógenos (microrganismos causadores de doenças) não usando oxigênio, mas oxidando-os. O MMS1 afasta alguns dos elétrons que mantêm os patógenos unidos, resultando em sua destruição. MMS1 também é completamente destruído nodestrutivoprocesso, deixando para trás apenas um minutoquantidade de sal de cozinha (cloreto de sódio [NaCl]) e oxigênio neutralizado que simplesmente sai do corpo. Vários venenos criados pelos patógenos também são destruídos pelo processo de oxidação. O fato é que o MMS1 não cura o corpo contra doenças. Como o processo de oxidação de mataro patógeno ocorre, é o corpo,libertado detoxinas, que cura o corpo. Bactérias benéficas são altamenteresistentes à oxidação e, portanto, não são prejudicados pelo clorodióxido.

Outros processos de oxidação

O oxigênio é o oxidanteque a natureza designou para usono corpo humano por causa de seus muitos caracteres impolantesterísticas. As terapias atuais de oxigênio envolvem mais do que apenas respirar. Em um tipo de oxigenoterapia, o sujeitoentra em uma câmara hiperbárica pressurizada cheia de purooxigênio. Oxigênio puro sob pressão é muitas vezes maiseletivo do que o oxigênio não pressurizado. Isso tem muitosbenefícios e, em alguns casos, fez milagres. Infelizmente, o aumento da pressão também multiplica as características negativas do oxigênio, ou seja, aumentando o nível de oxigêniocapacidade de oxidar (destruir) células boas e ruins.Este tratamento também é muito caro, e vários tratamentosgeralmente são necessários; portanto, a maioria dea humanidade simplesmente não pode arcar com os custos.

Dois outros oxidantes muito poderosos que às vezes são usados no corpo são o peróxido de hidrogênio e o ozônio. Enquantoambos foram e são usados para ajudar a erradicar doenças, ao mesmo tempo, podem causar danos ao corpoquando usado incorretamente. Ambos são mais poderosos que o oxigênio ou MMS1 (dióxido de cloro). O peróxido de hidrogênio e o ozônio podem destruir muitas coisas, incluindotecidos do corpo humano.

Os patógenos se escondem profundamente nos tecidos do corpo. Porque hidrogênioo peróxido e o ozônio, assim como o dióxido de cloro, são destruídos quando oxidam algo; geralmente são destruídos pela oxidação dos tecidos do corpo antes de atingirem os patógenos escondidos nos tecidos. Eles também podem ser destruídos por venenos e impurezas no sangue e nos tecidos. Ozônio e peróxido de hidrogênio podem ser úteis às vezes, mas nunca devem ser usados por alguém que não seja altamente treinado em seu uso.

Os potenciais de oxidação desses quatro oxidantes são dados a seguir. A força de qualquer oxidante palicular é medida

em volts e como você pode ver, o dióxido de cloro (MMS1) é o menos forte dos quatro oxidantes. Como o MMS1 é seletivo (patógenos oxidantes e não tecidos do corpo), ele pode ser mais eletivo em patógenos oxidantes, bem comosendo mais seguro do que esses outros oxidantes.

Dióxido de cloro	0,95 volts
Oxigênio	1,30 volts
Peróxido de hidrogênio	1,80 volts
Ozônio	2,07 volts

Nota: Para uma explicação mais detalhada de compreensão*MMS e o processo de oxidação, leia o livro The Mas*-ter MineralSolution of the 3rd Millennium Capítulo 21,*Oxidante e Oxidação, e o Apêndice, EntendimentoMMS. Leia o livro inteiro para uma compreensão detalhadade todos os aspectos do NNS e sua função.*

Uma palavra para o sábio

Por experiência própria, algumas pessoas ocasionalmente apresentam motivos para alterar as técnicas e os protocolos da Igreja de Gênesis II (ver Apêndice B). Isso geralmente impede que os protocolos funcionem ou funcionem da melhor maneira possível. As informações neste livro são o resultado de milhões de pessoas que utilizaram o MMS durante um período de 20 anos. Nossos Ministros da Saúde aprenderam por experiência própria que esses protocolos funcionam melhor quando seguidos da forma como são apresentados aqui. Portanto, siga as instruções do livro, siga as instruções cuidadosamente e, para obter os melhores resultados, siga as instruçõesnão altere os procedimentos.

Este livro está repleto de detalhes essenciais que são importantesÉ preciso saber para recuperar a saúde. Se você não estiver ciente de alguns desses detalhes vitais, isso pode impedir sua recuperação, da mesma forma, outros pontos impolentes podem ajudar a garantir

sua recuperação. Eu recomendo fortemente que você leia issolivro na sua totalidade - da frente para trás! Você não quer economizar ao aprender sobre o MMS.

É indelicado saber que embora eu o encoraje aleia o livro completo, você não precisa terminar o livro antes de começar o Plano de Recuperação da Saúde (Capítulo 5). Depois de ler e entenderCapítulo1 a Capítulo6, você pode seguir em seu caminho para a recuperação da saúde, começando com o procedimento de fixação (consulte a página 79). Você não precisa saber o livro inteirode dentro para fora para se cansar, mas continue lendo e se educando sobre o Plano de Recuperação de Saúde MMS. Delendoatravés de tudo isso, você terá um entendimentodas várias maneiras que o MMS pode ser usado - e você vaiaprenda algumas coisas muito impolentes do que fazer e do que não fazer, essenciais pararecuperação da saúde.

Memória restaurada: Um cara idoso (na casa dos 80-90 anos), que afirmava ser o último sobrevivente da empresa química (desde então fechada), que operava em New Plymouth e fabricava o agente laranja e muitos outros sprays tóxicos. Depois de 50 anos trabalhando lá, ele disse que estava tão cheio de toxinas que não conseguia se lembrar de coisas que havia feito no dia anterior, junto com outros efeitos à saúde relacionados ao acúmulo de toxinas no corpo. Alguém lhe contou sobre o MMS, que ele tentou. Ele me ligou no segundo dia todo animado, dizendo que se lembrava de tudo que

havia feito no dia anterior. Ele afirmou estar 100% melhor em cerca de uma semana no MMS. Ele agora é um defensor do MMS, dizendo a todos que estão dispostos a ouvir. —P

Capítulo 2

Precauções de segurança

O dióxido de cloro tem sido usado com segurança por cem anosem hospitais, preparação de alimentos, purificação de água e muitas outras coisas. Tem sido usado recentemente com muita segurança por milhões de pessoas para melhorar sua saúde com ótimos resultados. Existem, no entanto, alguns casos em que é necessário ter cuidado. Queremos que você tenha a experiência mais agradável possível enquanto recupera sua saúde. Não se deixe levar por essas precauções, mas esteja ciente delas antes de iniciar sua jornada para uma saúde ideal.

Algumas das precauções de segurança listadas abaixo aparecem em outras seções deste livro sob os vários assuntos a que se referem. Estamos repetindo-os aqui, a fim de fornecer a você esta lista compilada para sua fácil referência. Observe que algumas das medidas de segurança impolentes listadas abaixo só aparecem nesta lista.

MMS / MMS1

X Mantenha o MMS fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não houve fatalidades até o momento, no entanto, algumas crianças ficaram muito doentes, bebendo acidentalmente uma bebida muito grandedose (não designada para uma criança) de MMS.

X Nunca permita que MMS (solução de clorito de sódio) se sente em umgarrafa ou vidro não marcado. Não tem

cheiro e muitas vezes é difícil ou impossível dizer a diferença entre MMS

e água. Algumas pessoas beberam até meio copo antes de perceber que não estavam bebendo água. Esta é uma overdose enorme de MMS concentrado não diluído, e eles ficaram no hospital por algumas semanas! Nocaso de overdose, se uma pessoa beber muito MMS por engano ou propositalmente, ela deve imediatamentebeba o máximo de água com sal possível para induzir o vômito (use 1 colher de sopa de sal por 1 litro / qual deagua); em seguida, beba mais água salgada e tente vomitar novamente,e faça isso várias vezes. Se eles ainda se sentirem mal depois dissoprocesso eles devem ir para um hospital.

¥ • Certifique-se de que todos os frascos de MMS, ácido, etc. estejam claramente rotulados para que você possa saber facilmente o que contém. O ideal é que as etiquetas tenham cores diferentes para facilitar sua diferenciação. Se usar etiquetas de papel, ajuda cobri-las com fita adesiva, para evitar que se desintegrem e caiam, caso vazem com o tempo.

XI sugeri o uso de um frasco de spray para os olhosbem como para uso tópico para outros amigos do corpo. No entanto, a fórmula para uso nos olhos é significativamente diferente da fórmula para uso tópico na pele. Tenha um cuidado especial para manter essas duas soluções de pulverização diferentes bem marcadas. Nunca use o borrifador destinado à pele dos olhos.

X Se você tomar muito MMS1 e tiver uma reação Herxheimer séria, (náuseas, vômitos, excessodiarreia) tome vitamina C como antídoto. Pegue 2 gramas(2.000 mg) de vitamina C de uma vez. Se os sintomas persistirem,você pode então tomar mais 1 grama de vitamina C,Seguehora, e outro 1 grama na terceira hora. Não exagere nessa quantidade de vitamina C. Duas outras opções para usar como antídoto seriam: Coma uma maçã fresca. Não

m o r d a e engolir, isso deve ser muito bem mastigado. Ou pegue 1nível de colher de chá de bicarbonato de sódio em 1/4 de uma xícara (2

onças / 60 ml) de água. Beba mais alguns goles de simpleságua depois disso, se desejar.

X Se sua casa tiver uma fossa séptica, não jogue os resíduos de MMS no ralo, pois eles podem matar as bactérias em sua fossa. Isso faz uma bagunça e é caro para consertar.

¥ • O líquido MMS com força total fora do frasco (solução de clorito de sódio a 22,4%) pode irritar a pele. Se entrar em contato direto com a pele, lave-o oP com água limpa. Evite sujar as roupas, pois a solução concentrada pode descolori-las. Uma solução diluída também pode descolorir alguns tecidos, dependendo da concentração e do tecido. (Há duas exceções a esta regra de colocar MMS de força total na pele, você pode fazer isso por curtos períodos de tempo para ajudar a queimaduras e picadas de mosquito, consulte as páginas 245 e 196 para obter instruções adequadas.)

X Evite respirar em altas concentrações de clorogás dióxido produzido a partir da mistura de clorito de sódio e um ativador de ácido. O gás dióxido de cloro escapa facilmentequando MMS e ativador são misturados e não estão em umrecipiente. É melhor evitar receber uma pancada direta, pois pode causar tosse. Não misture a sua dose diretamente debaixo do nariz ou da boca. Se estiver fazendo o protocolo de bolsa, (vejapágina 156) tenha especial cuidado para não respirar diretamente os vapores. Há momentos em que respirar o gáspequenas quantidades controladas (ver página 159) são necessárias parae pode ser muito curativo para os pulmões e seios da face, masevite isso, a menos que esteja sob um protocolo específico que exija isso e saiba o que está fazendo, pois é fácilinale demais.

Os protocolos X MMS são conhecidos por cancelar o efeito de bilhões de pílulas de controle.

X Ao viajar com, ou transpolar MMS, ácido ativador e outros suprimentos necessários para fazer os protocolos em

neste livro, certifique-se de separar todos os diferentes tipos de líquidos e pós. O MMS (clorito de sódio) e o ativador de ácido devem ser embalados separadamente, nunca no mesmosaco, de modo a evitar derramamentos e possíveisativação. O DMSO nunca deve ser embalado nomesmo contêiner ou mala que MMS2 (veja advertência impolante na página 26). Certifique-se de que todos eles estão devidamente embalados para que não possam derramar. (Sugestão: colocar em sacos plásticos, fita adesiva e, em seguida, colocar em sacos Ziploc duplos).Se viajar de avião, certifique-se de conhecer os regulamentos da companhia aérea para transportar vários tipos de líquidos e suprimentos (eem que quantidades) na transportadora que você está usando. Seja responsável e diligente para embalar cuidadosamente para evitar quaisquer problemas para você ou para outros, ou refletir negativamente sobreMMS em geral.

HIPOCLORITO DE CÁLCIO (MMS2)

X O hipoclorito de cálcio pode inflamar até mesmo com uma faísca muito pequena quando entra em contato com materiais orgânicos. Por exemplo: se alguém enfiou um pano (qualquer tipo de pano) no frasco de hipoclorito de cálcio e por qualquer motivo uma faíscase uma vela, cigarro ou qualquer outro tipo de faísca o acertasse, causaria um incêndio instantâneo e extremamente quente.

XEm caso de derramamento de pó de hipoclorito de cálcio, limpe com duas lixeiras, ou uma pá e um pano úmido, mas não use uma vassoura, pois uma faísca pode facilmente inflamar a vassoura ao

entrar em contato com o hipoclorito de cálcio pó.

XO hipoclorito de cálcio é higroscópico e atrairáumidade do ar. Se o seu suprimento ficar úmido, descarte-o, mas não pelo ralo se você tiver uma fossa séptica. Se você tem um esgoto urbano, uma pequena quantidade, cerca de um litro, não vai caber nele. Você pode descartá-lo em um lixão da cidade ou com um coletor de lixo da cidade, após adicionar uma pequena quantidaded e água para isso para garantir que ele não acenda.

¥ ' Evite o contato com a pele e os olhos quando no pó Formato.

¥ • Não respire diretamenteos vapores do hipoclorito de cálcio.

¥ •Não faça mais cápsulas de MMS2 do que o necessário por um mês, pois as cápsulas se tornarão quebradiças e podem facilmente arrombar.

¥ • Se você usar uma máquina de cápsulas para preparar as cápsulas de MMS2 (consulte as páginas 93-94, 274-278), use uma que seja feita de plástico, como o pó de hipoclorito de cálcionão deve entrar em contato com metal.

AVISO

- Não permitir que o hipoclorito de cálcio (MMS2) entre em contato com o DMSO. Isso vai causar imediatacombustãoc o m extremocalor eincêndio. Nesse caso, ele não precisa de uma faísca para extinguir o fogo instantaneamente. Use água para apagar esse incêndio, mas recue comoa água vai espirrar.

- O hipoclorito de cálcio (MMS2) nunca deve, nuncaser embalado no mesmo recipiente, caixa ou malacomo DMSO. Ao transpolar esses itens sempreembalá-los separadamente.

INGESTÃOVVARNING

- Nunca use DMSO em uma bebida enquanto ao mesmo tempo toma cápsulas de hipoclorito de

cálcio (MMS2). OO DMSO pode fazer com que o MMS2 aqueça e podetorna-se muito desagradável no estômago. (Se isso acontecer por acidente, beba bastante frioágua para aliviar qualquer desconforto.)

- Se adicionar DMSO a uma dose de MMS1, de acordo com o protocolo1000 Plus, por exemplo, você não deve calcular maisde 3 gotas de DMSO por cada gota de MMS1, edeve ser misturado com pelo menos 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água.

- Se estiver em um protocolo que exige o recebimento de MMS2 nono mesmo dia das doses de MMS1 / DMSO, você pode fazer isso,mas a cápsula de MMS2 deve ser separada por meia hora das doses de MMS1 / DMSO. Nuncatome uma dose de qualquer coisa que contenha DMSO euma cápsula MMS2 ao mesmo tempo!

ÁCIDO CÍTRICO / ÁCIDO HIDROCLÓRICO (HCI)

X Ácido cítrico e ácido clorídrico (HCI) por conta própria,não deve entrar em contato com a pele. O ácido pode ser lavado da pele com água limpa. Seo ácido ficanos olhos, lave-os com água limpa até oa sensação de ardência se foi. Se você lavar o olho imediatamente,não deve haver problema, mas se você demorar até 30 segundos antes de colocar água limpa em seu olho, hápode ser um problema e você deve ir a uma clínica de emergência imediatamente, mas não antes de enxaguar bem o olho com água. Algumas precauções sugeridas para evitar respingos nos olhos para começar seriam - usar óculos quandoderramar ácidos, tome cuidado para manter a garrafa à distânciae altura para evitar respingos nos olhos, use um fundovidro suficiente.

X para alguns (não todos)pessoas, o ácido cítrico é conhecido por causar problemas estomacais significativos. Se for esse o caso, use 4% HCI como um ativador para MMS em vez de cítricoácido.

¥ 'Nossos protocolos exigem 4% de HCl. Nesta concentração, não deve causar danos graves se derramado acidentalmente na pele, mas deve, no entanto, ser enxaguado imediatamente.

No entanto, HCl de maior concentração e outros ácidos de alta concentração podem ser prejudiciais se não forem manuseados de maneira adequada. Tenha em menteque a qualquer momento você transpol ou carregue ácidos fortes qualquerdistância fulher do que dentro da mesma sala, você devetambém carregue água com você. Isso permitirá que você enxágue imediatamente qualquer ácido derramado da sua pele ou para forados olhos. Grandes derramamentos podem causar danos graves emesmo a morte se não for enxaguada da pele ou dos olhos imediatamente. Caso precise manusear HCl em alta concentração, faça-o em uma área bem ventilada, use máscara adequada, use luvas e tome muito cuidado para nãorespire a fumaça, pois pode causar danos.

DMSO

X DMSO é um solvente e passa facilmente pela pelee nos tecidos. Ele também carregará outras substâncias junto com ele, portanto, tome cuidado com o que você tem na pele antes de manusear o DMSO.

¥ • Ao aplicar DMSO topicamente, certifique-se de que suas mãos e unhas estejam limpas e livres de contaminantes (incluindo resíduos de sabão) ao manusear o DMSO. Você também quer ter certezaa área na qual você aplica o DMSO está limpa.

¥ • Ao lavar uma área da pele antes de aplicar o DMSO, é melhor, se possível, usar sabonete natural e sem produtos químicos para lavar as áreas de aplicação e as mãos. Seisto está disponível ou não, certifique-se de que todo o sabão foi completamente enxaguado - ou não use sabão algum. Simplesmente lave bem (esfregando o pele) com água limpa.

¥ •O melhor método para aplicar DMSO na pele é simplesmente usar as mãos nuas e limpas e secas ao esfregar o DMSO em seu corpo ou em outra pessoa.

X Se estiver usando as mãos desprotegidas para aplicar DMSO, não use o dedolixador de unha. DMSO é um solvente que não só dissolve

o polonês, mas também carregará seus ingredientes tóxicos através da pele e para o corpo. Você pode cobrir sua mão com umsaco plástico de sanduíche (este tipo de plástico em geral, é OKpara uso com DMSO) para aplicar o DMSO.

¥ • Depois de manusear o DMSO, lave imediatamente com sabonetepode levar o sabonete para a pele / tecidos. Basta enxaguar bem as mãos com água limpa.

X Mantenha o DMSO totalmente afastado dos olhos.

¥ • Não use as luvas mais comuns (borracha, látex, etc.) com DMSO. Pode dissolver as luvas. Mesmo dissolvendo umum pouquinho das luvas pode então transferir a borracha ou látex para o seu corpo. Luvas feitas de plástico não esticável sãoOK para usar com DMSO. Normalmente o DMSO não prejudicamãos,e luvas não são necessárias. (Se aplicar com frequênciaou em grandes quantidades para alguns tipos de pele pode causar oa pele fica enrugada, mas isso passa logo.)

¥ • Nunca adicione DMSO a uma solução de enema. O cólon contém muitas toxinas que o corpo está liberando. Se você colocar DMSO no cólon, poderá retornar algumas dessas toxinas para a corrente sanguínea.

AVISO

- Não permitir que o DMSO entre em contato com hipoclorito de cálcio (MMS2). Isso vai causarcombustão imediata com calor e fogo extremos. Nesse caso, ele não precisa de uma faísca para extinguir o fogo instantaneamente. Use água para apagar tal incêndio, masafaste-se porque a água vai espirrar.

- O DMSO nunca deve ser embalado no mesmo recipiente, caixa ou mala que o hipoclorito de cálcio(MMS2). Ao transpolar esses itens sempreembalá-los separadamente.

INGESTÃOVVARNING

- Nunca use DMSO em uma bebida enquanto ao mesmo tempo toma cápsulas de hipoclorito de cálcio (MMS2). O DMSO pode fazer com que o MMS2 aqueça e pode se tornar muito desagradável no estômago. (Se isso acontecer por acidente, beba bastante frioágua para aliviar qualquer desconforto).

- Se adicionar DMSO a uma dose de MMS1, de acordo com o protocolo1000 Plus, por exemplo, você não deve calcular maisde 3 gotas de DMSO para cada gota de MMS1, edeve ser misturado com pelo menos 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água.

- Se estiver em um protocolo que exige o recebimento de MMS2 nono mesmo dia das doses de MMS1 / DMSO, você pode fazer isso, mas a cápsula de MMS2 deve ser separada por meia hora das doses de MMS1 / DMSO. Nuncatome uma dose contendo DMSO e um MMS2**cápsula ao mesmo tempo!**

Heroína grátis: Obrigado por oferecer MMS ao nosso mundo. Eu pessoalmente ajudei algumas pessoas a se livrarem do vício em heroína em três a quatro dias, apenas com 3/4 de gota de MMS1 por hora. Isso ocorre a cada hora em que eles estão acordados. Também incluí banhos de MMS1, usando 25 gotas de MMS1 por banho. Eu pessoalmente ajudei muitas pessoas com resultados 100% inacreditáveis. —Ravi,Inglaterra

Candida desapareceu: eu Candida estava tão mal que eu não apenas fiquei exausto por anos a fio, mas o fungo havia migrado para meus olhos e ouvidos. Era como olhar através de folhas de papel encerado. Meus ouvidos zumbiam e tocavam sem parar.Todo o corpo coçava, especialmente à noite, quando era tão forte que me acordava de um sono profundo. Tive muitos outros sintomas e tentei muitas curas, nenhuma das quais funcionou até que experimentei o MMS. Tive de mudar minha dieta para uma dieta com muito baixo teor de carboidratos porque o açúcar alimenta o fermento. Não acho que você possa melhorar se continuar a comer a dieta americana padrão, então modifiquei minha dieta para incluir quase nenhum grão, nenhum tipo de açúcar e frutas muito limitadas. Você deve fazer isso para se recuperar. Eu tinha encontrado um produto chamado Syclovir que fez um ótimo trabalho em controlar os sintomas, mas não haviaCure ainda mais um ano no produto. EntãoEu li que o MMS pode ajudar a matar a Candida, então tomei 7 gotas 4 vezes por dia e comecei a ver melhora. Acho que já faz cerca de 2 meses dessa abordagem e minha energia está nas alturas. Posso tolerar mais carboidratos agora, sem sintomas. Me sinto ótimo e sei que é por causa do MMS. Além disso, o MMS reverteu a artrite que eu tinha nos dedos dos pés e deve ter esvaziado minhas veias, porque agora posso me esforçar e não ficar sem fôlego. Que milagre o MMS provou ser na minha vida! —Kathryn

MulGple**Recuperações:**MMS1 e 2 me curaram de aumento de próstata / dor ... infecção de gengiva / dente e cândida. Surpreendente! Eu uso MMS para tomar banho ... ótimo para a pele e os músculos de Gred. — James A., Nova Zelândia

Capítulo 3

MMS Basic Essentials

Existem algumas informações fundamentais que você deve saber antes de tentar usar o MMS. Como muitas coisas, o MMS é fácil de usar quando você está familiarizado com ele. Mas, a última coisa que você deve fazer é tentar usá-lo sem saber o que está fazendo. Se você decidir assumir a responsabilidade por sua própria saúde, faça seu dever de casa antes de tentar executar qualquer um dos protocolos deste livro.

Aqui estão dois fatores-chave que podem tornar um mundo dediferença para a recuperação da sua saúde:

1. Cada vez que você rouba um protocolo, mesmo que você possa ter lido o livro inicialmenteou há alguns meses, certifique-se de revisar completamente as informações no protocolo palicular que você está prestes a começar. É indelicado ter um compreensão clara de tudo o que deve serfeito*antes da*iniciando. Isso o ajudará a reunir todos osmateriais necessários para o protocolo e ajudá-lo a evitarchegar a uma etapa celain no protocolo e ser pegoshol, ou perceber que você fez algo errado no início. Alguns protocolos são mais detalhados do que outros ealguns contêm cuidados e / ou detalhes impolentes que sãoessencial para o sucesso. Portanto, refresque sua memória e tenha uma compreensão clara de cada detalhe antes de começar umprotocolo.

2. Se possível, tenha um palner. O MMS tem muitos usos. Você pode se sair bem usando um protocolo para uma limpeza geral

ou para superar um resfriado comum. Mas quando você está muito doente, seja com uma gripe muito forte ou uma doença mais séria ou de longa duração, você pode não se sentir bem para misturar uma dose, ou preparar um banho, ou controlar as horas e as medidas. Não tente fazer isso sozinho. Encontre alguém, um cônjuge, um pai, filho ou filha, tia ou tio, avô, um amigo ou um cuidador, que possa ajudá-lo em sua jornada para o bem-estar.

AtivandoMMS

Ácido cítrico e ácido clorídrico (HCI)

O MMS precisa de um ácido de qualidade alimentar para "ativá-lo" e os doiscombinados produzem MMS1 (dióxido de cloro). Existemvários ácidos que podem ativar o MMS, incluindo o suco deum limão fresco ou lima ou vinagre. No entanto, neste livroquando nos referimos ao uso de um ácido para ativar MMS, queremos dizerusando ácido cítrico a 50% ou HCI a 4% (clorídricoácido). Ao usar esses dois ácidos nessas porcentagenssempre use 1 gota de ácido para 1 gota de MMS. Ambos estesácidos, nessas porcentagens, são uma proporção de 1 para 1 com MMS.Em outras palavras, misture 1 gota de qualquer um desses ácidos paraa cada 1 gota de MMS. O tempo de ativação padrão paramisturar essas doses gota a gota usando 50%/ o ácido cítrico ou 4%/ o HCI é 30 segundos. Consulte a página 32 para obter instruções completas sobrecomo misturar uma dose básica de MMS1.

Preferimos HCI como ativador de escolha porque é o mesmo ácido que é produzido naturalmente em seu estômago. Muitas pessoas consideram que tem um sabor melhor e é mais suave para o estômago.

Alguns ácidos alternativos

Tanto o ácido cítrico quanto o clorídrico são fáceis de usar como ativadores para MMS; no entanto, dependendo da sua localização e disponibilidade, ou em caso de emergência, outros ativadores, como

como limão fresco ou suco de lima, ou vinagre, podem ser usados para ativar o MMS, mas medem de maneira diferente. Se usar qualquer um desses ácidos, você precisará usar 5 gotas de limão, limaou vinagre para cada gota de MMS, na proporção de 1 para 5. Se estiver usando esses ácidos alternativos, o tempo de ativação deve sertrês minutos, em vez de 30 segundos, que é o padrãotempo de ativação tardia para ácido cítrico 50% ou HCl 4%.

Notas

*!> Ao usar o suco de um limão fresco ou lima éimportante para*não use uma prensa de frutas cítricas que, de alguma forma, apertee*s a casca (casca ou superfície externa) do limão ou lima. As propriedades do óleo da casca de limão / lima se misturado como suco pode impedir a ativação do clorito de sódio e assim deixar uma dose inútil. Você pode prevenireste problema espremendo o limão / lima com a mão. Os vários apertos de plástico e metal (especialmente o tipo portátil) colocam muito óleo de urina no suco do limão / lima. Então esprema o limão / lima com a mão. Com isso, quero dizer cortar o limão / lima ao meio, pegar uma das metades e espremer suavemente o número de gotas que você precisa. Simplesmentec o n t e a s g o t a s c o n f o r m e e l a s c a e m p a r a a q u a n t i d a d e d e g o t a s d e q u e v o c ê p r e c i s a p a r a a s u a d o s e .*

¥ Nuncause ácido ascórbico ou ácido hidroñuórico; Porqueo ácido ascórbico irá neutralizar o NNS e o ácido hidroeóricoé extremamente venenoso.

!> Ao longo deste livro, sugerimos o uso de ácido cítrico E0% como ativador. Isto tem sidou s a d o p a r a a n s e i a p e l o s u c e s s o em fórmulas MMS. Existem alguns, no entanto, que usam 33%ou ácido cítrico a 35%. Disponibilidadeem diferentes percentagens varia de país para país. Essas porcentagens também são aceitáveis para uso para misturar uma dose de MMS1.

Nessas porcentagens (33% e 3E% de ácido cítrico), você também usa uma proporção de gota de 1 para 1 com MMS e espera 30 segundos para ativartempo de ção.

Misturando uma dose básica de MMS1

Vários protocolos são discutidos neste livro. Eles usam um número variável de gotas dependendo de vários fatores.Aqui, discutiremos apenas o conceito básico de mixagem.

Passo 1

0 Sempre use um copo vazio, limpo e seco.

0 Incline o copoligeiramente para o lado e solte suas gotas de MMS para que elas vão para o canto do amigo inferiordo vidro. Sempre segure o frasco conta-gotas ou a pipeta (conta-gotas) para cima e para baixo ao colocar o colírio.

0Se estiver usando uma solução de ácido cítrico a 50% ou solução a 4% de HCI, adicione a mesma quantidade de ativador na parte superior das gotas de MMS. (Para cada gota de MMS, adicione 1 gota de ácido.)

Passo 2

0 Gire as gotas um pouco enquanto conta até 30 segundos; neste período de tempo, a mistura deve ficar na cor âmbar.

etapa 3

0 Em seguida, adicione 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água potável ou suco ou outro líquido de acordo com as instruções nas páginas 41-45.

0 Bebersua dose enquanto fresca, em menos de um
minuto.

Misturando uma dose básica de MMS1



Tenha cuidado: algum gás de dióxido de cloro pode escaparquando o MMS e o ativador são misturados e não estão em um recipiente lacrado. É melhor evitar receber um sopro direto disso. Não misture a sua dose diretamente debaixo do nariz ou da boca. Há momentos em que respirar o gás em pequenas quantidades é necessário e pode ser muito curativo para os pulmões e seios da face, mas evite isso, a menos que você esteja sob um protocolo específico que o exija e saiba o que está fazendo (pois é fácil inalar demais).

Doses por hora

Quando escrevi meu primeiro livro, instruí as pessoas a trabalharem até 3 grandes doses de MMS1 por dia. Se você leu o meu primeirolivro, ou qualquer um de vários sites aleatórios que colocaram informaçõesdesselivro, infelizmente não o atualizei, então é hora de aprender algonovo. No início,quando eusugeridoo maiordose, Sempre tive pessoas trabalhando nisso um pouco de cada vez. Voltarentão a sugestão foi trabalhar até uma dose de 15 gotastomado 3 vezes ao dia.

A desvantagem do método antigo era que muitas pessoas estavam tendo uma reação Herxheimer muito forte. Eles se sentiriam muito pior antes de melhorar. Com o tempo, e com mais experiência, comecei a perceber que tomar doses menores de MMS1 mais olen ao longo do dia trazia melhores resultados. Talvez o motivo mais impolente para isso seja porque o MMS1 dura no seu sistema apenas uma hora, possivelmente uma hora e meia no máximo. Portanto, manter o MMS1 em execução em seu sistema de hora em hora é fundamental. Dessa forma, o MMS1 está atingindo os patógenos continuamente e não permite que os patógenos tenham tempo de se reagrupar e se

acumular. Em vez disso, sendo constantemente atingidos sem chance de se reagrupar, eles morrem oP. Este novo método funciona e vemos resultados claramente positivos.

Em 2009, fui para o Malawi, um pequeno país no sudeste da África. Enquanto estava lá, 800 casos de HIV / AIDS chegaram até mim. Essas pessoas tomaram apenas 3 gotas de MMS1 a cada hora, durante oito horas por dia, durante três semanas. Adivinha? As doses de 3 gotas, tomadas oito horas por dia durante 21 dias, foram de 99⁰/ o eletivo na erradicação do HIV / AIDS. Haviam sócinco falhas dos 800 casos, e destesquinto, as instruções não foram seguidas adequadamente de uma forma ou de outra.

Desde aquela época, centenas de milhares de pessoas tomaram 3 doses baixas de hora em hora e recuperaram a saúde. Essa mudança para doses menores por hora, em oposição a grandes doses com menos frequência, provavelmente representa o maior desenvolvimento das instruções anteriores.

Resumindo, com mais anos de experiência, aprendemos que a maioria das doenças (exceto a malária), são substancialmente mais responsivas a doses horárias de MMS1, distribuídas por um período de oito a dez horas diárias. Isso é mais eletivo do que 1, 2 ou 3 grandes doses por dia. Isso é verdade para o câncer e para a maioria das doenças. As pessoas têm usado protocolos de hora em hora nos últimos anos com um sucesso incrível. Existem algumas outras exceções à regra da dose por hora, além da malária, como o Protocolo 6 e 6 (consulte a página 169) e alguns dos Protocolos de Emergência (consulteCapítulo 12).

Portanto, para reiterar: por favor, não siga instruções que falam sobre 3 grandes doses de 15 gotas cada.(A não ser queé uma exceção à regra, conforme mencionado acima.)

A importânciade Doses Consecutivas

Seja diligente para tomar sua dose consecutivamente a cada hora, a cada hora. Por exemplo, em um protocolo de oito horas, não divida suas horas de dosagem, como quatro horas em

pela manhã, depois um intervalo de três horas, depois mais quatro horas no final do dia.

> Um princípio fundamental do MMS é que atacar os patógenos a cada hora não dá aos patógenos tempo para se reagrupar e se recompor, mas, em vez disso, sendo constantemente atingidos sem chance de se reagrupar, eles morrem oP.

Frasco de dose diária

Nos últimos anos, ensinamos o uso de uma dose diária. A principal inspiração para esta garrafa foi ajudarfacilitar as pessoas a tomar sua dose de hora em hora. No entanto, nósdesde então, concluíram que o benefício máximo de tomar MMS1 é derivado quando cada dose de hora em hora éfeito de fresco. Este fenômeno foi notado pela primeira vez commilhares de crianças autistas que usaram o frasco de dose diária por um amplo período de tempo. Então, quando as crianças foram trocadas para doses feitas individualmente efresco a cada hora, muito mais melhorias foram repolidas do que quando suas doses eram misturadas em uma garrafa parao dia inteiro.

Em meus 20 anos de trabalho com MMS, e ajudando pessoalmente milhares de pessoas, observei resultados gerais melhores na recuperação da saúde quando doses frescas misturadas individualmente de MMS1 foram usadas. Além disso, nossos muito ativos Ministros da Saúde em todo o mundo, que trabalham extensivamente com MMS e com um grande número de pessoas (aos milhares), também repetiram os mesmos resultados.

Se, por vários motivos, não há outra escolha a não ser preparar uma mistura para o dia todo em vez de misturar cada dose fresca a cada hora, é celainmente bem aguardar o seu tempo, e melhor do que não tomar nenhum MMS. Mas minha recomendação é, se

na medida do possível, limite-se a misturar novas doses de hora em hora. Você irátêm uma chance maior de melhorar muito mais rápido.

Nota: Uma dose diária envolve a mistura de todas as suas doses de MNS1 do dia em uma garrafa da qual você bebe uma certa quantidade a cada hora. Por exemplo, se você estava no Protocolo 1000, ele exige uma dose de 3 gotas de NNS1 (3 gotas é o máximo - você começa com menos), a cada hora durante oito horas consecutivas. Se fizer um boletim diário, você ativaria 24 gotas de NNS e adicionaria as gotas*a um volume de 1 litro / quarto de água purificada. Se você beber 4onças fora do estômago, você teria uma dose de 3 gotas.*

Pode haver uma série de razões pelas quais inventar um*dose de hora em hora fresca*de MMS1 pode parecer desafiador e nãopossível.Talvez alguém tenha um emprego onde dirija muito.Misturar uma dose enquanto dirige não é fácil, nem eu recomendo. Eu descobri, no entanto, ao receber sub-feedback substancial de pessoas ao redor do mundo, queOnde há uma vontade, há um caminho. Considere que o seusaúde é wolh o ePo1 para encontrar uma maneira de misturar o seudoses de hora em hora. Pode ser tão simples quanto carregar seu MMSe garrafas de ácido ativador em um saco Ziploc.

Pontas

¥ • Quando você estiver em trânsito, pode querer ter pequenasFrascos de 15 ml (1/2 onça) de MMS e ativador de ácido para carregar na bolsa ou no bolso. (Estes podem ser recarregadosquando necessário de suas garrafas maiores em casa.)

X Se você estiver em trânsito e estiver entrando e saindo do escritório, do carro, das reuniões, preso no trânsito e assim por diante, comprando uma pequena bolsa potável ou lancheira para guardarseus suprimentos MMS disponíveis

epronto para acompanhá-lo em todos os momentos pode ser útil. Tudo que você precisa é o seufrascos de MMS e ativador ácido, um pequeno 4 onças / 120 mltamanho de vidro, e umgarrafa ou duas de água purificada. Como uma regra,

Eu não recomendo misturar e beber suas doses em copos plásticos, o vidro é o preferido. Mas se você estiver em trânsito, pode ser conveniente levar pequenos plásticos descartáveisxícaras, tamanho de 4 onças / 120 ml. Isso não seria o que vocêusar o tempo todo, mas quando você estiver em movimento, pode serútil.

¥ • Se e quando ainda não for conveniente fazer todos os itens acima, e você se encontrar em situações em que pararmisturar sua dose não é possível; uma alternativa a sucumbir ao uso de uma dose diária de // como regra, em vez da exceção, seria apenas pré-misturar doses para as horas em que não há outra escolha.

Por exemplo, digamos que você é um professore você tem que ficarna frente de sua classe por duas ou três horas. Você sabe emadiantado você não pode se desculpar para misturar uma dosedurante esse tempo.Neste caso, misture 2 ou 3 doses em um frasco de antemão. Beba sua dose de hora em hora daquela garrafadurante o tempo você não pode escapar para misturar um novodose. Em quase qualquer situação, é aceitável ter um*água potável*na mão. Então,quando possível, volte paramisturar suas novas doses de hora em hora. Isso ajuda a ser capaz decontinuar com doses de hora em hora consecutivas, sem quebrar o ciclo de 8 ou 10 horas dos protocolos.T u d o D o s e s M M S 1 são geralmente tomados em 4 onças / 120 ml de água (ou outrolíquido compatível). Tente encontrar frascos de 4 onças / 120 ml e pré-misture a quantidade de doses que você vai precisar, individualmentegarrafas. Ou, se você sabe que precisa de duas horas dedoses pré-misturadas, uma garrafa de 8 onças / 240 ml faria, oupor três horas um 12 onças / 360f r a s c o d e m l . V o c ê p o d e q u e r e r u s a r u m a m a r c a i n d e l é v e l c a n e t a p a r a

marcar o seu frasco em Seções de 4 onças / 120 ml. Encontre o que funciona melhor para você.

Este método é uma combinação do frasco de dose pré-fabricadoe misturar novas doses de hora em hora. Lembre-se, doses novas misturadas são melhores, mas resolva esta combinação das duas - doses frescas e doses preparadas com antecedência

em uma garrafa, quando não há outra escolha. Mantendo-se comdoses consecutivas de hora em hora são indelicadas.

Como testar se seu MMS é bom

Ao ativar o MMS, é muito importante que as gotas de MMS e do ativador mudem para a cor âmbar nos primeiros 30segundos. Neste livro, quando dizemos âmbar, estamos nos referindo a uma cor marrom. Isso pode ser qualquer lugar de luz amarrom escuro, mas não amarelo. A cor âmbar do MMS ativado cai antes de adicionar água, é muito parecido com ocor de uma garrafa de vidro âmbar (como a que é usada paraóleos, várias poções medicinais ou para garrafas de cerveja), quandoerguido contra a luz.

Misture uma dose de 3 gotas de MMS1 para fazer este teste, se você usar menos gotas será difícilj u l g a r a c o r . É melhor realizar este teste em uma sala com boasiluminação.Depois de misturar as gotas (antes de adicionar água), segure o copo contra um fundo branco ou de cor clara e olhe através da lateral e do fundo dovidro (onde estão suas gotas) com o nível do vidro com seus olhos; neste ângulo, você estará olhando através de seumistura de gota. Sevocê olhar para o vidro, as gotas irão parecer mais claras em um amarelo, mas se você olhar as gotas ao nível dos olhos (com boa iluminação) você verá uma mais escurasombra - isto é, âmbar. Embora fique escuro, também deve ser transparente (transparente). As gotas devem aparecerâmbar na cor. A cor âmbar vai desbotar e se tornarluzamarelo em cerca de 15 minutos. Não deixe a soluçãosente-se por mais de um minuto antes de consumi-lo, pois iráperder potência.

A cor âmbar é um indicador impolente de que a mistura das gotas está correta. Você está misturando dois líquidos claros, MMS e um ativador. Se os líquidos forem misturados de acordo com as instruções, eles

mudarão de cor e ficarão âmbar. Esta cor âmbar indica que você tem os líquidos corretos

e uma mistura correta. Muito poucos dois líquidos claros podem produzir esta mesma cor.

Se suas gotas não ficarem âmbar nos primeiros 30 segundos de mistura, algo está errado com seu MMS e / ou com seu ácido, e esta mistura pode não trazer os resultados desejados. Você pode tentar misturar uma dose mais uma vez, para ter certeza de que fez isso corretamente, mas se ainda houver luzamarelo enão de cor âmbar, você pode usar essas gotas parapor enquanto, enquanto você tenta obter bons MMS eativador de ácido. Mas eu sugeririavocê não usa esta solução (amarelo claro, não âmbar, gotas) por mais de umsemana ou assim. Se a solução pelo menos não ficar amarela, não a use.

Vários fatores podem pesar quanto à cor das gotas, como o tipo de vidro que você está usando, certificando-se de que o vidro está completamente seco para endurecer, o número de gotas que você está misturando, a cor de fundo da parede, o tempo do dia e quanto naturala luz está na sala e assim por diante. Se você não está obtendo a cor certa e tem certeza de que seguiu as instruções corretamente, tente misturar as gotas algumas vezes em diferentes condições. Por exemplo, use um vidro diferente (algumas qualidades de vidro destolam) e certifique-se de que o vidro esteja limpo o suficiente - sem depósitos de sabão. Segure suas gotas contra uma parede branca, uma geladeira branca ou um fundo claro ao testar a cor. Em caso de dúvida sobre a cor, misture uma dose de 6 gotas durante o teste. Teste suas quedas em várias condições, antes de determinar o seu gotas são insuficientes.

Nota: Se você estiver usando um ácido alternativo, como limão,*limão ou vinagre em uma proporção de gota de 1 para E com MMS, seuas gotas não ficarão na cor âmbar. Neste caso, se você quiserpara*teste se o NMS é bom, misture uma dose de 3 gotas de*MMS1 (seriam 3 gotas de MMS e 15 gotas delimão, lima ou vinagre) e espere três minutos. Então adicione*

1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água e teste o ppm, que deve ser 2E ppm. (Para testar o ppm, consulte a página278.)

Água - o líquido ideal para misturar uma dose de MMS1

¥ •O ideal é tomar sua dose de MMS1 somente em água. As doses de MMS1 devem ser tomadas em 1/2 xícara de água (isto é4 onças ou 120 ml), ou água mineral. Crianças geralmenteprecisa de menos de meia xícara de água. Quando uma criança toma 1queda de MMS1ou menos, ele deve usar 1/4 xícara de líquido.

¥ •O MMS1 deve ser ingerido para beber água (purificada) - nunca da água da torneira com cloro, ñuoreto ou outras toxinas adicionadas, pois isso anulará a eficácia do MMS1 e pode até fazer você adoecer. Normalmente, é melhor comprar água engarrafada. Lembre-se de que nem toda água engarrafada é criada da mesma forma. Não presuma automaticamente que só porque é engarrafado é mais seguro, limpo ou puro do que a água da torneira. Algumas águas engarrafadas contêm flúor, cloro ou outras substâncias nocivas. Portanto, verifique sua fonte de água. Leia os rótulos e / ou verifique com os fabricantes para saber o que você está comprando. Água destilada ou água de osmose reversa também pode ser usada.

Cuidado: lembre-se de que a maioria dos lugares do mundo usa uma forma tóxica de cloro como purificador de água. Pior do que isso, muitos lugares adicionam flúor extremamente venenoso à água porque, infelizmente, há cerca de 50 anos os médicos convenceram o público de que o flúor ajuda os dentes. O flúor é um dos produtos químicos mais venenosos conhecidos pelo homem. Não há evidências de que ajude os dentes e há centenas de milhares de adolescentes que apresentam dentes com manchas.

Use uma água potável engarrafada de boa qualidade para esses protocolos, a menos que você obtenha água de uma nascente ou poço de água pura ou tenha um filtro de osmose reversa. Água destilada também pode ser usada.

Fator Gosto / Como Melhorar o Gosto de MMS1

¥ 'Por que as doses de MMS1 têm um gosto extremamente ruim para algumas pessoas? Notamos que algumas pessoas desenvolvem extrema repulsa ao tomar MMS1 em um momento ou outro durante um protocolo de MMS. Às vezes fica tão ruim que as pessoas simplesmente não agüentam mais. Acho que pode haver uma explicação. Possivelmente, os patógenos criam a aversão ao MMS1 como um mecanismo de sobrevivência para os patógenos impedir que a pessoa envolvida continue a tomar o que quer que possa destruí-los. Em qualquer caso, se isso acontecer com você, é bom esperar que você faça o que puder para tentar superar a aversão a tomar MMS1. Esforçar-se para manter uma atitude positiva pode ajudar, então tente uma ou algumas das coisas mencionadas abaixo para ajudar a superar o problema do paladar.

¥ • Muitas pessoas concordam que as doses de MMS1 ativadas com4% HCI (ácido clorídrico) tem melhor sabor do que aqueles ativados com ácido cítrico 50%. Se você estiver usando ácido cítrico e o sabor for incômodo, tente mudar para HCI. É realmente um assunto pessoal - veja o que funciona melhor para você.

X Embora a água seja o ideal, sevocê não pode tomar MMS1 só com água, porque o sabor incomoda, alguns (nãotodos) sucos naturais podem ser usados se não tiverem conservantes prejudiciais e / ou adição de vitamina C ou ácido ascórbico, comoisso cancelará a ePetividade do MMS1. Suco frescoé melhor. Encontramos suco de maçã, uva e cranberrypara funcionar bem com MMS1, mas, novamente, deve ser natural, sem conservantes e sem adição de vitamina C (ouácido ascórbico). Nunca use suco de laranja ou tangerina em qualquerformulário com MMS1. Você pode ter esses sucos pelo menos

doishoras antes ou aler seu protocolo MMS1 para o dia.

X Muitos chás não são compatíveis com MMS. No entanto, existem alguns chás de ervas que são compatíveis. Isso pode variar dependendo do chá que você está usando, ou seja, o chá fresco

*erva*ou um saquinho de chá que possivelmente contém algum tipo de contaminante. Use o método de tira de teste descrito na página278 para ter certeza do que é compatível.

X Alguns refrigerantes funcionam bem com MMS1: Coca, Pepsi, Sprite,7-Up e Canada Dry Ginger Ale (use apenas o originalfórmulas; não use refrigerante diet ou "Light" ou "Zero").não recomendo o uso dessas bebidas a longo prazo, oupara o Protocolo 1000 (devido ao conteúdo de açúcar), já que você o beberá 8 vezes ao dia. Eu sugeriria água mineral com gás como uma escolha melhor porque não contém açúcar. No entanto,se o gosto for um problema, para alguém que está gravemente doente,tomar uma dose de MMS1 em refrigerante é melhor do que não tomar. Você pode misturar sua dose em um tamanho de 4 onças / 120 mlxícara e adicione 1 onça de Pepsi, por exemplo, e o restoágua - isso pode ser refrigerante suficiente apenas para cobrir o gostode MMS. Mas, em muitos casos, apenas água mineral (com efervescênciae sem açúcar) ajuda a superar o sabor.

Nota: Embora eu tenha testado essas bebidas ocasionalmente com MMS muitas vezes, percebi que as empresas de refrigerantes tendem a ajustar suas fórmulas de tempos em tempos, e muitas vezes variam de um país para outro. O mais seguro*maneira de saber se sua bebida é compatível com MMS1, éTeste a bebida com uma tira-teste de dióxido de cloro. (Consulte a página 278 para obter mais informações sobre essas tiras de teste produzidas pela LaMoNe Company e como usá-las para testar a compatibilidade com MNS1 e vários líquidos.)tiras de teste não estão disponíveis e um pemon está em um protocolo usando uma bebida especial ou suco bebido como batedeira, mas não obtendo nenhum resultado após cinco ou seis dias, eu sugiro fortemente que você*

mude para outro líquido para beber sua dose.

O cheiro X pode ter um grande efeito no paladar. Se você achar que não tem estômago para o sabor do MMS1, tente mudar a forma como você bebe sua dose. Algumas pessoas chegam a tapar o nariz enquanto bebem a sua dose. Uma garrafa ou copo de boca pequena, ao contrário de uma boca larga, pode fazer maravilhas. Usando

uma garrafa de boca pequena não permite que seu nariz fique dentro do recipiente que está liberando dióxido de cloro (Cl02).Copos e garrafas vêm em todas as formas e tamanhos. Seja criativo! Fique atento - uma garrafa vazia de suco ou pote de algum outro produto pode ser útil. Pesquisaro que funciona certo para você.

XSe você gostaria de diversificar e usar vários sucos, ou refrigerantes diferentes dos mencionados neste livro para misturar com o MMS1, como regra, é uma boa ideia testar a compatibilidade com o MMS. Use a tira-teste mencionada anteriormente nesta seção (consulte as instruções na página 278).

X Algumas pessoas sugeriram o uso de estévia para melhorar o sabor de suas bebidas MMS1. Descobrimos que a qualidade da estévia varia. Alguns são altamente processadose algumas marcas / tipos anulam a ePetividade deMMS1. Se você quiser usar estévia, sugerimos que use tiras de teste (consulte a página 278) para confirmar se o tipo que você está usandoé compatível com MMS1. (Uma empresa chamada SweetLeaf @faz estévia líquida e sua simples sem saborSteviaClear @ drops são compatíveis com MMS1. Se vocêsdeseja usar os vários sabores de SweetLeaf @ stevia, novamente, use as tiras de teste para ter certeza de que é compatível comMMS1 - a compatibilidade pode variar de sabor para sabor.)

X Nós pessoalmente preparamos um jarro de água com água purificada e um pouco de mel e o guardamos na geladeira para misturarcom bebidas MMS1 ao longo do dia. Isso ajudou ogosto ao gosto de algumas pessoas. No entanto, sugerimosporque existem muitas qualidades e tipos diferentes de mel (e algum mel é bastante adulterado)Aquilo novamente, a coisa mais segura a fazer seria testar sua bebida com água com mel. Use o método da tira de teste, para ter certeza de

que o tipo de mel que você está usando é compatível com MMS1.

¥ •O u t r a m a n e i r a d e m e l h o r a r o s a b o r d e u m a d o s e d e M M S 1 é usar água fria em cada dose. Para isso, basta manter uma garrafa de água purificada na geladeira.

X Independentemente do que você escolher para misturar com MMS1, tente beber imediatamente, de modo que não passem mais de 60 segundos desdena hora em que você começou a mixar.

MMS1em uma cápsula (para eliminar o sabor)

Outro método de tomar gotas de MMS1 que ajuda a eliminarnate o sabor é usar cápsulas vegetais ou de gel.

Passo 1

0 Tenha seus suprimentos em mãos. Para este método, você precisará de cápsulas vazias e um conta-gotas, além das gotas, e de um copo limpo e seco para ativá-los. Também precisará de água potável nas proximidades para poder tomar a cápsula imediatamente após a sua preparação. Veja o chal na página 46 para o tamanho correto das cápsulas a serem usadas para a dose que você está tomando.

Passo 2

0 Ative a quantidade correta de gotas para a sua doseem um copo e conte 30 segundos.

0 Pegue imediatamente o conta-gotas, aspire as gotas ativadas do copo e coloque com cuidado-los na cápsula.

0 Empurre a tampa da cápsula para fechar e verifique se está bem colocada.

0 Tome a cápsula com pelo menos 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água imediatamente. Não espere depois de encher a cápsula, pois as gotas começarão a derretê-la.

Notas

> Não ative o MMS na própria cápsula.A pressão gerada dentro do pequeno espaço da cápsula durante o processo de ativação pode fazer com que a cápsulase desfaça enquanto você engole. Portanto, certifique-se de sempre ativaras gotas em um copo limpo e conte 30 segundos antesvomitando as gotas ativadas na cápsula.

b O tamanho da cápsula de que necessita depende do tamanho da dose que pretende tomar. (Veja o gráfico abaixo). Lembre-se de que se você estiver preparando uma dose de 3 gotas para colocar em uma cápsula, na verdade será o dobro de gotas, porque cada dose deve ser ativada com gotas iguais de ácido cítrico a 50%quedas ou quedas de 4% de HCl.

Tamanho e dosagem da cápsula MMS1	
Tamanho da Cápsula	Gotas totais
Tamanho 4: contém uma dose de 3 gotas	total de 6 gotas
Tamanho 3: contém uma dose de 4 gotas	total de 8 gotas
Tamanho 2: contém uma dose de 5 gotas	total de 10 gotas
Tamanho 1: contém uma dose de 6 gotas	total de 12 gotas
Tamanho 0: contém uma dose de 7 gotas	total de 14 gotas




2 cm
1 cm
0
1
2
3
4

b Observe que à medida que o número da cápsula fica menor, ocápsulas realmente são maiores em tamanho. É possível, use um tamanho de cápsula que seja mais próximo do tamanho da dose que você está indopegar. Você pode usar uma cápsula de tamanho # 0 (o tamanho grande) paratome qualquer tamanho de dose, mas muitas pessoas Não conseguem engolir facilmente # 0 cápsulas. Usando o tamanho da cápsula que corresponde aa quantidade de gotas em sua dose é a melhor.

!> Se você tiver problemas para engolircápsulas ou comprimidos, então este método provavelmente não é uma boa idéia para você. Também nãosugerido para crianças pequenas.

Simplesmente não consigo aguentar mais uma gota

Aqui, gostaria de abordar uma situação em que alguém sente que simplesmente não consegue aguentar mais uma gota de MMS. Pode sereles estão em um protocolo há algum tempo e eleschegar a um pontoonde eles não estão sentindomuito bom (provavelmente porque uma onda de toxinas está sendo liberada no corpo e causando uma sensação de mal estar). Ou, talvez eles não fossem tomando qualquer MMS1, mas eles ficam doentes por um motivo ououtro, e se sentem tão mal que simplesmente não sentem quepode tolerar MMS1.

Há um processo indelicado em jogo aqui que eu tenhoobservado nos últimos 20 anos, ou seja, aquelecorpo pode desenvolver uma repulsa ao MMS que vai longealém do mau gosto.Eu vi isso uma e outra vez. Acredito que seja criado pelos patógenos. Pense nisso comoum tipo de mecanismo de sobrevivência que protege a doença. Quando a doença sentir que algo que a pessoa está comendo ou tomando pode destruí-la, a própria doença colocaráum sinal que criauma repulsa dentro da pessoa paraa

substância que vai afetar(neste caso,MMS1). Esta repulsa pode surgir quando a pessoa assimtanto quanto até pensasobre como tomar MMS1. Quando issoacontece, o que eles podem fazer?

Se você está doente na cama e se sentindo muito mal, ou se a situação se desenvolve enquanto você está tomando MMS1 e chega a um ponto em que não consegue mais suportar a ideia de tomarmais uma gota - a seguinteprocedimentopode ser útil.

O princípio aqui é que você não quer parar de tomar MMS1 todos juntos. Mesmo o que parece ser uma quantidade muito, muito pequena de MMS1 obtida por horaa base pode funcionarpara ajudar a livrar o corpo de patógenos e recuperar a saúde. EmPara "manipular" o MMS1, por um período de tempo, você pode ter que reduzir sua dose para menos de 1 gota por hora.Alguns tiveram que reduzir sua ingestão para 1/2 gota, 1/4 de queda, 1/8 de queda e, em casos extremos, para 1/16 de quedahora. A ideia é - não desista! Mesmo um pouquinho de MMS por hora pode ajudar seu corpo a superar os problemaslem.

InsrucGons

Passo 1

0 Consulte o Procedimento de piquetagem (consulte a página 79) para obter instruções sobre como preparar uma dose de 1/4 de gota. Depois de preparar uma dose de 1/4 de gota, você pode tomar 1/2 para fazer uma dose de 1/8 de gota. Ou tome 1/4 da dose de 1/4 de gota para fazer uma dose de 1/16 de gota. Prepare e tome qualquer pequena dose que você escolheu para váriashoras ou um ou dois dias.

Passo 2

0 Uma vez que você está comendo confortavelmente a pequena quantidade, aumentando gradativamente a dose por hora. Aumente

lentamenteem um ritmo com o qual você se sente confortável.

0Continue aumentando lentamente ou fique abaixado. Algumas pessoas serão capazes de obter uma dose de até 1/4 de gota e, em seguida, continuar

para aumentar sua dosagem de forma constante. Mas há alguns que, por vários motivos, não conseguem aumentar a ingestão de MMS além de uma quantidade bastante pequena, mas conseguem ficar bem com doses baixas. Isso é explicado mais detalhadamente no Capítulo 5, Plano de Recuperação da Saúde (HRP) e no Capítulo 6, Os Protocolos Principais.

Nota: Se você não seguiu um protocolo e ainda não tomou DNS0, mas recentemente ficou doente o suficiente para estar na cama e está se sentindo muito deprimido, não*tente usar DNSO com MNS1 neste ponto, a menos que você tenhajá está usando o DMSO em um protocolo que você está fazendo.(Quando você está se sentindo tão doente que não quer pegar nada, é melhor continuar tentando pegar uma coisa de cada vezTempo. DNS0 adicionado ao NNS1, você está fazendo um esforço paratomar como está, pode aumentar a dificuldade. Tente aumentar sua resistência para tomar NNS1 fimt, antes de adicionar DNS0.) Não tente usar DMSO quando estiver tomando menos de 1 gotadoses.*

Armazenando MMS

A melhor maneira de armazenarMMS (22,4% de clorito de sódio emágua) está em garrafas de vidro âmbar ou verde, com um apertadotampa de plástico (não de metal) e na geladeira. É o ideal, mas nem sempre é possível. Se for âmbar ou vidro verdegarrafas não estão disponíveis, uma garrafa transparente serve, mas tentemantenha-o fora da luz (uma geladeirae s t á e s c u r o q u a n d o f e c h a d o) . Um lugar escuro e fresco será suficiente se o espaço da geladeira não foracessível. Se as garrafas de vidro não estiverem disponíveis, as garrafas de plásticocom tampas de plástico é o suficiente, mas tente encontrar garrafas com umnúmero 1 ou 2 dentro de um triângulo na parte inferior dogarrafa. Isso significa um plástico de melhor qualidade. (Classe de

plásticolocalizado com # 3 no triângulo não é recomendado.) Use garrafas com tampas de plástico como clorito de sódio (e clorodióxido de carbono também) acabará por dissolver uma tampa de metal.

Sentindo doente

Se ocorrer náusea, vômito, diarreia ou cansaço excessivoenquanto toma MMS1, (consulte a reação de Herxheimer na página 6)reduza imediatamente a dose pela metade, mas não pare de tomar MMS1, a menos que os sintomas sejam demais para controlar. Nesse caso, pare completamente até que a condição seja eliminada. Assim que os sintomas desaparecerem, volte à metade da quantidade que estava tomando antes de os sintomas ocorrerem. Se você reduzir a quantidade pela metade e as reações mencionadas acima continuarem, reduza pela outra metade. Reduza a ingestão de MMS1 em incrementosaté encontrar a quantidadevocê pode pegar sem causardoença do MMS1. Mesmo uma pequena quantidade deMMS1 de hora em hora irá ajudá-lo, então a ideia étente não desistir todos juntos, se possível. Quando você encontrar uma quantidade comfolable de MMS1 que você pode tolerar, mantenha-a por um a dois dias e, em seguida, tente aumentar sua ingestão lentamente até atingir a quantidade adequada para oprotocolo em que você está.

Nota: Se você estiver usando ácido cítrico 50% e sentir mal-estar, experimente HCl a 4%. Algumas pessoas não toleram o ácido cítrico.

Gestantes e MMS

Milhares de mulheres grávidas usaram o MMS1 para restaurar sua saúde quando necessário. A dosagem para uma mulher grávida é exatamente a mesma de quando não está grávida. Seguiros protocolos e determinar qual

dosagem é melhor para você. MMS1 quando tomado de acordo com os protocolos neste livronão prejudica o corpo e, portanto, pode ser consideradoseguro para todas as pessoas, incluindo mulheres grávidas, crianças,e bebês. (Siga as dosagens adequadas para crianças e bebês listadas neste livro - veja o Capítulo 13.) Todos são responsáveis por tomar suas próprias decisões sobre saúde. Consulte um profissional de saúde qualificado, se desejar.

Comer durante os protocolos MMS

As doses de MMS1 não devem ser tomadas às refeições. Enquanto que naos protocolos, é melhor planejar suas refeições em torno de seudosagem. Espace a dose e as refeições de MMS1 em 20 a 30minutosa partir do momento em que toma a sua dose. Por exemplo,se você tomar sua dose de MMS1 às 8h00, o café da manhã pode ser às 8h20-8h30, e sua próxima dose às 9h00. Seu café da manhã deve ser relativamente simples e pequeno e levarnão mais do que 10-15 minutos para comer. Da mesma forma se você tomaruma dose de MMS1 ao meio-dia, o almoço pode ser às 12h30e assim por diante.

Durante as horas em que você está no protocolo, é melhor tentar comer refeições menores e / ou lanches, ao invés de refeições muito grandes. (Não me interpretem mal, você pode comer enquanto toma MMS1, apenas evite as refeições maiores durante as horas em que está tomando suas doses.) Isso pode ser feito de várias maneiras - ajuste de acordo com sua rotina diária. Por exemplo, se você interromper seu protocolo bem cedo pela manhã, digamos às 8h, oito horas mais tarde seriam 15h, que seria o horário de sua última dose. Se você fez refeições ou lanches menores durante este período de dosagem de oito horas e terminou sua última dose às 15h, isso significa que por volta das 17h ou mais tarde, você poderia ter a maior refeição do dia.

Algumas pessoas preferem interromper a dosagem no final do dia, de modo que estejam livres nas primeiras horas da manhã para beber suco de laranja, uma xícara de café ou chá (consulte a página 56 para maisinfo). Se uma pessoa suspende sua dosagem às 15h, por exemplo, a última dose seria às 22h se estiver no protocolo de oito horas. Isso significa que antes das 13h elespodem tomar café, chá ou suco de laranja - coisas quenão são compatíveis com MMS1 e MMS2 -

pelo menos doishoras antes de estabelecer o protocolo. A ideia é ajustarsua dosagem para atender às suas necessidades e programação. Veja o quefunciona para você.

A ePectividade do MMS pode ser cancelada quandomisturado com alimentos celain que são particularmente ricos emantioxidantes. eu não tenhotinha tempo ou recursos parafaça um estudo completo de todos os alimentos do planetapara ver o que realmente cancela o MMS.Mesmo se eufez, há muitos fatores que podem pesar na equação de saber se um alimento celain está cancelandofora a ePetividadede MMS. Por exemplo, se o alimento é GM0, o que são os pesticidaspresente, quais tipos de aditivos estão na comida, quepode ter influência, etc. Se você estiver muito doente com uma doença potencialmente fatal, para ter certeza absoluta de que algosua dieta está cancelando MMS ou não, eupode sugerir o usoas tiras de teste (consulte a página 278) para testar a compatibilidade do MMS com tudo o que você come. Isso pode ou não ser viávelpara você.

Deixe-me dizer que, só porque um alimento é rotulado como antioxidante, ele pode não ser particularmente rico em antioxidantes e, portanto, não é certo que ele necessariamente cancelará o MMS. Continuaremos a tentar fazer mais testes em uma ampla gama de alimentos para ver o que é compatível com o MMS e o que não é. Porém, as pessoas tomam o MMS há 20 anos e recuperam a saúde sem ter tantos detalhes definidos. Este livro fornece algumas orientações sobre o que evitar ao tomar MMS. Não tome alimentos ou suplementos que sejam particularmente ricos em antioxidantes. Além disso, anote o que está ou não funcionando para você. Se você não parece estar obtendo resultados com o MMS depois de um tempo razoável no protocolo, analise seriamente sua dieta e veja se algo pode ser eliminado e você pode suspeitar que esteja em conflito com o MMS. Se você está acostumado a comer muitos itens em uma refeição, considere escolher um menu que tenha menos ingredientes. Seguir uma mono dieta (ou pelo menos

uma mono dieta pa1ial) durante o tempo em que você está no protocolo pode ajudar.

Para Resumir

- Não tome uma dose de MMS com as refeições, espaçoo consumo de alimentos e sua dose de MMS1 por20-30 minutos.

- Durante as horas em que você está realmente tomando suas doses de MMS, tente não comer grandes refeições do tipo “banquete”, mas sim comer refeições menores e / ou lanches.

- Não coma ou beba coisas que neutralizam o MMS durante o horário de administração. (Veja as páginas 42-45, 56.)

- Se você não parece estar tendo sucesso depois de um tempo razoável, considere simplificar sua dieta. Tente eliminar coisas que possam ser suspeitas de cancelar o MMS.

Suplementos Nutricionais e o HRP

Existem duas razões básicas para fazer o HRP (Plano de Recuperação da Saúde - ver Capítulo 5):

1. Para erradicar uma doença e recuperar a saúde.

2. Para fins de limpeza, para desintoxicar e, assim, se livrar devenenos no corpo, que podem ajudar a eliminar uma série de problemas de saúde, tanto pequenos como grandes.

Se você tem uma doença de qualquer tipo, a decisão é simples. O que você quer fazer é eliminar a doença.

Quando alguém está doente, e especialmente se estiver gravementedoente, é um bom momento para a pessoa parar e examinar várias coisas, como sua dieta e estilo de vida. Comer bem, exercitar-se bem e viver bem, tudo contribui para

boa saúde. Embora uma boa nutrição seja prejudicial para o corpo ficar bem, quando alguém segue os protocolosdescrito neste livro, pode realmente ser útil axóide tomar suplementos nutricionais por um tempo. Isso ocorre porque os patógenos também se alimentam de boa nutrição, então, de certa forma, se você está tomando suplementos nutricionais enquanto os patógenos ainda estão vivos, você está construindo com uma mão ederrubando com o outro. Além disso, alguns nutrientessuplementos neutralizam MMS.

Isso é especialmente verdadeiro com o câncer e uma série de doenças importantes - quando você inicia os protocolos, não é o momento de aumentar simultaneamente o aumento de suplementos nutricionais extras. Nesses casos, eu sugeriria que é melhor deixar de tomar suplementos por duas a três semanas, e possivelmente até várias semanas, dependendo da situação. Porque, como eu disse, as células cancerosas e outros patógenos podem alimentar uma boa nutrição. Você não quer fazer nada para encorajar o câncer ou outras doenças a vivermais ou multiplique. A ideia é matar de fome e matar a doença, não dar mais para ela prosperar.

Se você tiver uma doença grave, como mencionado acima, sus-pendurar ou não perder nenhum suplemento quando começar a tomarMMS - tente dar tempo suficiente para destruir o patho-gens antes de adicionar suplementos. Por outro lado, se você realmente sente a necessidade de algum tipo de suplemento que você sabe que é bom, ou que já experimentou, vocêpode querer adicioná-los em algum ponto (como sugeridoacima, eu diria que não antes de duas a três semanas para as principais doenças) e ver como você se sai. É imperativopreste muita atençãode como seu corpo está reagindo. Sevocê está se sentindo bem e melhor com a adição deum (s) suplemento (s) e, em seguida, continue. Não mude enquantovocê está melhorando. Mas se você adicionar suplementos,

(mesmoembora você os tome em um momento diferente do seu MMSdoses), e você não está progredindo e ficando bem, ousua cura está indo muito devagar, então pode ser

melhor suspender os suplementos novamente por um período deTempo.

Se estiver tomando suplementos, é muito indelicado separá-los dos horários em que você está tomando suas doses de MMS por pelo menos duas horas, ou até mais, se puder. Nunca tome suplementos ao mesmo tempo em que toma sua dose de MMS.

Existem quase tantas teorias nutricionais hoje quantohá pessoas. Mas nossas observações indicam que é melhor usar o MMS para matar as células cancerosas e as doenças, sem promover nenhum aumento nutricional especial para o corpopor um tempo. Então, uma vez que a doença é eliminada ou bastante reduzida, pode-se construir o sistema imunológico por meioBoa nutrição. É um processo passo a passo. Desintoxique primeiro, antes de introduzir quaisquer novos suplementos nutricionais ealimentos.

Se você não tem uma doença grave, mas apenas deseja se livrar de várias toxinas e metais pesados e eliminar outras coisas, como problemas de pele, articulações doloridas, várias irritações incômodas e uma miríade de outras doenças que não são necessariamente fatais , então você pode começar a suplementação a qualquer momento após a primeira ou duas semanas do protocolo, se achar que os suplementos serão benéficos para você. Mas os mesmos princípios se aplicam, se você acha que não está obtendo benefícios suficientes com seu protocolo MMS, tente suspender os suplementos por um período de tempo e veja como você se sai.

Sempre que você estiver tomando vitaminas e suplementos enquantoadministração com MMS, certifique-se sempre de separar os horários em que as toma dos horários em que toma as suas doses de MMS, em pelo menos duas horas. Se possível, tome suas

doses de MMS no primeiro amigo do dia. Então, quando você tiver concluídosuaprotocolo do dia, duas horas após o seu último MMSdose, comece a tomar suas vitaminas e suplementos. Isto

nem é preciso dizer que, se você continuar tomando vitaminas e suplementos, evite produtos sintéticos e artificiais. É sempre melhor tentar comer alimentos integrais nutritivos.

Comida e bebidapara evitar quando em um protocolo MMS

- Ao tomar MMS1 ou MMS2, evite o álcool,chocolate, café, café decaPeinado, bebidas caPeinadas, chá (preto, verde e muitos chás de ervas), leite, cocoágua, suco de laranja, suco de tangerina ou qualquer bebida com adição de vitamina C (ácido ascórbico).

- Não tome alimentos ou suplementos que sejamPa1icularmente rico em antioxidantes, como moringa,pois essas coisas anulam a eficácia do MMS.Isso não quer dizer que você não possa ingerir nenhum desses alimentos se estiver tomando MMS. No entanto, quando em um protocolo palicular, é melhor esperar até que você termine suas doses de MMS para o dia antes de consumir oitens acima, ou pegue-os primeiro nomanhã, então espere duas horas antes de declarar MMSdosagem. Afaste-os por pelo menos duas horas de alertasua última dose diária, ou duas horas antes de declarar sua dose diária.

- Se você está lutando contra uma doença grave, pode suspender todos os suplementos por um tempo, conforme explicado na seção anterior sobre Suplementos Nutricionais e PRH.

Nota: Embora o chá esteja nesta lista de "não fazer", existem alguns (não todos) chás de ervas que são compatíveis com MMS 1. Use o método de tira-teste

descrito na página 278 para ter certeza do que é ou não compatível.

Capítulo 4

DMSO (Dimetil Sulfóxido)

DMSO (Dimetil Sulfóxido), é um suave, mas poderososubstância curativa. É um solvente carreador bem conhecido, usado amplamente desde 1955, por profissionais alternativos e alguns médicos, como uma forma de transportar medicamentos mais profundamente para os tecidos e órgãos do corpo. Tomado oralmente,tem sido usado para dissolver coágulos sanguíneos. Órgãos do corpo quesão usados para transplantes são submersos em DMSO 99,9% para transpolá-los entre hospitais, então DMSO nãotecido de cabana.

Alguns dos protocolos neste livro exigem o uso de DMSO em combinação com MMS1. (Por favor, note, você nunca tomaDMSO e MMS2 ao mesmo tempo. Consulte a página 27.) Esteprovou trazer bons resultados, pois o DMSO ajuda a transportar o MMS1 mais profundamente para os tecidos. O DMSO por si só também é capaz de aliviar a dor, diminuir o inchaço, reduzir a inflamaçãomação, estimulando a cura, antifúngica, dissolvendo coágulos sanguíneos, restaurando a função normal do corpo e muito mais. O DMSO é frequentemente usado por veterinários e treinadores esportivos no tratamento de entorses musculares e váriioslesões.Promove a cura aumentando o sanguefornecimento para a área da lesão.

Eu mantenho um pouco de DMSO disponível o tempo todo para uso caso umacidente ocorrer. Pode trazer um alívio incrivelmente rápido paraentorses e contusões, e

restaura a área lesada em questão de minutos se aplicado logo após o acidente. Em acidentes graves, pode ajudar a aliviar a dor e ajudar o corpo

curar mais rápido do que o normal. Quanto mais cedo for aplicado após o acidente melhor, mas se você não conseguir aplicá-lo logo após o acidente, ainda assim agilizará o processo de cicatrização, mesmo que haja demora no uso. Aplique DMSO diretamente na lesão. Você pode aplicá-lo com força total. Se queimar ou causar coceira excessiva, adicione um pouco de água, uma colher de chá ou algo assim, e esfregue suavemente. Continue adicionando água em pequenas quantidades, se necessário, até que o DMSO não desfaça.

Abaixo, você encontrará algumas informações úteis e coisas que você deve saber sobre o DMSO antes de usá-lo de acordo com os protocolos deste livro. Além disso, encorajo você a pesquisá-lo na internet, onde uma ampla gama de informações está disponível sobre o uso de DMSO.

DMSO - Onde e o que comprar

O DMSO está disponível em várias lojas, incluindo empresas de suprimentos para animais e varejistas online como a Amazon. Você deseja procurar a porcentagem (O/ o) de “pureza” na garrafa. Sea garrafa tem “99% ou 99,99 O/ o "pureza ou" puro "na garrafa e em nenhum outronúmeros, é a mais alta pureza.

Se possível, compre DMSO de força total (ou seja, 99% a 99,990/ o pureza). Você pode sempre diluir um pouco com água destilada, se necessário. Se você comprar DMSO, isso édiluído, compre um que só seja diluído com água.Às vezes é diluído com Aloe vera, e frequentemente éperfumado. Eu não recomendo usar esses. Leia os rótulose descrição do produto com cuidado. Se necessário, verifique comseu fornecedor para ter certeza do que você está comprando.

Notas

!> Alguém pode pensar que o DMSO não diluído é muito forte, mas tenha em mente que, na maior parte, nossos protocolos chamam

para misturar DMSO com água. Se você tomar em uma dose oral, está bebendo em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. Se você estiver usando no protocolo de patch, água também é adicionada, portanto, esses protocolos permitem diluí-la. Muitas pessoas podem aplicar DMSO não diluído diretamente na pele (esfregando ou usando um spray boKle) e eles funcionam bem. No entanto, se achar que isso é muito forte, dilua seu DMSO um pouco com destiladoagua. É melhor começar adicionandouma pequena quantidade de água, pois você sempre pode adicionar mais, se necessário.

b Se o seu DMSO foi diluído com mais de 10%água destilada, você pode adicionar uma gota extra desse DMSOpara cada gota de MMS1 que é usada no protocolo. Por exemplo, se o protocolo exigir 3 gotas de DNS0 por 1 queda de NNS1, use 4 gotas de DNSO por queda de NNS1.

!> É bem sabido que o DMSO tem uma espécie decheiro e sabor desagradáveis, no entanto, o DMSO de grau farmacêutico foi descrito como tendo quase nenhumcheiro ou gosto ruim./ t pode ser encontrado na internet e em*algumas farmácias. O custo é substancialmente mais alto.*

DMSO - Teste de Alergia

Muito, muito poucas pessoas, geralmente aquelas com fígado fraco, são alérgicas ao DMSO. Para verificar se você é ou não alérgicoexecute este teste:

0 Use água pura (não use sabão) e lave e seque uma mancha em seu braço. (Logo acima ou abaixo do cotovelofunciona bem.)

0 Adicione 1 gota de DMSO (com um dedo limpo) no local em seu braço e esfregue.

0 Dê ao DMSO cerca de 15 minutos para absorver e permitira área para secar.

Se não houver dor na área do fígado em 24 horas, provavelmente é seguro usar DMSO, o que será o casopara 999 em cada 1000 pessoas.

Uma vez que MMS1 cura o fígado, se você já toma MMS1 há mais de uma semana, seu fígado provavelmente irátolera DMSO sem problemas.

Se sentir dor no fígado após a aplicaçãoDMSO, sugiro que você trabalhe para melhorar a condição deseu fígado, fazendo o procedimento de estaqueamento e, em seguida,Protocolo 1000. Se você já está em um protocolo, mas ainda tem uma reação negativa ao DMSO, simplesmente continue com o protocolo e, por alguns dias, repita o mesmo teste novamentee deve mostrar tolerância ao DMSO. Se você falhar no testeuma segunda vez, continue com o protocolo e tente o testea cada dois dias até você passar. Nunca houvesido um repol de DMSO causando qualquer tipo de dano permanente a um humano desde que foi descoberto.

DMSO - Precauções de Segurança

X DMSOé um solvente e passa facilmente pela pele e pelos tecidos. Ele também carregará outras substâncias junto com ele, portanto, tome cuidado com o que você tem na pele antes de manusear o DMSO.

¥ • Se aplicar DMSO topicamente, certifique-se de que suas mãos eas unhas estão limpas e livres de contaminantes (incluindo saboneteresíduo) ao manusear DMSO. Você também quer ter certezaa área na qual você aplica o DMSO está limpa.

X Ao lavar uma área da pele antes de aplicar o DMSO, é melhor, se possível, usar sabão natural e sem produtos químicos para lavar as áreas de aplicação e as mãos. Esteja disponível ou não, certifique-se de que todo o sabão seja completamente enxaguado - ou não

use sabão algum. Simplesmente lave bem (esfregando a pele) com água limpa.

¥ •O melhor método para aplicar DMSO na pele é simplesmente usar as mãos nuas e limpas e secas ao esfregar o DMSO emseu corpo ou em outra pessoa.

¥ 'Se usar as mãos desprotegidas para aplicar DMSO, não use os dedoslixador de unha. O DMSO é um solvente que não apenas dissolve o esmalte, mas também carrega seus ingredientes tóxicos pela pele e pelo corpo. Você pode cobrir sua mão em um saco plástico de sanduíche (este tipo de plástico em geral é adequado para uso com DMSO) para aplicar o DMSO.

XDepois de manusear o DMSO, nunca o lave com sabão, pois pode levar o sabonete para a pele / tecidos. Basta enxaguar omãos bem com água limpa.

¥ • Mantenha o DMSO com força total longe dos olhos.

X Não use as luvas mais comuns (borracha, látex, etc.) com DMSO. Pode dissolver as luvas. Mesmo dissolvendo um pouquinho das luvas, você pode transferir a borracha ou o látex para o seu corpo. Luvas feitas de plástico não elástico podem ser usadas com DMSO. Normalmente o DMSO não bloqueia as mãos e as luvas não são necessárias. (Se aplicar com frequência ou em grandes quantidades para alguns tipos de pele, pode fazer com que a pele fique enrugada, mas isso passa rapidamente.)

X Nunca adicione DMSO a uma solução de enema. O cóloncontém muitas toxinas que o corpo está liberando. Se você colocarDMSO no cólon, você pode retornar algumas dessas toxinasde volta para a corrente sanguínea.

UVARNING

- Não permitir que o DMSO entre em contato comhipoclorito de cálcio(MMS2). Isso vai causarcombustão imediata com calor e fogo extremos. Neste caso, não precisa de uma faísca para endurecer o

disparar instantaneamente. Use água para apagar o fogo, mas recue, pois a água vai espirrar.

INGESTÃOVVARNING

- Nunca use DMSO em uma bebida enquanto ao mesmo tempo toma cápsulas de hipoclorito de cálcio (MMS2). O DMSO pode fazer com que o MMS2 aqueça e pode se tornar muito desagradável no estômago. (Se isso acontecer por acidente, beba bastante frioágua para aliviar qualquer desconforto.)

- Se adicionar DMSO a uma dose de MMS1, de acordo com o Protocolo 1000 Plus, por exemplo, você deve calcular no máximo 3 gotas de DMSO para cada gota de MMS1, edeve ser misturado com pelo menos 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água.

- Se estiver em um protocolo que exige o recebimento de MMS2 nono mesmo dia das doses de MMS1 / DMSO, você pode fazer isso,masa cápsula MMS2 deve ser separada pormeia hora das doses de MMS1 / DMSO. Nuncatome uma dose contendo DMSO e um MMS2cápsula ao mesmo tempo!

Wart do neto: Meu neto de 8 anos veio me visitar em um fim de semana e tinha uma verruga horrível e enorme no joelho. Na verdade, misturei três gotas de MMS e ácido cítrico e apliquei diretamente na verruga sem diluí-la emtudo. Isso o queimou um pouco, mas da próxima vez que vi meu neto, cerca de um mês depois, o corpo estava completamente pálido. Já se passou cerca de um ano e ele tem uma cicatriz onde

estava a cicatriz, mas nenhum sinal de outra verruga.
—Tina, Estados Unidos

capítulo 5

Plano de Recuperação de Saúde (HRP)

Fundo

Boa saúde no mundo de hoje pode ser difícil de alcançar devido ao nosso ambiente tóxico. Muitas pessoas têm complexoou vários problemas de saúde e superá-los pode exigir algum trabalho. Por isso desenvolvi este Plano de Recuperação da Saúde (PRH). Às vezes penso nisso como*Protocolo Naster Miracle,*e porque é uma combinação de vários protocolos, é realmente um Plano de Recuperação da Saúde (comorestaurar a saúde é um processo). A boa notícia é esta: se você seguir os fundamentos básicos, conforme descrito em nossoPlano de recuperação da saúde, depois de trabalhar com milharesdopessoas que suportam, estou confiante de que você ficará bem em umrelativamente pouco tempo, como outros fizeram. Lembre-se, o MMS não cura o corpo como tal, ele destrói os patógenos e oxida os venenos que impedem o corpo decurando-se. Use este plano, conforme apresentado neste livro, paratodas as doenças.

Como funciona

Este livro está repleto de uma série de protocolos que, quandoseguido corretamente, ajude a restaurar as pessoassaúde. Nossos protocolos-chave vão junto com uma série de protocolos de suporte para compor o Plano de recuperação da saúde.

É indelicado saber que existe uma sequência ou estratégia geral para o Plano de Recuperação da Saúde. Eu coloquei

aqui, no início deste livro, para uma visão geral e para fácil referência. Para aqueles que ainda não trabalharam com o MMS, neste ponto pode ainda não fazer sentido total como esse plano funciona, mas ficará claro à medida que você aprender os protocolos descritos neste livro.

O ponto importante é que há uma sequência de comopara usar os protocolos. Se a recuperação de alguém chegar a um impasse após o período de tempo aqui declarado, mantenhamente, isso é sempre uma indicação de que é hora de mudaralgo, vá para a próxima etapa e consulte frequentemente estaseção do livro conforme necessário.

> Todos os protocolos deste livro podem ser usados por crianças. Devem, no entanto, ser adaptados de acordo com o peso da criança. Consulte o Capítulo 13 para obter instruções sobre como ajustar as dosagens do protocolo para crianças.

Visão geral dos protocolos-chavepara a recuperação da saúde

Plano

O procedimento inicial é essencial para colocar cada pessoa com o pé direito de uma maneira fácil. Este protocolo exige doses muito pequenas de MMS1 por hora ema fim de acostumar o corpo a isso.

O protocolo 1000 é o nosso protocolo principal que mata patógenos de doenças, destrói venenos e remove metais pesados do corpo. Descobrimos que uma ampla gama de doenças foi superada apenas com o Protocolo 1000.

O Protocolo 1000 Plus é um procedimento que requer a adição de uma quantidade específica de DMSO à dosagem. O DMSO carrega o MMS mais profundamente nos tecidos do corpo para encontrar e eliminar venenos e patógenos ali escondidos.

O protocolo 2000 termina oP ou faz o que os protocolos 1000 e 1000 Plus não puderam fazer. Este é o nosso atacante que lida com doenças que estão tão bem estabelecidas que não podem ser alcançadas apenas pelos Protocolos 1000 e 1000 Plus. Este também é o protocolo principal para superar o câncer e a maioria das doenças fatais.

O protocolo 3000 simplesmente adiciona ao protocolo 2000 para torná-loainda mais eletivo. É uma forma adicional de obterMMS no corpo através da pele sem passar pelo estômago como nas doses orais.

O Protocolo de Molde / Fungo inclui a adição de argila de bentonita usada em conjunto com MMS1. Se você não estiver progredindo com os protocolos em que está, pode ser necessário mudar por um tempo para o Protocolo de Molde / Fungo. Você pode considerar declarar este protocolo imediatamente após o procedimento de piquetagem, mas antescontinuando para o Protocolo 1000, se você sentir que chegoucontato com mofo / fungo e suspeitar que o mofo é oraiz do seu problema.

Como mencionado acima, esses seis protocolos são nossos protocolos-chave na programação para recuperação da saúde. Existem vários protocolos de suporte para acompanhá-los, dependendo de qual seja a doença. Em muitos casos, as pessoas recuperam a saúde muito antes de concluírem todos os protocolos deste Plano de Recuperação da Saúde. No entanto, existem aqueles cuja doença exige que se vá mais além. Alguns dos protocolos de suporte tratam de problemas e doenças específicos e, portanto, é necessário adicioná-los (geralmente após o protocolo 3000, mas às vezes antes) enquanto estiver nos protocolos principais. As instruções neste capítulo o ajudarão a determinar isso.

Indian Herb - Em raras ocasiões (talvez 1 em 100) para cânceres extremos, pode ser necessário usar Indian Herb (ou Black Salve). Esta fórmula à base de plantas está à venda em

nos Estados Unidos por mais de 90 anos. Milhares de pessoas o usaram com sucesso. (Veja o Capítulo 10.)

Princípios fundamentais

As regras simples com nossos Protocolos MMS e os princípios fundamentais do Plano de Recuperação da Saúde, que nóschamar as Três Regras de Ouro do MMS, são as seguintes:

X Se você vir progresso - acompanhe o que está fazendo.Não mude nada. Não vá para o próximo protocolo. Não aumente para a próxima gota; ao melhorar, apenas continue fazendo o que tem feito até bem, ou até que você não veja mais nenhum progresso, caso em que você passaria para o próximo nível.

X Sempre que sentir náuseas, diarreia, vómitos ou cansaço excessivo e / ou se sentir pior do que a sua doença já está a causar, reduza a ingestão de MMS pela metade. Se esses sintomas continuarem, continue a reduzir pela metade até que você não se sinta mais pior do que a sua doença está fazendo. Então, quando os sintomas de Herxheimer (náuseas, diarréia, etc.) diminuírem, aumente lentamente até a dosagem adequada de acordo com o protocolo em que você está, mas não a ponto de se sentir pior do que sua doença já está fazendo você se sentir.

X Se você não vê nenhum progresso em direção à cura dentroum período de cinco a seis dias, em seguida, vá para o próximo nível - rampa- comece a aumentar sua ingestão de MMS. Dependendo de ondevocê está seguindo um protocolo, adicione gotas à sua dose,e / ou passar para o próximo protocolo. Cada vez que você adiciona um novo protocolo, não pare o que você já está fazendo.Adicione, mas não interrompa nenhum dos protocolos anteriores que vocêestavam seguindo.

Por exemplo, digamos que você esteja no Protocolo 1000 e, após o quinto ou sexto dia, notar alguma melhora em sua condição, seja ela qual for. Os sinais de melhoria

são um indicador para continuar com o Protocolo 1000, não mude nada, continue. Por outro lado, se você forno Protocolo 1000 e você completou cinco ou seis diasdo protocolo e você não notou nenhum sinal de progresso ou melhoria, então vá para o Protocolo 1000Mais e assim por diante.

Linha de protocolos para o plano de recuperação da saúde

Procedimento de início: sempre comece com o procedimento de piquetagem. Simultaneamente, junto com o procedimento de piquetagemClaro, fique travado com as Duas Etapas Fundamentais que são escovar os dentes com MMS1 e usar o spraygarrafa se houver algum problema de peleexistir. (As instruções completas são fornecidas nas páginas 73-78.) Além disso, se houver algumtumores externos no corpo, este é o momento em que também se começaria a aplicar o patch MMS1 / DMSO (página135).

Protocolo 1000: vá para o Protocolo 1000 e continuecom este protocolo, contanto que você veja algum tipo de melhoria. Mas quando há um período de cinco ou seis dias no Protocolo 1000 e você não vê nenhum sinal de melhora, a primeira coisa a fazer seria ter certeza de que o MMS não está sendo neutralizado por nada (verpáginas 42-45, 52, 56). Além disso, verifique a lista para outrosrazões pelas quais você pode não estar tendo sucesso com o MMS (Cap-ter 8). Então, se você estiver seguindo tudo corretamente evocê não vê sinais de melhora após cinco ou seis dias e, em seguida, passa para o próximo nível - que é o Protocolo 1000 Plus.

Protocolo 1000 Plus: Continue no Protocolo 1000 Plus enquanto houver melhora, mas novamente, se não houver melhora por um período de cinco ou seis dias,

vá mais uma vez para o próximo nível, que é o Protocolo 2000.

Protocolo 2000: Quando no Protocolo 2000, incluindo a tomada de MMS2 começando no terceiro ou último dia, contanto que você

estão melhorando continue com este protocolo. Mas se não houver sinais óbvios de melhora por um período de cinco ou seis dias, acrescente o Protocolo 3000.

Protocolo 3000: A1er adicionando Protocolo 3000, continue comocontanto que haja melhora, mas se houver um período de cinco ou seis dias e nenhuma melhora, você pode começar com os vários protocolos de suporte. Esses protocolos (explicada pela mulher neste livro) oferecem maneiras adicionais de ajudar seu corpo a se recuperar. Você continua adicionando mais protocolos até bem.

Protocolo de Molde / Fungo: Por último, mas definitivamente não menos importanteProtocolos Chaveno line-up, é oMolde / FungoProtocolo.Se você não está obtendo sucesso com os Protocolos 1000 a 3000, considere mudar para o Protocolo de Molde / Fungo por um tempo. Existem muitas doenças causadas por bolores / fungos, portanto, leia atentamente os detalhes explicados no Protocolo de Molde / Fungo na página99

O molde é um tipo de fungo. Eu aprendi ao longo dos anos,que existem alguns tipos de fungos que MMS1 eMMS2 não parece matar. No entanto, descobri quequando este for o caso, geralmente a argila irá lidar com o problemalem. Então, se alguém não está obtendo os resultados desejados comMMS1 ou MMS2, pode ser um indicador de quemofo / fungo está causando a doença e isso seria umsinal para adicionar argila ao seu protocolo.

Outro ponto indelicado é que acredito, assim como alguns médicos e profissionais de saúde, que algumas variedades de mofo / fungo podem atuar como uma espécie de escudo protetor para algumas

doenças do corpo. Quando este for o caso, alguns patógenos podem não ser superados pelo MMS porque o molde que está presente fornece uma quantidade de celain “proteção” para eles. Neste caso, se erradicarmos o molde

primeiro com argila, à medida que os outros patógenos perdem sua “proteção contra fungos”, o MMS também é capaz de destruí-los.

Isso pode acontecer com Lyme e Candida e possivelmente outras doenças. A própria Candida é um fungo e a argilapode ajudar a eliminá-lo. Mas se outros tipos de fungo também atuam como um escudo protetor para a Candida, então éÉ importante lidar com esse problema primeiro, para que o MMS possa fazer seu trabalho. Você pode suspender qualquer protocolo que estiver executando e fazer o Protocolo de Molde / Fungo a qualquer momento que achar necessário. Interromper o Protocolo de Molde / Fungo iránão será um problema e não prejudicará o progresso que você já alcançou e, depois de concluir o Protocolo de Molde / Fungo, você pode voltar ao protocolo em que estava e continuarc o m ele até a saúde plena é recuperado.

Notas

!>Seao tomar NNS1 por via oral, você sente queimação como desce, ou aziatipo de sensação, isso poderia ser uma indicação de que o bolor / fungo está presente internamente. Isso seria um sinal para fazer o Protocolo Nold / Fungus (ver página99). Ao usar NNS1 externamente e ele queima e picamal, use a argila e pomada de vaselina (ver páginas 106-107).

!> Como já foi dito, sempre que o MMS faz vocêsinta-se mulher (em outras palavras, você está tendo sintomas de uma reação Herxheimer - náusea, diarreia, etc.) reduza a dosagem em E0%, mas não pare. Continue a reduzir sua dosagem se você continuar a se sentir mulher do que seudoença já está fazendo vocêsentir. Se você se sentir extremamente mal, pare por algumas horas, ou um dia, até que os sintomas desagradáveis passem, mas uma vez que os sintomas passem, comece a aumentar lentamente sua ingestão

de MMS para a dosagem adequada para o protocolo que você está usando, como contanto que não faça você se sentir mais doente do que a sua doença já está fazendo com que você se sinta.

b Lembre-se de que cada vez que aumentar a ingestão de MMS e adicionar outro protocolo, não pare de fazer o que já está fazendo. Adicione, mas não tire ou pare o que você já está fazendo.

*!> Uma coisa muito importante*lembrar é nunca parar de tomar NNS até que você esteja bem. Quando estiver bem, sugiro que você trabalhe para fazer as mudanças necessárias no estilo de vida que ajudarão*você permanece saudável e em forma. Isso pode incluiruma ou mais de várias coisas. Faça o seu melhor para eliminar qualquer fonte devenenos tóxicos entrando constantemente na corrente sanguínea,como remover canais radiculares e aKenda* quaisquer cavitações orais infectadas, remova o mofo de sua casa e / ou escritório, obtenha um bom suprimento de água livre de produtos químicos prejudiciais, etc. (Veja o Capítulo 8 Verificação da Realidade, para mais idéias sobre coisas que você pode precisar mudar para se manter saudável .) Faça da atividade física parte de sua rotina diária. Descanse adequadamente.*Reduza o estresse em sua vida. Cultive bons relacionamentos comothem. Abrace uma prática espiritual diária. Fortaleça o seusistema imunológico, seguindo um bom plano nutricional.Coma comida de verdade.*

Exceção à regra

Se você tem câncer ou outra doença fatal,pode ser necessário mudar mais rapidamente para o Protocolo de 2000 sem observar os intervalos de cinco a seis dias antesadicionar um novo protocolo.Você pode determinar se é horapara se mover mais rapidamente pelo jeito que as coisas estão indo. Se vocêsestão se sentindo muito mal e, novamente, você tem uma ameaça de vidaCom a doença, você pode querer ir mais rápido com os protocolos, mas sem ficar mais doente do que já está devido à sua doença. Neste caso, embora eu tenha acabado de dizer que você pode

se mover mais rapidamente, você deve, no entanto, semprepare com o procedimento de inicialização - não ignoreesta etapa.

É irrelevante entender que quanto mais avançadoa doença, mais devagar você deve começar.Se você desintoxicar o corpo muito rapidamente, isso pode fazer com que alguém fique muito doente. Ficar doente, quando você já está muito doente, não é uma coisa boa. Isso pode enfraquecer fulher o corpo, e nolongo prazo retarda o processo geral de cura.

Depois de concluir o procedimento de piquetagem, conforme você segue em frentepara o Protocolo 1000 e as doses de 3 gotas de hora em hora, se você fornão ver melhora de nenhum tipo em dois a três dias (em vez do padrão de cinco a seis dias), e se você não estiver experimentando uma reação Herxheimer, passe paraProtocolo 1000 Plus (que adiciona DMSO às suas doses de hora em hora). Então, se novamente, você não está vendo melhorias emmais dois ou três dias, vá para o Protocolo 2000. Siga as instruções do Protocolo 2000 e continue emcom o Plano de Recuperação da Saúde, conforme descrito neste livro, mas sem ficar mais doente. (Veja os Três de OuroRegras de MMS, páginas 83-84.)

Pague pertoatenção a como seu corpo está respondendo. Cadapessoa é diferente; alguns podem ser capazes de ir emeste ritmo acelerado, por outro lado, outros podem precisar ir em um ritmo mais lento do que o sugerido aqui. Ouvimos sobre recuperações notáveis de doenças potencialmente fataisquando a pessoa tomava apenas 1 gota de MMS1 por hora. Isto énão é uma corrida para ver quanto MMS você aguenta.Ouça o seu corpo e lembre-se, é extremamente importantetente sempre seguir as Três Regras de Ouro do MMS.

Protocolos de suporte - quando adicioná-los

Em geral, eu recomendei que um stal adicionando os protocolos de substituição se você alcançou o protocolo3000, e não recuperou totalmente a saúde. No

amigo, isso éporque trabalhar com o Plano de Recuperação da Saúde é um processo. No geral, o corpo precisa de algum tempo para se acostumar a cada nova adição no processo. Adicionando

coisas demaistudo de uma vez pode ser opressor e / ou possivelmente causar uma reação Herxheimer. Não desejo que ninguém se canse e desista, o que pode atrapalhar a recuperação. Esta regra de quando adicionar um protocolo de suporte não é difícil e rápida. É uma diretriz.

Algumas exceções ao adicionar protocolos de suporte: Itnem é preciso dizer que sempre que você tiver uma tosse persistente, faça o Protocolo de Tosse. Uma mulher com câncer de mama, cervical ou uterino pode querer começar o Protocolo Douche mais cedo, mesmo já no Protocolo1000 em alguns casos. Se ela está lidando bem com MMS e sente que pode adicionar algumas duchas para ver se isso também a ajudamelhorar, pode ser melhor tentar. Alguém com cóloncâncer pode querer adicionar enemas ou cólon em algum pontoantes de chegar ao protocolo3000, se eles quiserem. Anoth-O exemplo de adição de um Protocolo de Supressão antes de chegar ao Protocolo 3000 seria no caso de usar o Patch MMS1 / DMSO para quaisquer tumores externos. Preste muita atenção aos sinais do seu corpo e siga o que vocêsinto que você pode lidar. Consulte o Capítulo 7 para obter uma lista de doençasdando-lhe exemplos de como usar os protocolos de Suppoling,e quando adicioná-los à sua rotina de recuperação da saúde.

Uma palavra sobre os protocolos adicionais

Os protocolos adicionais emeste livro é diferente dos protocolos de apoio, pois são específicos para uma doença pulmonar. As doenças Celain requerem um procedimento diferente do HRP. Por exemplo, a malária requer a ingestão de doismais forte do que as doses usuais de MMS1. Na maioria dos casos, issoerradica a malária, mas se houver complicações, o Protocolo da Malária dá instruções específicas para mulheres para ma-laria.

Às vezes, um protocolo adicional pode sugerir ir paraо HRP em algum ponto, após seguir celain específico

procedimentos paliculares a essa doença. Para aprender mais sobreos protocolos adicionais, consulte o Capítulo 11.

Dois procedimentos fundamentais de saúde para o HRP

1. Escovando os dentes

Quase todas as doenças são influenciadas por uma grande ou pequenaextensão pela condição da boca e dos dentes,portanto, todos os protocoloslistado neste Guia de recuperação de saúde NNS deve ser acompanhado por uma escovação diária dos dentes com MMS1. Foi mostrado repetidas vezesque o MMS1 pode restaurar a saúde da boca e dacaso de fazer esses protocolos, muitas vezes são notados melhores resultados ao escovar com MMS1, mesmo quando os dentese a boca está em péssimo estado.

Isso não significa que ninguém precisará dos serviços deum bom dentista, mas uma vez que as infecções e doenças doa boca sumiu, então o dentista pode fazer um tratamento muito melhortrabalho, e as doenças do corpo são 10 vezes maisp r o v á v e l Para ser superado. Portanto, uma etapa preliminar para esta recuperaçãoO plano é comprar uma boa escova de dente para escovar os dentes e gengivas e, ao mesmo tempo, fazer os protocolos. Sevocê usa uma escova de dentes com pasta de dente algumas vezes,mantenha uma escova de dentes separada para usar apenas com MMS1 (e DMSO se usar). Isso ajudará a evitar que resíduos de pasta de dente deixados na escova de dente se misturem com o MMS1.Sob nenhuma circunstância você deve usar pasta de denteque contém flúor.

EscovagemProcedimento de Dentes

Passo 1

0 Em um copo ative 5 gotas de MMS.

0 Após 30 segundos, adicione apenas 1/4 xícara (2 onças / 60 ml) de água às gotas de MMS1.

Passo 2

0 Escove as gengivas e os dentes com esta mistura por pelo menos dois minutos. (Despeje um pouco do líquido sobre a escova de dentes 3 ou 4 vezes enquanto escova. Veja a dica sobrepágina 75.)

0 Faça isso 2 ou 3 vezes por dia enquanto faz os protocolos em
este livro.

Nota: Por vários anos, pessoas em todo o mundo têm usado com sucesso o MMS1 para manter a boca dentro*forma e para superar várias infecções de dentes e gengivas.Você não precisa se preocupar com a alcalinidade do sódioclorito nem a acidez de MMS1 lixiviando mercúrio deos teus dentes. Isso ocorre porque a acidez no ativador NNSquando misturado gota a gota com o MMS (clorito de sódio), que é alcalino, é calculado principalmente para CanCel um ao outro, deixando a solução NNS1 muito mais próxima do neutro. Oa acidez é, então, muito menor do que a maioria das frutas e não pode machucar seus dentes ou lixiviar o mercúrio de suas obturações. Tenha em menteque frutas e vegetais são ácidos por natureza mais do que as doses de MMS1. (Para obter mais informações sobre a acidez e alcalinidade de frutas e vegetais, consulte o Apêndice C.)*

DMSO e Dentes

Se seus dentes estão em más condições, por exemplo, se você tem um abscesso, dor ou complicações mais sérias com seu

dentes, adicione DMSO à sua rotina de escovagem. O DMSO carrega o MMS direto do esmalte até o dente e pode ajudar a resolver muitos problemas.

Passo 1

0 Misture a mistura de escovação de dentes MMS1 descrita acima.

0 Escove os dentes com essa mistura por cerca de um minuto. Isso é para uma limpeza inicial da boca e dos dentes e para limpar qualquer coisa que você não queira que o DMSO “carregue” mais profundamente nos tecidos e esmalte de seus dentes.

0 Após essa limpeza inicial, enxágue bem a boca.

Passo 2

0 Em seguida, adicione DMSO ao resto da mistura de MMS1 e continue escovando com DMSO adicionado. Você deve adicionar DMSO à sua mistura imediatamente antes de continuar a escovar. Adicione 3 gotas de DMSO para cada 1 gota de MMS que estiver usando. Para a fórmula acima, isso seriaser 15 gotas.

0 Se você tem DMSO que já está um pouco diluído, use 4gotas para cada queda de MMS.

Dica: Se você quiser usar a mesma solução descrita no Procedimento de escovação dos dentes para mais de uma escovação, você precisará colocar a solução em um frasco com uma tampa apertada. Se você quiser mergulhar sua escova de dentes no líquido, ela não é mais reutilizável. Portanto, se você quiser “mergulhar”, não contamine toda a mistura. Em vez disso, sirva amigod a s o l u ç ã o e m u m c o p o p e q u e n o e c o n t i n u e m e r g u l h a n d o s u a e s c o v a d e d e n t e

naquele líquido 3 ou 4 vezes enquanto escova, então descarte qualquer solução de “imersão” remanescente. Dobre o valor (10

gotas ativadas de MMS para 1/2 xícara [4 onças / 120 ml] de água) para compor uma porção do dia.

Se você inventar esta solução para o dia, você não pode adicionarDMSO. DMSO deve ser adicionado imediatamente antesusar, pois com o tempo, vai enfraquecer sua solução MMS.

2. Pulverizando sua pele

Enquanto estiver neste Plano de Recuperação da Saúde, se você tiver algum tipo de problema de pele, seja câncer de pele, eczema, psoríase, infecções ou feridas, etc., borrifar a pele ou ferida com MMS é uma grande ajuda. Listei este protocolo nas etapas fundamentais para o HRP (Plano de Recuperação da Saúde),porque é impolente que os problemas de pele endureçam imediatamente com a pulverização na pele quando você inicia a recuperação da saúde. Usar este borrifador também é útil para quase todos os tipos de problemas de pele isolados, como feridas ou hematomas, para ajudar na condição geral dopele e muitas outras condições. Pode ser usado para oresto de sua vida para problemas de pele, esteja você em outros protocolos ou não. Sempre que o spray MMS arder ou queimar sua pele, vá para o Protocolo de Molde / Fungo e verifique a seção sobre o procedimento externo de mofo / fungo (consultepágina 106).

Frasco de spray MMS1

0A fórmula padrão do frasco de spray é de 10 para 1. Ou seja, 10 gotas ativadas de MMS para 1 onça / 30 ml de água.

0 Nunca use água da torneira para qualquer mistura de MMS, pois não éseguro para o risco de obter cloro, flúor ou outras impurezas na solução. Use apenas água

potável engarrafada, reversoosmose, ou água destilada.

0 Na maioria dos lugares, frascos de spray de 2 ou 4 onças estão disponíveis na farmácia ou em lojas de produtos naturais.

Basta multiplicar a fórmula, 20 gotas de MMS1 para 2 onças de água ou 40 gotas de MMS1 para 4 onças deagua.

- Em geral, essa mistura dura cerca de uma semana. Você saberá que ele perdeu sua potência quando a cor originalcomeça a desaparecer visivelmente.

- Não deixe seu borrifador ao sol; armazená-lo em um local escuro ajudará a solução MMS1 a permanecer forte.

- Use para pulverizar todos os problemas em sua pele.

- Ao usar um frasco de spray MMS1 em seu rosto, evite obtendo-o em seus olhos.

Dica: você pode borrifar um pouco no rosto e, em seguida, borrifar ou dar um tapinha com um pouco de DMSO (dimetilsulfóxido, consulte o Capítulo 4) por cima. Esfregue o rosto levemente para ajudar a aliviar as rugas. O DMSO geralmente torna o spray MMS mais eletivo em qualquer parte do corpo. Ao pulverizar MMS1 ou DMSO em seurosto, evite o contato com os olhos.

Variação: Se você não ver resultados com o frasco de spray 10 para 1 MMS1, você pode aumentar a força do seusolução de pulverização de até 50 gotas ativadas deMMS por 1 onça / 30 ml de água. Sempre comece com 10 gotas ativadas (MMS1) por 1 onça / 30 ml e aumenteas quedas em incrementos para ver o que funciona melhor para você. Sempre que a solução de pulverização MMS1 arder e / ou queimar, independentemente de quão fraca ou forte ela seja, é mais provável que seja umindicação de que algum tipo de fungo está presente. Nissocaso, enxágue-o oPcom água purificada e aplique a argila eBálsamo de vaselina descrito no Protocolo de Molde / Fungo(páginas 106-107).

Frasco de spray MMS2

Recebemos feedback de muitas pessoas queusado MMS2 em um frasco de spray com resultados positivos para opele. MMS1 e MMS2 ajudama p e l e v a r i a n d o m a n e i r a s , então experimente os dois e veja o que funciona melhor para você. Por favorobserve, nas instruções abaixo, existem alguns diKerenc-es no uso de MMS2 e MMS1 quando usado em um frasco spray.

- Adicione pó de MMS2 suficiente (hipoclorito de cálcio) paraumafrasco de spray limpo e seco (2 onças / 60 ml ou 4garrafa de 120 ml / onça funciona bem) para cobrir apenas ofundo da garrafa.

- Encha o resto da garrafa com água purificada, destilada ou de osmose reversa.

- Agite bem para dissolver o pó de MMS2.

- Em seguida, coloque a solução MMS2 através de um filtro de papel limpo em um vidro limpo e seco. (Se possível, use filtros coPee de papel marrom não branqueado.) O MMS2 geralmente tem pequenos caroços que não se dissolvem facilmente e, se não for esticado, poderá entupir o borrifador.

- Antes de colocar a solução MMS2 de volta no spraygarrafa, certifique-se de enxaguar bem a garrafa com água limpa e purificada, para ter certeza de que não há grumos que possam entupir o pulverizador.

- Ao usar um frasco de spray MMS2 em seu rosto, evite o contato com os olhos.

Nota: Ao contrário do spray boKle MMS1, não use um spray boKle MMS2 com DMEO, pois isso pode causar um*queimar.*

Capítulo 6

Os protocolos-chave

Procedimento de partida

Este procedimento de piquetagem deve ser feito antes de seguirProtocolos 1000, 1000 Plus, 2000 ou 3000. Este procedimentoirá garantir a você um maior sucesso, pois tem havido pessoasque sem ele experimentaram náuseas, vômitos, diarreia ou cansaço excessivo, às vezes nos primeirossemana ou mais de declaração do protocolo1000. Muitos desistem certoentão, em vez de persistir. Você não pode culpá-los; eles têmsoube como o MMS é ótimo e isso os fez se sentir mal,então eles desistem. Isso é porque eles demoraram a tirar tambémmuito MMS1 muito rapidamente para iniciar seu protocolo. Por favoracredite em mim quando digo que este procedimento de fixação éextremamente impolante para você para a recuperação de sua saúde. Pode ajudá-lo a evitar doenças desnecessárias, pois ajuda a suacorpo gradualmente se acostuma com MMS.

O procedimento de fixação consiste em tomar MMS1 em doses muito baixas para estabilizar e aumentar lentamente para uma dose de 1 gota durante um período de quatro dias. (Há uma exceção a esta regra, consulte a variação na página 82.) MMS1 começa a trabalhar para matar a doença, mas se você for muito rápido, os venenos de patógenos mortos (qualquer agente produtor de doença) se acumulam no corpo mais rápido do que o corpo pode se livrar deles. Esses venenos podem causar principalmente náuseas, vômitos ou diarreia e, às vezes,

outras perturbações, como cansaço extremo, também podem ocorrer. Isso é chamado de reação Herxheimer, conforme explicado na definição de

termos na página 6. Felizmente, passar pelo Procedimento de piquetagem pode ajudar a evitar ou minimizar uma reação de Herxheimer.

Instruções para o procedimento de partida

Dia um

O primeiro dia do procedimento de piquetagem leva 1/4 de gota deMMS ativado a cada hora durante oito horas. Desde que vocênão pode dividir uma gota em faltas, as seguintes etapasexplique como você faz a dose. Lembrar,use um copo vazio, limpo e seco. Uma vez que todas as doses de MMS1são tomados em 1/2 xícara de água, é útilpara marcar seu copo no ponto de 1/2 xícara (4 onças / 120 ml), ou use umvidro com esta medição.

Passo 1

0 Ative 1 gota de MMS de acordo com as instruções em Mistura de uma dose básica de MMS1 (página 32).

Passo 2

0 Encha o copo até a marca de 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) com água. Certifique-se de que as gotas sejam misturadas na água.

Observação:*Alguns sucos e refrigerantes são aceitáveis; ver páginas42-45.*

etapa 3

0 Despeje oP 1/4 ou 1 onça / 30 ml desta mistura de águaem outro copo e beba.

Observação: antes de beber 30 ml, você pode adicionar um pouco de água adicional - no máximo uma ou duas onças - se quiser diluir o sabor antes de bebê-la.

0 Descarte os 90 ml / 3 onças extras. Você não vai usareles. Você deve preparar uma nova bebida a cada horajcaso contrário, a dose perderá sua potência. Cada dose de MMS1 deve ser preparada de fresco - misture suas gotas econte até 30 segundos e, em seguida, adicione água e beba.Deve-se ter certeza de nunca esperar mais de 60segundos antes de beber.

Dia dois e três

No segundo e terceiro dia do Procedimento de Piquetagemtome 1/2 gota de MMS1 a cada hora por oito horasum dia.

Passo 4

0Siga as etapas 1 e 2 (do primeiro dia acima) a cada hora, mas desta vez despeje 1/2 da mistura (isto será 2 onças / 60 ml) e beba, e descarte a outra metade.Isso dá a você 1/2 gota.

Quarto dia

No primeiro dia do Procedimento de Estacamento leva 3/4
queda de MMS1 a cada hora durante oito horas.

Etapa 5

0Siga as etapas 1 e 2 (desde o primeiro dia acima). Nesse caso, seria mais fácil descartar 1 onça / 30 ml de líquido e beber os 3 onças / 90 ml restantes. Em outras palavras, você

está bebendo 3/4 da mistura de 1/2 xícara (ou 4 onças / 120 ml) que preparou nas etapas 1 e 2 e isso lhe dá 3/4 de uma dose gota.

Etapa 6

0 No final do dia quatro, você concluiu o EstacamentoProcedimento para o protocolo 1000. No dia seguinte (dia cinco), você deve iniciar o protocolo 1000 de acordo com as instruções na página 84.

Nota: No caso de um pemon muito doente, comece com o*Procedimento de partida comainda menos do que a dose de 1/4 de gota sugerida acima. Para um pemon extremamente doentecomeçar com 1/8 de queda a cada hora por oito horas (por umdia), em seguida, faça o procedimento de partida, seguido pelo protocolo1000*

Variação - Faixa Rápida para o Procedimento de Partida

Para aqueles que estão familiarizados com MMS1 e têmusei antes, se você sentir que gostaria de passaro procedimento de piquetagem mais rapidamente; esta variação simplesmente corta o tempo pela metade. Não recomendamos, no entanto, este método de rastreamento rápido se ele tiver sido mais longo do que aproxi-cerca de oito meses desde que você fez o MMS. (Se vocêsestão acostumados a tomar uma dose diária de manutenção de MMS[consulte a página 200] e você deseja estabilizar um protocolo MMS completo,Eu recomendo que você, no entanto, comece com o Procedimento de Piquetagem usando esta versão rápida.) Em qualquer caso,antes de prosseguir com este método, lembre-se, pague em-atenção sobre como seu corpo está reagindo, siga seu próprio ritmo e, novamente, se ocorrerem náuseas, vômitos ou diarreia, reduza imediatamente a dose pela metade e siga as instruções sobre como se sentir enjoado na página 50. Para controlar rapidamente o Procedimento de piquetagem, simplesmente corte o tempo de dosagem pela metadedo seguinte modo:

Dia Um - Fast Track

0 Tome uma dose de 1/4 de gota por quatro horas em vez de oitohoras.

0 Ao final de quatro horas, aumente para uma dose de 1/2 gota nas quatro horas restantes do primeiro dia.

Dia Dois - Fast Track

0 Tome uma dose de 1/2 gota por quatro horas.

0Aumente a dose para uma dose de 3/4 gota para o restante
quatro horas do segundo dia.

Dia três - rápidoAcompanhar

0 Stat no Protocolo 1000, começando com uma dose de 1 gota.Siga as instruções do Protocolo 1000.

Três regras de ouro do MMS

1. Se não está quebrado, não conserte! Enquanto você estiver melhorando, não mude o que está fazendo - continueuma vez que obviamente está funcionando.

2. Seu corpo sabe melhor ... Você só tem que aprender a ouvir! Sempre que você sentir náuseas,ema, vômito ou cansaço excessivo e / ou sensaçãopior do que a sua doença já está fazendo você, reduza a ingestão de MMS pela metade e, então, quando a doença diminuir, volte a aumentar lentamente. Continuar a aumentar sua dosagem quando você está se sentindo doente é comumerro. Não deixe isso acontecer com você! Mais nem sempre é melhor. Ouça seu corpo!

3. Se você está na rotina, é horapor uma mudança! Você chegou a um impasse? Se passar um período de cinco a seis dias e

você não vê nenhum sinal de melhora e verificou que não está fazendo nada de errado (veja a Verificação da Realidade, Capítulo 8), vá para o próximo nível. Dependendo de onde você está, adicione outra gota à sua dose, faça o próximo aumento ou vá para o próximo protocolo e / ou adicione um Protocolo de Apoio conforme listado no HRP. Sempre que você avançar, não pare de fazer o que você já faz. Adicione, mas não tire.

Em resumo...
Três regras de ouro do MMS

ntinue com o que você está fazendo.

de MMS em **1**

piorando? Senão há sinais de melhora, faça o próximo aumentar ou ir para o próxi

2

Protocolo 1000

Este protocolo por si só provou repetidamente querestaurar a saúde de pessoas com uma ampla variedade de doençase condições como hepatite A, B e C, HIV / AIDS, altrite, refluxo ácido, doença renal, qualquer número de dores e dores, infecções do trato urinário, depressão, diabetes e a lista é interminável. O protocolo 1000 também é útil para uma boa limpeza geral para livrar o corpo de toxinas indesejadas que um olen nem mesmo percebe que possuem. Muitas pessoas repelem que realmente não sentiam que tinhamquaisquer problemas graves de saúde, mas ainda assim atento ao protocolo 1000

eles se sentiram muito melhor - eles tinham mais energia e vitalidade, pensamento mais claro e se sentiram mais saudáveis no geral depoiscompletando o Protocolo 1000.

As instruções fornecidas aqui são para o original,e q u e Eu gosto de chamar de Protocolo Clássico 1000. Se você fizer uma pesquisa sobre fulher, descobrirá que nós e muitas outras pessoas experimentamos várias versões do Protocolo 1000 ao longo dos anos. Embora a maioria das pequenas variações do Protocolo 1000 tenham sido bem-sucedidas, de acordo com repols que recebemos de todo o mundo, o sucesso nunca foi tão bom quanto o protocolo original de misturar a dose fresca a cada hora.

O protocolo 1000 está levando no máximo 3 gotasde ativadoMMS (MMS1) em 4 onças / 120 ml de água (alguns sucossão aceitáveis, conforme explicado nas páginas42-45) uma vez cadahora, durante oito horas consecutivas, todos os dias, durante três semanas ou até bem. Não se perde em 3 gotashora. Você tenta acumular até 3 gotas lentamente conforme declarado neste livro e obedecendo às Três Regras de Ouro do MMS.Lembre-se, se seu corpo não tolera um aumento degotas, fique com o que funcionamelhor para você. Sua saúde pode ser recuperada tomando menos de 3 gotas em cada dose. Algumas pessoas recuperaram a saúde tomando 1 ou 2 (ou até menos) gotas por hora.

É melhor parar lentamente e aumentar para a dose de 3 gotas.Não inicie o Protocolo 1000 até que você tenha completadoed o Procedimento de Inicialização. A1er terminando o EstacamentoProcedimento que estabilizamos o Protocolo 1000 a 1 gota por hora etrabalhe até a dose sugerida de 3 gotas por hora.

Instruções para o protocolo 1000,

etapa 1

0 Em um vidro limpo e seco, ative 1 gota de MMS de acordo com as instruções em Misturando uma Dose Básica de MMS1, página 32.

0 Adicione 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água ou outromisturador recomendado.

Passo 2

0 Beba a sua dose de 1 gota dentro de um minuto após a mistura.

etapa 3

0 Continue a tomar uma dose de 1 gota a cada hora até que esteja pronto para aumentar suas gotas.

Passo 4

0 Se após três ou quatro horas não houver problema denáuseas ou qualquer sensação pior, aumente a dose em pelo menos 1/2 gota. Vá no seu próprio ritmo, (semobtendomais doente do que a sua doença já o está deixando), mas gradualmente vá aumentando até uma dose de 3 gotas a cada hora. Por exemplo, uma pessoa pode perder o primeiro dia comuma dose de 1 gota por duas a três horas, e então eles podem aumentar para 1-1 / 2 gotas por algumas horas, eem seguida, 2 gotas por algumas horas e assim por diante. Outraspode querer manter uma dose de 1 gota a cada hora durante todo o primeiro dia e, em seguida, 2 gotas a cada hora no próximodia e assim por diante. Alguns podem até achar necessáriofique com uma dose de 1 gota a cada hora por alguns dias anteseles podem subir.

Etapa 5

- Continue tomandoDoses de 3 gotas a cada hora, durante oito horas consecutivas por dia, durante 21 dias. Você pode ficar bem sem problemas, mas se a qualquer momento sentir náuseas, vômitos, diarréia ou cansaço excessivo, simplesmente reduza a quantidade de gotas que está tomando em pelo menos metade. Lembre-se, reduza, mas não pare.(Um pouco de fezes moles ou diarreia pode serconsiderado OK e amigod a limpezaprocesso, mas se se tornar muito ou se você também estiver experimentandonáuseas e vômitos diminuem imediatamente. Segue oinstruções na seção Sentindo-se doente, página 50.) Certifique-se de seguir as Três Regras de Ouro do MMS.

Notas

b Você nunca*além de uma dose de gota G a cada hora enquanto em*
Protocolo 1000.

*b Embora não seja agradável sentir náuseas, diarreia, vômitos ou cansaço excessivo caso sinta esses sintomas, geralmente é um sinal de que seu corpo está passando pelo processo de desintoxicação - portanto, nesse ponto é positivo. O objetivo, no entanto, é ir em um ritmo constante, não muito*durar,*para que você não o deixe enjoado.*

!> No caso de você recuperar sua saúde em menos detrês semanas, eu sugiro que vocêno entanto, continue o Protocolo 1000 para todo o período de 21 dias. Isso vai ajudarConclua o processo de desintoxicação.

Protocolo 1000 Plus requer a adiçãode DMSO (dimetilsulfóxido) para sua dosagem horária. Antes de proceder

com este protocolo, leia atentamente e / ou familiarize-seize-se com o Capítulo 4 deste livro.

Este protocolo é simplesmente adicionar DMSO ao protocolo MMS11000 dose que é de 3 gotas ativadas por hora (ou às vezes menos). Com o Protocol 1000 Plus, você adiciona 3 gotasde DMSO para cada gota de MMS. Ou, caso você não tenha progredido para 3 gotas por hora até este momento, continue a mesma quantidade de MMS1 que você está tomando e adicione o DMSO de acordo. Por exemplo, se você estiver tomando umDose de 3 gotas de MMS1, você adicionaria 9 gotas de DMSO. Se você estiver tomando uma dose de 2 gotas de MMS1, você deve adicionar6 gotas de DMSO.

Instruções para o protocolo 1000 Plus

Passo 1

0 Ative 3 gotas de MMS. (Se você ainda não conseguiu trabalhar com uma dose de 3 gotas, devido a náuseas, etc., ative quantas gotas estiver tomando.)

0 Adicione 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água (ou compatívellíquido; consulte as páginas 42-45, 56).

Passo 2

0 Imediatamente após adicionar a água, adicione 3 gotas deDMSO para cada gota de MMS1 que você éusando. Por exemplo, se você estiver fazendo uma dose de 3 gotas de MMS1, adicione9 gotas de DMSO. (Misture completamente no DMSO pormexendo.)

0 Beba a dose imediatamente, pois assim que o DMSO for adicionado, o MMS1 começará a perder potência lentamente se for deixado em repouso.

etapa 3

- Se depois de adicionar DMSO à sua dose você sentirdesconforto (como náuseas, diarreia, etc.), reduzir oquantidade de DMSO que você adicionará na próxima dose.Em vez de adicionar 3 gotas de DMSO por 1 gota de MMS1, reduza para 2 gotas de DMSO a 1 gota de MMS1. Se você ainda apresentar disfunção, reduza o DMSO em mais uma gota, ou seja, use 1 gota de DMSO para 1 gota de MMS1. Se você ainda tiver desconforto após reduzir a quantidade de DMSO 2 vezes, pare completamente de adicionar DMSO às suas doses de MMS1 por um dia. Em seguida, volte com pequenas doses de DMSO e acumulelentamente para 3 gotas de DMSO por 1 gota de MMS1.

Notas

¥ Uma razão importante para beber a dose de NNS1 / DMS0 imediatamente é porque o DMSO começa a fazer com que a dose perca lentamente sua potência. Demora até seis horas para perder potência total; no entanto, é melhor beber imediatamente paranão perde nada de seu poder. Eu sugiro beber dentroum minuto de adição de DNS0 cai, porque perde um grandequantidade de potencial no/? primeiros dez minutos e depois continua a perder potência em um ritmo mais lento.

*¥ Ao progredir do Protocolo 1000 Plus*para o protocolo*2000, sempre continue usando o DMSO de acordo com as instruções fornecidas aqui no Protocolo 1000 Plus ao fazerProtocolo 2000, ou seja, sempre adicione 3 gotas de DNSO*para a dose*para cada 1 gota de MMS1.*

O Protocolo 2000 é, em essência, o nosso Protocolo do Câncer, mas nósnão o estão chamando de “Protocolo do Câncer” porque ele também funciona bem para a maioria das outras doenças potencialmente fatais. eu

observaram que mais de 90% das pessoas que usam o Protocolo 2000 fielmente e assumem a responsabilidade pelo usoconforme direcionado aqui, supere seu câncer ou outra doença completamente. No entanto, devo também mencionar que existem casos de câncer e outras doenças que simplesmente estão muito longefoi até mesmo para MMS1 e MMS2 para ajudar. Normalmente estessão os casos que passaram por enormes quantidades de quimioterapia, radioterapia ou tratamento cirúrgico e o corpo simplesmente "passou do ponto sem volta". No entanto, nuncadiga nunca. Se a pessoa ainda tem mais uma hora de vida,coloque algum MMS1 nele. Consulte a página 249 para obter mais informaçõesinformações sobre como ajudar pessoas em condições extremas.

No Protocolo 2000, você irá:

- Aumente o número de gotas que você toma a cada hora para quantas gotas puder aguentar (até a quantidade máxima de gotas para o seu peso - consulte a página 92) sem ficar doente devido ao MMS. Na maioria dos casos, o aumento nas gotas é necessário para o câncer e outras doenças fatais.

- Aumente o número de horas que você toma a sua dose todos os dias de oito para dez horas.

- No início do terceiro ou último dia do Protocolo 2000, você deve começar a tomar MMS2 além de MMS1.

O mais importante a lembrar é: nunca pare de tomar MMS até que esteja bem. Permanece no protocolo2000 e quaisquer protocolos de suporte necessários, conforme explicado no Plano de recuperação da saúde, até que você esteja totalmente recuperadosua saúde.

Nota: Ao progredir*do Protocolo 1000 Plus ao Protocolo 2000, sempre continue usando DNSO aCCording*com as instruções fornecidas no Protocolo 1000 Plus ao fazer

Protocolo 2000, ou seja, adicione 3 gotas de DNS0 à dose para cada 1 gota de NNS1.

Instruções para protocolo 2000

Passo 1

0 Aumente o número de horas por dia que cada um leva a dose por hora para dez horas por dia em vez das oito horas por dia do Protocolo 1000.

Passo 2

0 Comece aumentando as gotas em sua dose diária em 1 gotaincrementos. Por exemplo, se você estava tomando 3 gotas por hora de acordo com o Protocolo 1000, você pode aumentar para 4gotas.

0 O Plano de Recuperação de Saúde (HRP) dá subsídio parauma exceção à regra (consulte a página 70). Se você se enquadra nesta categoria e, portanto, chega ao Protocolo 2000 diretamente do Procedimento de piquetagemp o r c a u s a d o c â n c e r o u a l g u m a o u t r a d o e n ç a c o m r i s c o d e v i d a , e n t ã o c o m e c e c o m 1 g o t a p o r h o r a e a u m e n t e a s g o t a s p o r h o r a a p ó s somente algunshoras a 1 gota por hora. Você pode dizer se não deve adicionar outra gota por hora pelo caminho quesentir. Continue aumentando em 1 gota adicional por horaaté que uma pequena sensação doentia além de como a doença faz você se sentir, permite que você saiba por enquantopare de aumentar. Algumas pessoas podem se mover mais rápido e outras não, por favor, fique atento aos TrêsRegras de ouro do MMS.

0 É indelicado não se permitir sentir-se pior do que a sua doença já está fazendo você se sentir, pois o enjôo adicional pode retardar sua recuperação. Portanto, se tomar sua dose de MMS resultar em

náuseas, vômitos,diarreia ou cansaço excessivo reduzem o número de

gotas que você está tomando por50 O / o para a próxima dose, seainda parece que o MMS1 continua a causar angústia, então diminua a dose em mais 50% do que você está tomando. Quando você se sentir confortável com a quantidade de MMS1 que está tomando, aumente lentamente as gotas novamente. Se a doença adicionada for grave, pare temporariamente de tomar o colírio e endureça novamente assim que se sentir melhor. E, novamente, aumente o máximo que puder tomar sem se sentir pior do que já está.

O desafio a seguir fornece a quantidade máxima teórica de gotas que a maioria das pessoas deve tomar para seu peso corporal. Qualquer pessoa com peso superior a 200 libraspode calcular seu número máximo de gotas adicionando1 gota para cada 20 libras acima de 200 libras. Existemmomentos em que um câncer não está melhorando, que a pessoa pode iradiante e faça mais gotas por hora do que o sugerido aqui, nesse caso não hesite em fazê-lo, mas normalmente este desafio está correto. Lembre-se, siga os Três DouradosRegras do MMS. Algumas pessoas não vão chegar a lugar nenhumperto desses valores. Estes são os valores máximos - elesnão são um objetivo.

Protocolo 2000 - Dosagem Máxima de MMS1	
Peso	Dosage m
80-100 lbs (36-45 kg)	Não tome mais do que 8 gotas por hora
100-120lbs (45-54 kg)	Não tome mais do que 8 gotas por hora
120-140 libras (54-63kg)	Não tome mais do que 9 gotas por hora
140-160lbs (63-72 kg)	Não tome mais do que 10 gotas por hora
160-180 lbs (72-81 kg)	Não tome mais do que 11 gotas por

	hora
180-200 lbs (81-90 kg)	Não tome mais do que 12 gotas por hora
200 lbs (90 kg) e acima: Aumente a dose máxima em 1 gota para cada 20 lbs (9 kg) adicionais	

etapa 3

0 Comece a tomar MMS2 no terceiro ou último dia do protocolo. (Leia a seção MMS2 — Detalhes, página 274, para obter informações sobre onde comprar hipoclorito de cálcio e instruções sobre como fazer MMS2cápsulas.)

0 Use cápsulas de tamanho # 1 que são as menores quevocê deve usar, ou cápsulas de tamanho # 0, que é um tamanhomaior do que # 1. (E não, eu não cometi um errotamanhos de cápsulas; eles realmente ficam menores em tamanho conforme vocêaumente o número.) Estatísticas carregando o tamanho # 1cápsulas 1/8 cheio ou cápsula de tamanho # 0 aproximadamente 1/16 cheio. Quando as cápsulas são puxadas para cima, um lado está sempremaior do que o outro lado. Preencha o lado maior (pacotevagamente). Em seguida, coloque o lado menor e certifique-se deempurre-o para baixo com segurança no lugar.

Passo 4

0 O passo 3 deixa você estalado, mas aumente a quantidade que vocêcolocar a cápsula nos próximos dias,trabalhando até cheio para uma cápsula de tamanho # 1, ou 3/4 cheio para uma cápsula de tamanho # 0. Aumente lentamente a quantidade que colocou na cápsula.

Etapa 5

0 Tome uma dessas cápsulas 5 vezes ao dia - uma vez a cadaduas horas.

0 Tome a sua primeira cápsula de MMS2, toma de um aler de meia horasua segunda dose de MMS1 do dia.

Amostra de cronograma para o protocolo 2000, uma vez que o MMS2 é adicionado à sua dosagem

Protocolo 2000Horário MMS2	
Tempo	Dose
9:00 DA MANHÃ	Dose MMS1
10:00 DA MANHÃ	Dose MMS1
10:30 AM	Dose MMS2
11.00 DA MANHÃ	Dose MMS1
12h00	Dose MMS1
12h30	Dose MMS2
13:00	Dose MMS1
14h00	Dose MMS1
14:30	Dose MMS2
3:00 DA TARDE	Dose MMS1
16:00	Dose MMS1
16h30	Dose MMS2
17:00	Dose MMS1
18h00	Dose MMS1
18h30	Dose MMS2

Notas

!> Enquanto trabalhava com as cápsulas de tamanho correto de NNS2,que é uma cápsula de tamanho # 1 completo ou 3/4 de tamanho # 0 completocápsula (nunca ultrapasse esses valores), guarde suaMMS1 doses constantes. Em outras palavras, não esteja trabalhandoem aumentar suas gotas de MMS1, enquanto você está trabalhandoaté a sua dose adequada de NNS2, porque se você ficar com náuseas, não será capaz de determinar qual dos dois pode estar fazendo você se sentir enjoado. Depois de atingir a quantidade

sugerida de NNS2, você pode começar a aumentar suas gotas de NNS1 mais uma vez.

!> Lembre-se, a qualquer momento, se você está aumentandosuas quantidades de NNS1, ou MMS2, se a qualquer momento você sentirenjoado ou doente com o aumento, diminua a quantidadeem pelo menos metade e reconstrua lentamente.

*> Nunca tome uma dose contendo DMSO e MMS2cápsula no*mesmo*Tempo! Veja as páginas 23-24 para o completoaviso sobre isso.*

Protocolo 3000

O objetivo com situações graves ou de risco de vida érapidamente fazer com que o MMS1 circule no sangue enquanto tentafique abaixo do nível de náusea. Uma maneira de conseguir isso é usando DMSO com MMS1 topicamente. DMSO é uma portadora eportanto, leva MMS1 diretamente na pele e nos tecidose assim no sangue. Teste em condições de laboratórioções adicionando pequenas quantidades não perigosas de radiação demonstraram que o DMSO carrega o MMS1 diretamente para qualquer câncer no corpo e então penetra no câncercélulas. Temos evidências de que o DMSO também carrega MMS1 para qualquer lugar do corpo onde a doença enfraqueceu oárea. (Para obter informações sobre a mulher, recomendo o livro de Stanley Jacó: Dimetil Sulfóxido (DNSO) em Trauma e Doenças, de Stanley W. Jacob e Jack C. De La Torre. Também*O Manual DMSO*por Halmut PA Fischer.)

Protocolo3000 é o uso tópico de MMS1 misturado com DMSO, aplicado no corpo a cada hora por um mínimo de oito horas por dia. O procedimento MMS1 / DMSO descritoabaixo está uma técnica de pele acelerada que ajudaEmpurreMMS1 no plasma sanguíneo. Este método também ajuda aevitar uma reação de Hecheimer. No caso de câncer ououtra doença com risco de vida, deve ser usado em adiçãoa um regime oral normal do Protocolo de 2000.

Instruções para o protocolo

3000, etapa 1

0 Misture uma solução de 10 gotas de MMS com 10 gotas de50º/ ácido ocítrico ou 10 gotas de 4º/ oHCI ácido. 30segundos para ativação.

0 Adicione 20 gotas de água. Mas se essa mistura for muito forte(causa queimação na pele ou outra irritação), adicione mais gotas de água até não causar irritação. Se não houver sensibilidade extra da pele, você pode adicionar*menos*água (faça isso em incrementos), para ver se você podetolera uma mistura mais forte.

0 Adicionar1 colher de chá / 5 ml de DMSO.

0 Espalhe imediatamente a mistura sobre um braço. Vocêpode usar sua mão para espalhar a mistura. (Certifique-se de que o seuas mãos são lavadas e cuidadosamenteenxaguado de modo a remover todo o sabão antes de aplicar o DMSO.) Énão é necessário,e mesmo potencialmenteperigosovestiruma luva (se for de látex ou borracha). Quando você terminar,lave as mãos com água pura, não lave comsabão e água, uma vez que o DMSO é um portador e pode transportarum pouco do sabão em seus lenços.

Passo 2

0 Na hora seguinte, misture outra solução MMS1 / DMSO e espalhe-a no outro braço. Repita na próxima hora e faça um amigo diferente do seu corpo. Faça umprimeiro o braço, depois o outro braço, depois uma perna, depois a outra perna, depois o estômago e depois de volta ao primeiro braço e assim por diante. Use um parceiro diferente do corpo a cada vezvocê aplica a combinação DMSO /

MMS1. Faça isso uma veza cada hora durante oito horas consecutivas.

etapa 3

0 Repita este processo uma vez a cada hora por oito horas consecutivas por três dias consecutivos. (É bom tomar banho ou tomar banho de alerta completando as horas de aplicação do MMS1 / DMSO. Aguarde pelo menos uma hora após a aplicação da última aplicação. Lave bem com água corrente antes de usar o sabão.)

Passo 4

0Em seguida, faça uma pausa. Pare de um a quatro dias ou quantos dias forem necessários para superar quaisquer problemasque pode ser causado pelo DMSO (como extra secopele).

Etapa 5

0 Após a primeira semana, você pode usar este aplicativo tópicoquatro dias por semana, ou mais, se não houver nenhum problema com sua pele. Se não houver problema, continue usando o MMS1e DMSO todos os dias, desde que não haja peleirritação.Sempre que sentir irritação, diminua o ritmo por um tempo ou adicione mais água à mistura.

Observação:*Ao sair do aplicativo de tópico MNS1 / DNSO por quatro dias, você ainda deve continuar com seu outro NNSProtocolos.*

Variações

X Um método alternativo é usar a mesma mistura mencionada acima de gotas de MMS1 na água, mas espalhe essa mistura no corpo primeiro e depois pulverize DMSO (consulte as páginas 261-264 no frasco de spray de DMSO) ou dê tapinhas no DMSO por cima do MMS1 na mesma área. Esfregue

suavemente na pele. Você pode usar as mãos nuas e limpas para fazer isso.

Quando terminar, lave as mãos com água pura. (Lembre-se de que o DMSO é um carreador, então usá-lo com sabão pode levar o sabão para o seu sistema, então enxágue com água e seque.)

X Para pessoas mais doentes que deveriam tomar doses menores de DMSO, seria melhor usar apenas uma pequena área do corpo. Eu sugiro usar uma área do tamanho da palma da sua mão - não maior. Use uma área pequena como esta por vários dias antes de ir para uma área maior, como o braço ou a perna inteira. Use uma área maior apenas se não houver reação adversa ao DMSO na área menor.

:> Ou, em vez disso, adicione água extra à mistura. Ou seja, em vez de usar uma área menor para esfregar o DMSO, adicione água extra à solução MMS1 / DMSO e coloque-aem todo o braço ou perna e outras áreas.

X Há uma maneira mais conveniente de fazer este protocolo queenvolve o uso de frascos de spray para aplicar o MMS1 e o DMSO ao corpo. Você pode encontrar todos os detalhes do frasco de spraymétodo para o protocolo 3000,na seção para crianças deste livro na página 260. O mesmo procedimento e mistura para crianças podem ser usados para adultos. Embora o método do borrifador possa ser mais fácil para algumas pessoas, deixei ométodo original para este protocolo acima para fins deaprendizagem, e por causa daquelas pessoas que, por um ladorazão ou outra, pode não ser capaz de obter frascos de spray.

Cuidados

X Ao trabalhar com DMSO, não use luvas de borracha ou látex ou outras luvas médicas. Você poderia colocar borracha emseu corpo enquanto o DMSO derrete a

borracha. As luvas de plástico que não são extensíveis são um tipo de plástico que pode ser usadocom DMSO.

¥ • Mantenha o DMSO com força total longe dos olhos. Tome cuidadonão tocar nos olhos ao manusear o DMSO antes de enxaguar o DMSO oP das mãos.

X Se você notar uma sensação de queimação na pele depois de vocêaplicaram DMSO, uma boa técnica é colocar uma colher de chá de água purificada na área de queima e suavementeesfregue-o. Continue adicionando água até que não queime mais.Ou use um borrifador com água pura para talproblemas, mas esfregue a água.

¥ -Você pode esfregar azeite ou *Babosagel na pele após a aplicação de DMSO / MMS1*para acalmar a pele se sentir ardor ou irritação.

Nota: para um*lista completa de precauções de segurança Tor geral*
uso de DNSO, consulte as páginas 25-27.

Protocolo de Molde / Fungo

O mofo pode ser um fator contribuinte para muitas doenças. O mofo pode chegar a lugares surpreendentes. Enquanto muitosMuitos de nós associamos mofo a climas úmidos ou úmidos, a verdade é que o mofo pode ser encontrado em quase todos os lugares, mesmo em climas secos. O problema com o molde é que muitas vezes pode ser difícil de detectar. Quando alguém fica doente devido ao mofo, ele pode afetar o corpo de várias maneiras, e os sintomas podem variar muito. O molde pode causar infecções; pode causar estragos nas vias respiratórias, causando todos os tipos de problemas pulmonares, dificuldade em respirar, tosse e respiração ruidosa. Pode causar uma variedade de problemas de pele, dores de cabeça, depressão, perda de memória, problemas visuais, alergias, sinusite e problemas nasais, dores musculares e articulares, distúrbios digestivos,

distúrbios do sistema imunológico, fadiga e muito mais. Nem é preciso dizer que o mofo pode ser o culpado por deixar as pessoas terrivelmente doentes.

Sob algumas condições, mofo / fungo podem se espalhar rapidamente por todo o corpo. Às vezes, você fica doente e, outras vezes, pode não sentir isso por dias ou meses. Pode até ir e vir sem que você nunca sinta. Porém, não aposte nisso, pois também pode durar meses ou até anos, arruinando sua saúde e fazendovocê suscetível a muitas outras doenças.

O molde é um tipo de fungo. Aprendi ao longo dos anos que existem alguns tipos de fungos que o MMS1 e o MMS2 parecem não matar. Por quê? Eu não tenho certeza. Mas descobri que, quando esse é o caso, geralmente a argila resolve o problema. Portanto, se alguém não estiver obtendo os resultados desejados com o MMS, pode ser um indicador de que o bolor / fungo está causando a doença e é um sinal para adicionar argila ao seu protocolo. Eu pessoalmente tive sucesso fazendo isso, assim como muitos outros. Não vou garantir que funcionará para você, mas, na minha opinião, se alguém tiver experiência,ing um ou muitos dos sintomas descritosacima e énão tendo sucesso com o MMS, é celestial tentaradicione argila ao seuprotocolo e veja se traz resultados. Argilanão deve bloqueá-lo ou retardar seu progresso. Milhões deas pessoas têm ingerido argila há centenas de anos.

Algumas indicações de que o bolor / fungo está na raiz da doença e o (s) tipo (s) que o MMS não ajuda incluem:

- Se o problema for externo e o MMS estiver espalhadoo fungo, ele se tornará doloroso e endurecerá para picare queimar muito.

- Se o fungo estiver na boca quando o MMS1 for aplicado,a boca vai arder e queimar. (Enxaguar a bocafora com água fria para se livrar da picada causadapelo MMS.)

- Se o mofo for um problema internamente, e ao tomar MMS por via oral você sentirá queimação conforme ele desce,

ou um tipo de sensação de azia, isso pode indicar a presença de mofo / fungo internamente.

Se ocorrerem as reações acima, este Protocolo de Molde / Fungo, com a adição de argila, pode remediar a situação. Clay tem milhões de orifícios minúsculos com uma carga elétrica poderosa em cada orifício. Os microrganismos são puxados para o buraco pela atração da carga e ficam presos no buraco. A argila então sai do corpo levando consigo os microrganismos (vivos ou mortos). O procedimento a seguir provou ser bem-sucedido com muitospessoas.

A argila que recomendo usar para este protocolo tem váriosnomes: argila asteca, argila bentonita (cálcio bentonita épreferido, ou argila montmorilonita (da França).

Instruções para Uso Interno de Argila

Se você não estiver usando um protocolo MMS, faça o Procedimento de piquetagem (página 79) primeiro, antes de iniciar este Protocolo de fungo / molde. Depois de concluir o procedimento de estaking em quatro dias, vá direto para este protocolo no dia quinze. Se você já estiver em um protocolo de MMS e determinar que precisa parar por alguns dias para fazer o Protocolo de Molde / Fungo, ao adicionar argila em sua rotina de MMS - por um curto período de tempo - enquanto executa as etapas 1 e 2 desteprotocolo,**descontinuar**tomando suas doses de MMS de acordo com qualquer protocolo que você esteja fazendo no momento (Protocolos 1000, 1000 Plus, 2000 ou 3000).

Passo 1

0 No primeiro dia de tomar argila, tome 5 doses de argila, cadadose apal duas horas.

0 Dose 1 e 2 de argila: Adicione 1/2 colher de chá rasa (2,5 ml) de argila em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. É melhor

para continuar mexendo a água enquanto espalha a argiladentro da água. Beba. É normal beber devagarmas mantenha-o mexido.

0Doses 3, 4 e 5 de argila: adicione 1 colher de chá rasa(5 ml) de argila em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. Mexa como mencionado acima até que esteja bem misturado com a água. Beba.Istonão há problema em beber lentamente, mas mantenha-o mexido, pois a argila se assentará rapidamente de volta ao fundo do copo.

Passo 2

0 Se após o primeiro dia de tomar a argila você estiver se sentindoOK e não experimente nenhuma sensação de enjôo extra (não mais mal do que você já estava se sentindo com sua doença) após 5doses de argila, prossiga para a Etapa 3 abaixo no dia dois.No entanto, se parece que você está se sentindo um poucopior do que o normal, continue bebendoas doses de argila descritas na Etapa 1 acima, por mais um dia, tomando uma dose de argila a cada duas horas até que você tenha tomado 5 doses, então prossiga para a Etapa 3 no terceiro dia.

etapa 3

0 Alterne a bebida de argila descrita na Etapa 1 acima comqualquer que seja a sua dosagem de MMS1 antes de declarar oargila. (Na primeira hora, tome uma dose de MMS1, na hora seguinte uma dose de argila, na hora seguinte uma dose de MMS1, na hora seguinte uma dose de argila e assim por diante.) Por exemplo, se vocêcomeçaram a fazer este Protocolo de Molde / Fungo logo apósterminar o procedimento de piquetagem e, em seguida, estabilizar com 1

gotadoses para esta etapa. Se você estivesse no Protocolo 1000 tomandouma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora, alterne issodosagem com sua dose de argila. Ou, se você estivesse no protocolo2000 tomando uma dose de 5 gotas de MMS1 a cada hora,alterne essa dosagem com a sua dose de argila. Alternar

cada hora durante oito horas. Isso seria 4 doses de MMS1 e 4 doses de argila por dia.

0 Faça as doses alternadas por dois dias. Se você está nesta etapa e está observando uma melhora, continue assim (contanto que haja algum tipo de melhora) até que esteja completamente bem. Mas, se você chegar a um ponto em que ficará vários dias sem qualquer tipo de melhoria, vá para a Etapa 4 abaixo.

Informações adicionais importantes para a etapa 3

¥ 'Se você estava no Protocolo 1000 Plus e adicionando DMSO às suas doses de MMS1 no momento em que começou a tomar argila, você também pode continuar adicionando DMSO às suas doses de MMS1ao fazer a Etapa 3 acima.

X Se você estava no Protocolo 2000, no entanto, nãocontinue com MMS2 durante o tempo que estiver tomandoargila e MMS1 de acordo com a Etapa 3 acima - simplesmente continuecom a quantidade de MMS1 que você estava tomando no momento em queendureceu a argila, seja em 5 doses, 7 gotas, etc.

Passo 4

Nesta etapa você pegará a argila e o MMS1 na mesma dose. Ao misturar argila em uma dose de MMS1, sugiro o usoágua mineral com gás (água gaseificada). Isso ocorre porque a carbonatação em água mineral com gás tende a protegere preservar o MMS1 conforme ele é misturado com a argila. A argila tende a minimizar a resistência do MMS1 ao longo do tempo, mas ao misturá-lo com água com gás, ele não irá minimizá-lo tão rapidamente.

Para a fulher explicar por que tomar argila misturada com MMS1 pode ser benéfico: O mofo quase sempre suprime seu sistema imunológico, permitindo que outros patógenos se instalem. Eu acredito que neste caso, os outros patógenos podem não ser superados pelo MMS1 porque quando o molde está presente ele

forneceu m a c e l a i n a q u a n t i a d e "p r o t e ç ã o" p a r a e l e s. A s s i m, s e e r r a d i c a r m o s o m o l d e c o m a r g i l a, à m e d i d a q u e o s o u t r o s p a t ó g e n o s p e r d e m s u a "p r o t e ç ã o d o m o l d e", o M M S 1 é e n t ã o c a p a z d e d e s t r u i r eles também.

- ❑ Em um vidro limpo e seco, ative suas gotas de MMS, usando a mesma quantidade de gotas que estava tomando na Etapa 3.

- ❑ Adicione imediatamente 2 onças / 60 ml deágua mineral com gás(água carbonatada), seguido por 1 colher de chá rasa de argila. Acho que ajuda "polvilhar" a argila no copo enquanto mexe o líquido. Vai espumar um pouco, não deixe que isso te incomode, apenas certifique-se de ter um copo grande o suficientepara que não transborde.

- ❑ Uma vez que a argila é polvilhada e completamente misturada, você pode adicionar mais 2 onças / 60 ml de água gaseificada.

- ❑ Beba esta dose lentamente, se possível, durante um período de cincominutos.

- ❑ Faça isso a cada hora, por um total de oito horas por pelo menosum dia.

Notas

!> A argila tende a mascarar o sabor do MMS1, porém, segosto ainda é um problema para você, você pode usar um refrigerante como Pepsi, Coca-Cola, Sprite, etc., de acordo com as diretrizes nas páginas 42-4E deste livro. (Não use refrigerante de laranja.) Minha preferência, se possível, é a água mineral com gás, pois nãocontém açúcar.

b Você pode fazer essa mesma bebida com água potável purificada que não tem carbonatação, ainda assim ajudará, mas não será tão potente como quando feita com água gaseificada ou refrigerante.

Etapa 5

0 Se a Etapa 4 está fazendo você se sentir melhor e você se sente bemestão melhorando, continue mais dias enquanto você estivermelhorando, mas assim que você parar de melhorar (ou se sentir que está bem) pare de tomar as doses de MMS1 / argila. Se vocêstem um internoproblema de mofo / fungo, a argila adicionadaao seu protocolo deve ajudar a eliminá-lo. Normalmentenão é necessário continuar esta etapa por um período prolongado de tempo, geralmente alguns dias, mas certifique-separa continuar enquanto você notar melhorias.

Notas

!> Se você está morando ou trabalhando em um local com muito mofo, você deve continuar tomando a argila pelo menos com uma dose de manutenção de 6 gotas de NNS1 e 1/2 colher de chá rasa de argila até ter erradicado o problema de mofo. em sua casa ou local de trabalho.

!> Quando estiver bem, você pode continuar com o diárioDoses de manutenção MMS1 (consulte a página 200). Por outro lado, se você parou de ver melhorias e, portanto, parou as doses de MMS1 / argila, mas ainda se sente doente, podeé uma boa ideia voltar ao protocolo em que você estava, (pegando a quantidade de NNS1 e / ou MMS2 que você estavatomar antes de adicionar a argila), por outro período de tempo.Isso seria para limpar ainda mais quaisquer patógenos ou toxinas que a argila ajudou a prender e que ainda precisam ser lavados para fora do corpo, ou aqueles que o molde / fungo pode ter

“protegido”. Pode ser que existam alguns restos de venenos e patógenos que ainda estão presentes, embora o molde tenha desaparecido, portanto, deve-se continuar com o anteriorprotocolo até ter certeza de que está bem.

!> Se você estiver apresentando muco na garganta e / ou tosse, eusugerirvocê bebe suas doses de argila lentamente durante alguns minutos, dando tempo para que a argila trabalhe no

boca, garganta e esôfago à medida que desce. Também é uma boa ideia balançá-lo na boca algumas vezesantes de engolir.

b Ao tomar argila internamente, certifique-se de que seus intestinos estão se mexendo para que você possa eliminar as toxinas que a argila está retirando. No caso da constipação, descobri que a erva Senna é uma das melhores soluções. É natural e exercita o cólon. O Senna pode ser encontrado na forma de comprimido (vendido como laxante) em lojas de produtos naturais e em alguns países em farmácias. Comece com a dose recomendada e aumente o número de comprimidos a cada quatro horasaté que você tenha sucesso.

!>Explicamos acima que se MMS1 ou MMS2 parecem para não estar ajudando uma doença, pode ser devido a mofo / fungo.No entanto, existem outras razões pelas quais alguém pode não ter sucesso com o MMS, consulte o Capítulo 8).

Procedimento externo de molde / fungo

Existem muitos tipos de fungos que podem se manifestar externamente no corpo. Como mencionado anteriormente, um indicador queMMS1 não será útil ocorrequando MMS1 é pulverizado emou de outra forma aplicada ao fungo. Ele se tornará dolorido e duro ao picar e queimar muito. Neste caso, o MMS1 vai realmente piorar a condição, e é melhor tentaroutro curso de ação, como mostrado abaixo.

Instruções para Procedimento Externo de Molde / Fungo

Passo 1

0 Misture bem iguais de argila com Vaselina Vaselina. Alternativas à vaselina são o óleo de coco, azeite de oliva ou outro óleo carreador de boa qualidade. Faça a mistura bastante firme para que adira bem à área do fungo.

Passo 2

0 Passe esta pomada no fungo e cubra com uma gazecurativo.

0 Se o fungo estiver nos pés, espalhe a mistura de argila nos pés, calce meias limpas e calce os sapatos, se necessário.

etapa 3

0 A cada quatro horas, lave a área e aplique mais da mistura até que o fungo desapareça.

Notas

*!> Dependendo de quão sensível é a área da pele, pode ser doloroso*para lavar a mistura de vaselina oHa. Nós achamos*a vaselina com a argila misturada tende a se infiltrar na peledepois de alguma hora. Use um sabonete muito suave, se possível feito com ingredientes naturais (aqueles sem perfumes são os melhores, pois o perfume pode irritar tenros e danificadospele) e água morna. Despeje a água lentamente sobre a áreae massageie suavemente com a mão. Seque suavementecom uma toalha limpa ou gaze.*

!> Existem várias marcas de Vaselina no mercado. Recomendo a marca "Vaselina" (a original,que é triplamente purificado para ser 100% puro) para misturacom argila para fazer uma pomada. A vaselina tem a capacidade única de umedecer, penetrar e permanecer no local por horas a mais do que a maioria dos óleos. Às vezes, óleo de coco, azeite de oliva e

outros óleos podem ser usados para transportar váriossubstâncias para a pele e mantê-los lá. No entanto,nada se compara à capacidade da vaselina de reter substâncias curativas em contato com a pele por hora, enquanto noao mesmo tempo atuando como um agente de cura em si. Use os váriosoutros óleos somente se você não conseguir obter vaselina.

Uma revisão importante

O HRP e os protocolos-chave oferecem várias opções. Vocêtem a exceção à regra (página 70), onde se necessáriovocê pode mover mais rapidamente para o Protocolo 2000. Há umfaixa rápidaopção (página 82) para o procedimento de piquetagem. EmProtocolo 2000, você encontrará quantidades máximas de dosagem. Tudo isso parece apontar para quanto mais MMS se pega, melhor. Isso não é necessariamente assim!

Lembre-se sempre, é imperativo seguir os TrêsRegras de ouro do MMS. Seu próprio corpo vai te dizer o quesua dose pessoal ideal é. A maioria das pessoas nunca chega nem perto das doses máximas. Essessão valores máximos - não são um objetivo. Essas quantias podem ser necessárias para alguns, mas não para outros.

Você pode ser capaz de tomar uma quantidade de celaina de MMS, digamos uma dose de 3 gotas para o Protocolo 1000, para uma doença. Mas então, em algum momento, se você precisar repetir o protocolo, pode descobrir que só consegue aguentar 1 queda por hora, embora no ano passado você tenha feito 3 gotas por hora sem nenhum problema. Por que é isso? Nossos corpos mudam; Diferentes tipos de patógenos ou toxinas, ou diferentes quantidades de patógenos ou toxinas podem contribuir para reações variadas. Qualquer número de circunstâncias e condições podem influenciar a quantidade de MMS que você pode tolerar. É por isso que é tão indelicado prestar atenção aos sinais que seu corpo está lhe dando e, por isso, quero repetir, não é uma corrida para ver quanto MMS você pode aguentar.

Cada pessoa é diferente, para algumas pessoas um caminho rápidoabordagem ou dosagem mais elevada pode

ser necessária, e para outros,dosagem baixa traz resultados. Como mencionei anteriormente, nósalgumas pessoas com câncer avançado ficaram bemapenas 1 gota de MMS a cada hora e baixas doses deMMS2, e alguns com ainda menos, uma dose de 1/4 ou 1/2 gota.

Capítulo 7

HRP e vários Doenças

Usando o HRP em conjunto com protocolos de apoio para várias doenças

Neste livro não é possível listar todas as doenças da humanidade, nem mesmo todas as doenças e condições que sabemos por feedback, que o MMS ajudou. No entanto, listei a seguir algumas das doenças mais comuns para mostrar uma ideia geral de como usamos o Plano de Recuperação da Saúde (Capítulo 5). Este plano se refere ao uso dos protocolos-chave em conjunto com os protocolos de suporte, os protocolos adicionais e, às vezes, a erva indiana quando necessário.

É irrelevante notar que, a fim de incorporar osugestões abaixo em sua recuperação de saúde pessoalrotina, você deve ter um bom entendimento do Plano de Recuperação de Saúde e como ele funciona. Lembre oO HRP começa com o procedimento de piquetagem e, em seguida, umsegue a sequência adequada dos protocolos-chave de acordo comdance com as Três Regras de Ouro do MMS (ver páginas83-84). Dependendo da doença / doença, outro Suppol-Protocolos de ing e / ou protocolos adicionais também são adicionadosse necessário.

Eu tenho enfatizadono Plano de Recuperação de Saúde para sempre começar com o Procedimento de Piquetagem (ver página 79), e então

prossiga para o Protocolo 1000. No entanto, existem algumas doenças que eu acredito que seriam benéficas após a conclusão do Procedimento de Estaqueamento, para primeiro fazer o Molde / FungoProtocolo e, em seguida, prossiga para o Protocolo 1000 e continuecom o resto do HRP, conforme descrito no Capítulo 5. Este éporque o mofo e o fungo costumam ser os grandes aliados do problema. Na lista abaixo, observei quais doenças seriam benéficas para o Protocolo de Molde / Fungodepois de concluir o procedimento de piquetagem, e antes de fazerProtocolo 1000. No entanto, sempre que houver uma dúvidaquanto ao que você deve fazer ou com o que deve começar, sempre comece com o Procedimento de Partida e siga o HRP padrão. Sempre que você sentir issovocê não está fazendo progresso suficiente durante o seu HRPprograma vocesempre pode mudar para o Molde / FungoProtocolo por um período de tempo celain.

Dores e dores: Faça os Protocolos 6 e 6. Em seguida, vá para o Procedimento de piquetagem e continue seguindo o HRP. Si-simultaneamente, durante o procedimento de piquetagem, use o frasco spray MMS1, junto com o DMSO. Pulverize MMS1 na área da dor seguido por DMSO (pulverize DMSO ouesfregue com a mão) 4 ou 5 vezes ao dia. Continue com oHRP até que as dores passem. Sempre siga os trêsRegras de ouro do MMS.

Refluxo ácido: comece com o procedimento de estaqueamento. Em seguida, vá para o Protocolo de Molde / Fungo, primeiro, antes de continuar para o Protocolo 1000 e siga o HRP conforme necessário (sempre observando as Três Regras de Ouro). Tome uma boa marca de probióticos em qualquer refeição que esteja separada por pelo menos duas horas de suas doses de MMS, por pelo menos um mês. Continue até bem.

Alergias: comece com o procedimento de fixação e continueue seguir o HRP (sempre observando os Três DouradosRegras) até que as alergias desapareçam.

Apendicite: primeiro faça os Protocolos 6 e 6 (consulte a página 169). Se ainda houver dor uma hora depois de tomar a segunda gota de 6dose, pode ser necessário ir ao hospital. No entanto, se a dor já passou, neste caso pule para o Protocolo 1000 estal com a administração de uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora. Uma vez que o apêndice está conectado ao sistema digestivo, isso manterá um fluxo de MMS1 indo diretamente para o appen-dix e ajudá-lo a curar. Preste muita atenção aos trêsRegras de ouro do MMS. Se estiver se sentindo melhor, continue comProtocolo 1000 por três semanas para desintoxicar o sistema. Se a dor voltar, pode ser necessário ir aohospital.

Artrite: comece o HRP. Simultaneamente, durante o procedimento de piquetagem, use o frasco spray MMS1, junto com o DMSO. Borrife MMS1 na área da dor seguido por DMSO (borrife DMSO ou esfregue com as mãos)4 ou 5 vezes ao dia. Continue seguindo o plano HRP por meio dos Protocolos Principais, conforme necessário. A altrite ocorre em vários graus diferentes de intensidade. O problema pode ser corrigido seguindo o Procedimento de Estampagem e o Protocolo 1000, ou pode ser necessário seguir o procedimento completo de adição de todos os vários Protocolos de Suplemento, conforme descrito na seção Doenças geralmente consideradas incuráveis (ver página 117). Lembre-se de seguir os Três Regras de ouro. Continue até bem.

Asma: comece com o procedimento de fixação. Em seguida, vá para o Protocolo de Molde / Fungo, primeiro, antes de continuar para o Protocolo 1000 e

siga o HRP conforme necessário (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem.

Doenças autoimunes: doenças autoimunes afetam milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Existem comomuitos como 80 tipos de doenças autoimunes (e contageming). Alguns dos mais comuns variam de lúpus a doença celíaca do abeto, a doenças inflamatórias intestinais,para psoríase, e a lista continua. MMS é conhecido

para remediar estes e muitos outros. Comece com o Procedimento de Piquetagem e continue seguindo o HRP (sempre observando as Três Regras de Ouro). Muitas doenças autoimunes apresentam sintomas semelhantes, o que as torna muito difíceis de diagnosticar. Também é possível ter mais de um ao mesmo tempo. Se a qualquer momento durante seu programa HRP você não estiver vendo progresso suficiente, pode ser útil parar e fazer o teste de Molde / FungoProtocolo e veja se isso ajuda. Com algumas doenças autoimunes, também pode ser necessário adicionar Protocolos de Supressão, se necessário, conforme sugerido nas Doenças geralmente consideradas incuráveis seção (ver página 117).

*Candida:*Comece com o procedimento de piquetagem. Em seguida, vá para o Protocolo de Molde / Fungo, primeiro, antes de continuar para o Protocolo 1000 e siga o HRP conforme necessário (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem. Simultaneamente enemas e / ou colônicos (consulte as páginas 148-153) podem ser adicionados sempre que se sentir pronto, geralmente não estale até que você tenha estagnado o Protocolo 1000.

Resfriado comum: quando você sentir um resfriado chegando, siga os Protocolos 6 e 6. Se o resfriado passar uma hora após osegunda dose de 6 gotas, isto étudo o que é necessário para um resfriado. Seo resfriado persiste mais fazendo o Protocolo 6 e 6, inicie o Procedimento de Piquetagem e continue seguindo o HRP (al-formas observando as Três Regras de Ouro) até bem. (Isto éÉ importante notar que o corpo às vezes usa o resfriado comum para desintoxicar. Quando este for o caso, nãoquantiade MMS ou qualquer medicamento irá parar rapidamente um resfriado - ele simplesmente

precisará seguir seu curso. Neste caso, não pare de tomar MMS, pois com MMS o resfriado geralmentedesaparece muito mais cedo do que o normal - mesmo que seja o tipo de resfriado que o corpo usa para desintoxicação, que pode levar duas ou três semanas para superar completamente.

DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica):
Comece com o procedimento de piquetagem. Então vá para o

Protocolo de Molde / Fungo, primeiro, antes de continuar para o Protocolo 1000 e seguir o HRP conforme necessário (sempre observando as Três Regras de Ouro). Quando terminar o Protocolo de Molde / Fungo, simultaneamente ao iniciar o Protocolo 1000, estale o Protocolo do Pulmão (a Taça), consulte a página 159.

Doença de Crohn: Comece com o procedimento de estaqueamento econtinue seguindo o PRH (sempre observando as Três Regras de Ouro). Enemas e, se possível, alguns cólon, podem ajudar. No caso desta doença palicular, fique travado emos enemas ou cólon assim que você estiver acostumado a fazer os protocolos. É melhor parar com um enema oudois para ver como funciona (consulte a página 148). Se você notarmelhoria, continue enquanto você estiver melhorando.Não faça enemas ou cólon para a doença de Crohn semincluindo quedas de MMS1. Se o primeiro enema correr bem, vocêpode aumentar o número de gotas de MMS1 nos próximos enemas de acordo com as instruções. Se estiver fazendo cólon,siga as instruções na página 152. Lembre-se de que umcólon é realmente um super enema e limpa o cólonmais ePiciently. Lembre-se de que as Três Regras de Ouro do MMS ainda se aplicam, especialmente se você estiver melhorando, nãomudar nada.

Febre da dengue: Siga o protocolo para a febre da dengue em
página 190.

Problemas dentários: faça o procedimento de escovação dos dentes (consulte a página 73). Simultaneamente, comece com o Procedimento de Piquetagem e continue seguindo o PRH (sempre observando as Três Regras de Ouro).

Depressão: comece com o estakingProcedimento e concontinue seguindo o HRP (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem. Se necessário, continue

com o programa para doenças geralmente consideradas incuráveisseção (ver página 117).

Diabetes (Tipo 1 e 2): Comece com o Procedimento de Estacas e continue seguindo o HRP (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem.

Problemas Digestivos: Comece com o Procedimento de Estacamento e continue seguindo o HRP (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem. Além disso, tome um bom probiótico com as refeições ingeridas duas horas após as doses de MMS, o que significa duas horas antes de declarar a dosagem de MMS e duas horas após a última dose do dia, por pelo menos um mês.

Infecções de ouvido: faça imediatamente o protocolo de ouvido (consultepáginas 139-141). Simultaneamente,comece com o Procedimento de Piquetagem e, se necessário, continue seguindo o HRP (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem.

Eczema: Comece a pulverizar a área afetada com o MMS1frasco de spray (página 76) e aplique DMSO por cima. Ao mesmo tempo, comece o procedimento de piquetagem e continueseguindo o HRP (sempre observando os Três DouradosRegras). Se o spray MMS1 queima e pica, é umindicação de que mofo / fungo pode estar presente. Nesse casosiga as instruções no Protocolo de Molde / Fungo (verpágina 99) para superar o mofo e fungos na pele. Continue seguindo o HRP até bem.

Disfunção Erétil: Comece com o Procedimento de Esticamento e continue seguindo o HRP (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem.

Doença ocular: faça imediatamente o protocolo do olho (consulte a página 137). Simultaneamente, comece com o procedimento de piquetageme continuar seguindo o HRP (sempre observando oTrês Regras de Ouro) até bem.

Fibromialgia: Comece com o Procedimento de Fixação e continue seguindo o HRP (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem.

Hepatite A, B, C: Comece com o procedimento de estaqueamento e continue seguindo o HRP (sempre observando os trêsRegras de Ouro) até bem.

Herpes (todos os tipos): comece com o procedimento de piquetagem.Em seguida, vá para o Protocolo de Molde / Fungo, primeiro, antes de continuar para o Protocolo 1000 e siga o HRP conforme necessário (sempre observando as Três Regras de Ouro) atéNós vamos.

Hipertensão: Comece com o procedimento de estaqueamento e continue seguindo o HRP (sempre observando oTrês Regras de Ouro) até bem.

HIV / AIDS: Comece com o procedimento de fixação e concontinuar seguindo o HRP (sempre observando os TrêsRegras de Ouro) até bem.

Doenças infecciosas: podem ser causadas porvírus ou bactérias, e ambos podem estar dentro do corpo e na pele. Pneumonia, meningite e diarreia, por exemplo, podem ser causadas por vírus ou bactérias. Além disso, existem milhares de doenças de pele causadas por vírus e bactérias, como exemplos de erupções cutâneas de catapora, roséola e herpes zoster. Os medicamentos antibacterianos às vezes podem interromper as doenças [infecções] bacterianas, mas a medicina ainda não desenvolveu nada para interromper as infecções virais. Felizmente, o MMS é conhecido por interromper tanto vírus quanto bactériasdoenças. Para infecções virais ou bacterianas, seja-gim com o Procedimento de piquetagem e continue seguindo oHRP (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem.No caso de doenças virais ou bacterianas na pele, useo MMS1 ou o frasco

spray MMS2, (consulte a página 76). Seborrifar a pele causa ardor ou ardor, é um

indicação de que mofo ou fungo está presente. Neste caso, siga as instruções para o procedimento externo de mofo / fungo na página 106.

Doença renal ou hepática: comece com o processo de estaqueamentodure e continue seguindo o HRP (sempre observandoas Três Regras de Ouro) até bem.

Doença de Lyme: começocom o procedimento de piquetagem. Em seguida, vá para o Molde / FungoProtocolo,primeiro, antes de continuar para o Protocolo 1000 e seguir o HRP conforme necessário (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem.

Malária: Siga o Protocolo contra Malária (ver página 180).

MRSA: siga o MRSAProtocolo (veja a página 197).

Obesidade: Comece com o Procedimento de Piquetagem e continue seguindo o HRP (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem. Algumas mudanças na dieta e estilo de vida podem ser necessárias.

Parasitas:Comece com o Procedimento de Piquetagem e continue seguindo o HRP (sempre observando as Três Regras de Ouro) até bem.

Próstata (PSA alto): Comece com o procedimento de estaqueamento e continue seguindo o HRP (sempre observando oTrês Regras de Ouro) até bem.

Problemas de sinusite: faça o procedimento de nariz MMS1. Simul-simultaneamente, comece com o procedimento de piquetagem e, se necessário,ed, continue seguindo o HRP (sempre observando oTrês Regras de Ouro) até bem.

Problemas de pele: comece com o procedimento de grampeamento econtinue seguindo o HRP (sempre observando os TrêsRegras de ouro). Use um frasco de spray MMS e borrife o

aPectadoárea até 5 vezes ao dia. Adicione DMSO imediatamente em cima do spray e esfregue suavemente. (Apenas adicione DMSO em cima do spray se for MMS1. Não use DMSO comum frasco de spray MMS2, consulte a página 78).

Tumores e cistos: comece com o procedimento de estaqueamentoe continuar seguindo o PRH (sempre observando as Três Regras de Ouro). Seo tumor ou cisto está do lado de fora do corpo, use um frasco de spray MMS 5 vezes ao dia incluindo o uso de DMSO a cada vez. (Não use DMSO sevocê está usando um frasco spray MMS2 (consulte a página 78).O patch MMS1 / DMSO também pode ser aplicado atumores e cistos.

Infecções do trato urinário: comece com o Staking Pro-ceder e continuar seguindo o PRH (sempre observando as Três Regras de Ouro). Além disso, para homens emulheres, use um conta-gotas para injetar suavemente notrato urinário (através da abertura na cabeça do pênispara homens, e através da abertura urinária [abertura externa da uretra] para mulheres), uma compressão completa do líquido MMS1a partir de um frasco de spray MMS1 feito de acordo com oinstruções para um frasco de spray MMS1 (consulte as páginas 76-77).Isso pode ser feito 4 ou 5 vezes ao dia.

Doenças
Geralmente considerado incurável

Existem muitas doenças geralmente consideradas incuráveis. No entanto, recebemos inúmeras respostas de pessoas em todo o mundo que, através do uso de MMS, recuperaram-se totalmente de muitas dessas doenças supostamente incuráveis. Alguns deles incluem ALS (Lou Gehrig's Disease), Alzheimer,

autismo, câncer (todos os tipos), leucemia, esclerose múltipla, Parkinson, poliomielite, altrite reumatóide e muitas outras doenças fatais.

Se você ou um ente querido sofre de uma doença incurável ou com risco de vida, sugiro o seguinte:

X Comece com o procedimento de piquetagem. Então vá para oProtocolo de Molde / Fungo, primeiro, antes de continuar paraProtocolo 1000 e seguindo o HRP conforme necessário. Sempre observe as Três Regras de Ouro do MMS, que dizem a vocêquando passar para a próxima etapa ou para o próximo protocolo. Guardaavançando todo o caminho através do Protocolo 3000 senecessário.

X sevocê alcançou o protocolo 3000 e ainda não está completamente bem, então stal adicionando os protocolos de suporte. Neste ponto, a ideia é tentar fazer com que o MMS entre no corpo de várias maneiras. Pense nisso como atacar a doença de todos os ângulos possíveis. A ideia não é adicionar todos os protocolos de suporte no mesmo dia. Mas tente adicionar mais e mais conforme você avança. Se você não pode fazer algum dessesas coisas no começo, não se preocupe, apenas continue até que você esteja fazendo todas elas. Quando você continuar adicionando Protocolos de Suporte, continue tomando as doses orais de MMS1 e MMS2 e aplicando MMS1 e DMSO externamente, de acordo com o seu progresso com os protocolos-chave. Lembre-se de um princípio muito indelicado, você acrescenta, mas não tira o que já está fazendo. Sempre siga as Três Regras de Ouro do MMS.

Observação:*Para a maioriaparte, eu sugiro que você adicione protocolos de suporte na ordem listada abaixo. Existem algumas exceções a essa regra, dependendo de sua doença, de como você se sente e de como seu corpo está respondendo. Leia Protocolos de suporte - Quando*

adicioná-los (página 71), para obter maisdetalhes sobre isso.

Banhos: Faça banhos completos com MMS1. Em alguns dias, mude para os banhos MMS2, se puder. Se você vir a necessidade de continuar os banhos de MMS, alterne os banhos entre MMS1 e MMS2 - veja o que funciona melhor para você. (Veja as páginas 142-

148.) Se banhos completos não forem viáveis, faça o escalda-pés. Você pode querer fazer uma combinação dos três diferentesbanhos. Observe o progresso com os banhos e sigao que está funcionando para você.

Enemas: você também pode tentar dois enemas por dia. No caso de doenças graves, também recomendo pelo menos dois cólons por semana, que substituem os enemas e são mais abrangentesdo que um enema (ver páginas 148-153).

Protocolo de bolsa MMS: tente fazer vários deles por semana (consulte a página 156).

Protocolo de ducha: as mulheres também podem adicionar duchas em seu plano de recuperação da saúde (ver página 153).

Protocolo de Patch MMS1 / DMSO: Dependendo de qual é o problema, por exemplo no caso de tumores externos, você também pode querer fazer o Patch MMS1 / DMSO durante este tempo.

Indian Herb: If, aler fazendo tudod o s p r o t o c o l o s d e l i n e a d o n o P l a n o d e R e c u p e r a ç ã o d a S a ú d e j u n t o c o m o s P r o t o c o l o s d e A p o i o , v o c ê n ã o r e c u p e r o u s u a s a ú d e , e n t ã o u s a r I n d i a n H e r b é o p r ó x i m o c u r s o d e a ç ã o (v e r C a p í t u l o 1 0) .

Este pode parecer um programa difícil. Você saberá se está melhorando ou não. É um trabalho árduo e exige determinação, mas muitas pessoas tiveram sucesso nisso e superaram a doença palicular e, como resultado, vivem uma vida feliz e produtiva.

Sucesso de Lyme: Em março passado, peguei o que pensei ser gripe. Foi a pior gripe que já tive na vida. Estou com dor por todos os poros do meu corpo. Comecei a fazer maquinação, mas não adiantou. Como eu tinha MMS em casa, decidipara tentar. Bem, isso funcionou! Eu me senti bem novamente dentro de um curto Gme. Parei de tomá-lo porque parecia estar de volta ao meu antigo eu. Depois de alguns dias, os sintomas voltaram e foi quando percebi que estava lidando com alguma outra doença e não com uma gripe. Foi preciso muito trabalho de investigação para descobrir que eu tinha a doença de Lyme. Meu médicomédico foi absolutamente nãoajudar em tudo. Na verdade, ela era um obstáculo. Entrei na Internet e usei um verificador de sintomas e ele indicou que provavelmente eu tinha esclerose múltipla ou Lyme. Como o MMS estava ajudando, comecei a usá-lo novamente e pesquisei o máximo que pude sobre como tratar meus sintomas. Comecei o protocolo de 2000. Também entrei em contato com um médico naturopata em minha cidade para obter apoio. Para minha grande surpresa, ela apoiou o uso de MMS. Ela recomendou o uso de MMS em um enema, o que ajudou muito. Também estou usando o MMS2. Ambos os protocolos funcionam bem juntos. Se não fosse pelo MMS, acredito que estaria no hospital lutando pela minha vida agora. Meus sintomas eram graves e a dor horrível. O MMS é um milagre na minha opinião! —Brenda B., Canadá

Câncer de garganta: Tratando um cara com câncer na garganta. Seu hemograma voltou a subir, engordou um pouco, e seu médico disse tudo o que está fazendo para continuar porque está funcionando. ATUALIZAÇÃO: O cara com câncer de garganta foi completamente limpo de seu câncer de garganta. Estou muito animada por ele e pelo fato de que isso apenas torna as pessoas melhores. - CP,Estados Unidos

Capítulo 8

Verificação da realidade

Razões pelas quais você pode não estar tendo sucesso total com o MMS

1. Não seguir o protocolo com cuidado suficiente:Esses protocolos são o resultado de 20 anos ajudando as pessoas a recuperar a saúde. Existem razões para o processo exato dado. Aqueles que tentam mudar o processo ou que não são diligentes em seguir exatamente os procedimentos podem falhar. Se você realmente deseja ter uma boa saúde ou deseja viver se tiver uma doença letal, siga exatamente os protocolos.

É indelicado notar que existem muitos sites da Internetque têm vários protocolos e sugestões de dosagem (usandoMMS) para uma miríade de problemas de saúde. Muitos dessesos sites não são precisos e fornecem informações que não são consideradas opcionais nos últimos 20 anos. Simplesmente não temos controle sobre todos que têmsaltou na onda do MMS e quem lançou incor-informações retas. Exorto você a seguir as instruções emeste livro, que são minhas informações mais atualizadas. Sevocê deseja obter mais informações da Internet, certifique-se de que sejam de um site confiável. (Veja a página de referência noverso deste livro.)

2. Mudando a dosagem quando um está melhorando:Lembre-se, quando você notar alguma melhoragrande ou pequeno, não mude nada, mas continue fazendo

o que você está fazendo até que não haja mais melhorias por um período de cinco a seis dias. O que costuma acontecer é quandoalguém sente que está melhorando, ele pensará: "Se estou melhorando com essa quantidade de MMS, mais MMS me ajudará a melhorar mais rápido." Portanto, mesmo que esteja melhorando, ele aumenta sua dose. Quando isso acontece, o adicionalMMS1 pode matar oP muitos patógenosde uma vez, causando uma reação Herxheimer que pode causar dor de cabeça, cansaço extremo, náuseas, vômitos e / ou diarreia. A pessoa pode ficar desanimada e parar de tomar MMS por completo. Portanto, lembre-se, enquanto você estiver melhorando, não mude nada e vá apenas para o próximoprotocolo superior quando você não viu nenhuma melhora-por um período de cinco a seis dias.

3. Neutralizando MMS emo corpo: CoPee, decaPeinat- coPee ed, chá caPeinado, alguns chás de ervas, leite, álcool, água de coco, suco de laranja, suco de tangerina e todos os sucos com adição de vitamina C ou ácido ascórbico irão neutralizar diretamente o MMS. (A vitamina C encontrada naturalmente em frutas e vegetais em quantidades moderadas são aceitáveis.) Alimentos e suplementos que contêm quantidades excepcionalmente altas deantioxidantes como a moringa, não devem ser tomados duranteos protocolos MMS. (Veja as páginas 42-45, 52, 56.)

4. Produtos farmacêuticos: até o momento, não notamos nenhuma reação com MMS e medicamentos, embora não possamos garantir que sempre será o caso. A decisão de tomar ou não medicamentos é pessoal. Medicamentos afetam cada pessoacorpo de maneiras diferentes. Não podemos afirmar em todos os casos que tomar medicamentos prescritos inibirá a recuperação da saúde com o MMS. No entanto, vimos uma tendência de que continuar a tomar produtos farmacêuticos

enquanto faz os protocolos MMS muitas vezes diminui a recuperação da saúde ou impede tudojunto. Se alguém tomou a decisão de não tomar produtos farmacêuticos, ocasionalmente pode ser necessário continuar com umdroga farmacêutica (enquanto no protocolo MMS)para

vários dias ou uma semana ou mais (dependendo da situação e do tipo e quantidade de medicamentos dos quais você deve desmaiar}. Isso evita que reações adversas ocorram nos primeiros dias devido ao "choque com drogas" quando os medicamentos são usados pela primeira vez interrompido. Normalmente, é melhor desacelerar lentamente, reduzindo o medicamento em etapas. O profissional de saúde alternativo qualificado certo pode ajudá-lo a se livrar dos medicamentos com segurança.

5. Qualidade e força do seu MMS e ativador:Às vezes, alguém pode comprar garrafas de MMS que fazemnão tem a potência necessária (geralmente de uma fonte não comprovada) e, portanto, as gotas tornarão um mais fracodose. Uma maneira de ter certeza de que a dosagem é a dosagem adequada é certificar-se de que as gotas mudem para a cor âmbardepois de misturar MMS e gotas de ativador e contar 30segundos, (consulte a página 39); se não, algo está errado. Se elesnão fique âmbar, mas apenas amarelo, use apenas essas gotas por alguns dias até obter bons ingredientes - MMSe ativador. Qualquer um ou ambos podem ser ruins. Se as gotas nem ficarem amarelas, não as use.

6. Tomando suplementos durante os protocolos MMS: Vitaminas, minerais e outros suplementos que podem ser adicionados à dieta devem ser suspensos por um tempo durante os protocolos de MMS. Isso inclui especialmente alimentos com grandes quantidades de antioxidantes. O MMS remove venenos e destrói biofilmes que protegem os patógenos. Em seguida, ele mata os patógenos e ajuda na cura. Os suplementos não apenas ajudam o corpo, mas também alimentam os patógenos. Infelizmente, na maioria das vezes os patógenos são os primeiros na fila para obter nutrição dos suplementos e, portanto, fornecem nutrientes para a doença enquanto também tenta matá-la. Por esse motivo, os suplementos podem

retardar a recuperação da saúde ou até mesmo interrompê-la completamente. Por outro lado, depois de estar em um protocolo por duas ou três semanas e seguir todas as regras, à medida que continua em seu protocolo MMS, então eles podem considerar tomar suplementos.

mentos se eles sentirem a necessidade. Lembre-se, separe qualquersuplementos de dosagens de MMS por pelo menos duas horas. Siga a liderança do corpo e determine se omentos estão ajudando ou possivelmente impedindo que o MMS seja totalmentetrabalhando. Por favor, leia a seção de suplementos nutricionaiscomeçando na página 53 para uma explicação completa.

7. Terapias anteriores: tivemos pessoas que nos procuraram*em sua última perna*que passaram por vários tratamentos de quimioterapia, radioterapia e cirurgias, o que o torna difícilculto para restaurar a saúde. MMS tem o fardo adicional de remover drogas tóxicas de quimioterapia. Neste caso, geralmenteo sistema imunológico está comprometido e a remoção de vários órgãos torna a recuperação um pouco mais longa ou frequenteconsideravelmente mais. Portanto, as terapias anteriores, de-dependendo da quantidade e em que grau seguido, pode prolongar a recuperação da saúde. Você pode ter que persistirmais do que o esperado.

8. A atitude pode retardar a cura: É compreensível que, quando você está doente e se sentindo mal, comece a reclamar ou a ser negativo. No entanto, muitos estudos provaram que ter uma atitude positiva e manter as reclamações no mínimo contribui para uma recuperação mais rápida.Atitude muito raramente impede o MMS de funcionar completamenteer, mas uma atitude ruim pode afetar o sistema imunológico, eretardar o processo de cicatrização, às vezes consideravelmente.

9. Exames de sangue: muitas vezes, o sanguetestes podem fazer parecer que o MMS não está funcionando. A melhor maneira de determinar se o MMS está funcionando é por meio de resultados tangíveis.Como você está se sentindo? Você está ganhando ou perdendo peso comonecessário? As feridas estão

cicatrizando e as erupções cutâneas estão desaparecendo? A sensação geral de bem-estar foi restaurada? Se você temtodos esses sinais positivos e ainda um exame de sangue mostra um problema, o teste provavelmente está errado.

Com HIV / AIDS, hepatite C e algumas outras doenças,muitas vezes no primeiro teste durante e após um MMSlimpar, a contagem de vírus no sangue pode ir extremamenteAlto. Este é sempre um bom indicador de que o MMS está funcionando e a contagem logo diminuirá. O que acontece é que o MMS destrói os vírus. No entanto, os glóbulos brancos continuam a absorver os vírus mortos ou moribundos. Quando isso acontece, as células Fiquem cada vez mais entupidos até explodirem, liberando grandes quantidades de vírus mortos / agonizantes. Esses vírus mortos / agonizantes são contados na carga viral, mas elessão eventualmente eliminados do sangue naturalmente pelo corpo. Quando esse processo de limpeza for concluído, oa carga viral cairá para zero. Se alguém que usa MMS não entender isso, pode acreditar que não estáestá ficando melhor e pode parar de usar MMS.

Você deve deixar um tempo suficiente antes que os exames de sangue leiam com precisão, e isso depende da doença. Lembre-se também, muitos laboratórios cometem erros,pois mais de uma opinião costuma ser uma escolha sábia. Mas acima de tudo, siga como você se sente. Se a energia for restaurada eas feridas desaparecem, você pode saber muito bem que está curado, ou pelo menos que está melhorando.

1O. Vacinas:É um fato conhecido que as vacinas geralmente contêm patógenos fracos de muitos tipos de doenças. Muitas dessas doenças podem afetar ativamente o corpo. Além da doença, também é sabido que a maioria das vacinas contém mercúrio e outros produtos químicos extremamentevenenoso e, na maioria dos casos, essas toxinas retardam a curaconsideravelmente. No entanto, quase sempre vimos que os protocolos de MMS eventualmente superam os venenos causados pelas

vacinas e a saúde é então recuperada. Se você devevacinar-se enquanto estiver em um protocolo MMS, sugiro quevocê segue o Procedimento de Vacina no dia em que recebe a vacina (consulte a página 173) e depois continua com oProtocolo MMS em que você estava. Geralmente, o MMS podesuperar os efeitos negativos da maioria ou todas as vacinas.

11. Pressão da Família e Amigos: Família e amigos podem desencorajar alguém de fazer os protocolosser negativo sobre o que está sendo levado, bem comoduvidar que funcione. Esta influência externa pode muitas vezesfazer com que alguém decida parar de tomar MMS totalmente oude fazer os protocolos corretamente.

12. Venenos Ambientais: Existem centenas, senãomilhares de fontes de venenos em nosso entorno com as quais todos nós entramos em contato regularmente. Se alguém está tentando restaurar a saúde e está constantemente em contato com toxinas, o sistema imunológico do corpo pode se ocupar em tentar eliminá-las e a cura pode ser retardada ou interrompida por completo. Nesse caso, a pessoa pode ter que se retirar da situação tóxica antes que a cura completa ocorra.

13. Molde / fungo: o molde é um tipo de fungo. Existemalguns tipos de molde que não são detectados pelo MMS. ElasaPete tanto o interior como o exterior do corpo. O mofo / fungo pode entrar na boca e no sistema digestivoe causam muitos danos à saúde, bem como criam feridas e erupções cutâneas. Quando o MMS não é eletivo contra os tipos celaines de mofo / fungo, a argila podefrequentemente remediar o problema. É importante ter em mente que você pode distinguir mofo / fungo de outras feridas e patógenos pelo fato de que, quando o MMS é aplicado, elenão apenas picadas e queimaduras, mas também pode piorar a condição. Argila asteca, também chamada de argila bentonita, ouargila montmorilinita, geralmente vai matar o molde / fungo queMMS não vai erradicar. (Veja a página 99 para o completoProtocolo de Molde / Fungo, incluindo detalhes da mulher sobre comoreconhecer mofo dentro ou fora do seu corpo.)

14. Reinfecção: só porque uma pessoa recuperou completamente a saúde, não significa que ela não pode

reinfectareles mesmos novamente. Se alguém continua um estilo de vida ou hábitos

que causou a doença no início, ou é continuamenteexpostos a uma doença celaina ou toxina novamente após terem sua saúde restaurada, então a reinfecção pode ocorrer. Considere uma mudança de estilo de vida e, em seguida, repita oprotocolo.

15. Autoengano: as pessoas podem se enganar pensando que estão bem, quando na verdade ainda estão doentes. É preciso aceitar a realidade e assumir responsabilidade pessoal pela saúde e continuar com os protocolos até que todos os sintomas desapareçam, não importa quanto tempo leve.

16. Fios de alta tensão e microondas: há muito tempofoi pensado que aqueles que vivem perto de fios de alta tensãoe torres de microondas têm uma incidência muito maior de câncer e doenças do que aquelas que não têm. Pelo menos os fios e as torres são suspeitos. Praticantes de medicina alternativa costumam aconselhar pessoas doentes a se afastarem delocais próximos a tais fios e torres. Me foi dito poralgumas pessoas se sentiram melhor após a mudança. Então, se alguém descobrir que ainda se sente mal depois de fazer um protocolo eainda está perto dessas coisas, isso é algo paraconsiderar. Até mesmo mudanças simples podem ajudar, como usar internet com fio em vez de WiFi em casa e usar celulartelefones configurados para funcionarem no viva-voz em vez de presosaté a orelha.

Há muita controvérsia quanto à segurança ou perigos dealimentos aquecidos ou cozidos em forno de micro-ondas. Se eu estivesse tentando restaurar minha saúde, pessoalmente pensaria duas vezesantes de ter um microondas em minha casa. Se você não estiver fazendo progresso suficiente com seus protocolos MMS, evocê está usando um forno de micro-ondas, você pode quererinterrompa seu uso por um período de tempo e veja se ajuda. Aqui estão alguns links para

artigos que você pode achar úteisem tomar sua própria decisão sobre o uso de um micro-ondasforno:

*Os perigos ocultos do cozimento no microondas,*por um-
thony Wayne e Lawrence
Newell:http://www.healthscience.com/mic
rowave_hazards.html

Mercola em fornos de microondas:http://articles.mercola.com/sites/articles/
archive/2010/05/18 / microondas-hazards.aspx

Os fornos de microondas destroem o valor nutricional do seuComida,por Mike
Adams:http://www.naturalnews.com/021966_microwaves
_microwave_ovens.html

17. Cloro e flúor: esses dois venenos estão em muitos sistemas públicos de água em todo o mundo. Em locais onde não foi permitido despejar na água o resíduo industrial chamado flúor, eles puderam usar o cloro. Ambos são tóxicos e cancerígenos (causadores de câncer). No mínimo, seguir um protocolo MMS usando água contendo flúor ou cloro pode retardar o processo de recuperação. Considere o uso de água de osmose reversa, água destilada ou água engarrafada que não tenha nenhum desses venenos adicionado ou usado de alguma forma.

18. Patologia Oral: Um impedimento substancial para a cura completa é, às vezes, a patologia oral. Bactérias anaeróbias mortais existem rotineiramente nos canais radiculares, sob as coroas e até mesmo em locais de extração anteriores (causando cárie da mandíbula chamada cavitação). A maioria dessas bactérias não pode ser alcançada pelo sistema imunológico e pode causar infecções de baixo grau que persistem por anos, eventualmente causando problemas de cura, doenças autoimunes, altrite e muito mais. Muitas vezes a patologia oral que causa vários problemas no corpo pode ser superada com a escovação adequada com MMS1 e DMSO (ver página

73), porém em casos raros isso não resolverá o problema, e neste

A consulta de caso com um dentista biológico de alto nível pode ser necessária para ajudar o MMS1 a restaurar completamente a saúde.

19. Biofilme: se um biofilme estiver presente no corpo, ele podeprolongar ou prevenir a cura. Se alguém não está ciente de que umbiofilme está presente, eles podem pensar que MMS não étrabalhar ou não trabalhar adequadamente, e desistir de fazero protocolo. Consulte a página 273 para obter mais informações sobrebiofilme.

Câncer de bexiga: A Um amigo meu foi ao pronto-socorro porque estava urinando sangue. Añer isso, doutoresdescobri que ele tinha câncer na bexiga. Ele foi mandado para casa. Aí os médicos quiseram iniciar a quimioterapia, mas ele não tinha seguro, então demorou para voltar ao médico. Passei um MMS para ele e ele começou a tirar a cada hora. Ele tomou MMS por 2 semanas. Aí ele parou porque começou a ter diarreia e vômitos e já estava farto. Durante esse tempo, ele foi qualificado para um seguro. Ele voltou ao médico para fazer quimioterapia, mas antes, o médico da quimioterapia foi para dentro de sua bexiga para verificar o tamanho do câncer. Eles ficaram muito surpresos quando descobriram que não havia câncer.
—Tadeusz, Estados Unidos

MMS funciona:É seguro. Eu usei doses variandode 2 a 12 gotas, de uma a

quatro vezes ao dia. Tenho 56 anos e uso o MMS há uma década. E isso salvou a vida da minha filha de forma vital. — Wayne F., Canadá

Em resumo...

Três regras de ouro do MMS

7. Melhorando?

Não mudealgo.
Continuar com o quevocêsestão fazendo.

2. Sentindo-se pior?

ReduzirsuaMMSingestãoem 50%.

3. Não está melhorando / não está piorando?

Se houvern e n h u m s i n a l d e m e l h o r i a , fazer a próximaaumentarou vá para o próximo protocolode acordo comao HRP.

Capítulo 9

Protocolos de Suporte

Protocolo de tosse

Muitas doenças produzem tosse e algumas produzem tosse contínua extrema. A tosse esgota a energia de uma pessoa, geralmente a energia necessária para ajudar a superar a doença. Eu vi a tosse continuar indefinidamente porsemanas e às vezes até meses.

A tosse pode prevenir a recuperação da saúde e o Olen podecausar o agravamento da doença. Os músculos de um em seu estômagopode ficar extremamente dolorido e da mesma forma a garganta pode ficar dolorida de tosse. A tosse pode impedir o sonoque também é debilitante. O fato é que a tosse prolongada representa um grande problema. O protocolo abaixooferece uma alternativaa tomar drogas (para um persistentetosse) que pode ter efeitos colaterais graves. Eu vi este trabalho para outros e para mim; Eu acredito que pode funcionar paravocês.

A tosse é causada por muco e como o corpo reage aisto. Quase todas as doenças produzem muco na área queeles existem. Por exemplo, a doença nos pulmões produz muco nos pulmões e, da mesma forma, a doença no intestino, muitas vezesproduz muco no intestino. Tosse, especialmente fortetosse, é o ePo1 do corpo para manter a traqueia (tra-barato) sem muco. O bloqueio da traqueia é um problema extremo. O corpo não podep e r m i t i r q u e i s s o a c o n t e ç a ou o

resultado é a morte, portanto, a reação natural do corpo é profunda,

tosse forte e incontrolável para expelir muco da traqueia. Mesmo a menor quantidade ameaça bloquear a respiração.

O muco pode variar de aquoso a muito duro. Pode-se tossirpor horas para expelir um pouquinho de muco de algumas áreas da traqueia. Às vezes, a tosse não para quando todo o muco é removido dos tubos de respiração, porque os tipos de muco celain ainda podem estar presentes na boca e na garganta. Esse muco pode ser causado por outros patógenos não relacionados à causa original da tosse. A tosse ocorrerá enquanto os tipos de muco da celaina estiverem na boca ou na garganta. Esse muco pode ser tão fino que fica aquoso e pode até pingar do nariz ao tossir, ou pode ser muito espesso e continuar a se acumular na garganta e precisa ser cuspido.

Assim, é necessário remover todo o muco de dentro da boca, incluindo os dentes, as gengivas, as faces laterais das bochechas e a garganta.

Uma vez que isso seja realizadoa tosse deve parar, quase sempre é esse o caso, mas se a tosse não parar, você precisará repetir as etapas abaixo uma segunda vez.

Instruções para remoção de muco

A remoção do muco da boca pode ser realizada com o uso de vários ácidos em uma forma diluída. Cai de umfrasco de ativador MMS, como ácido cítrico 50% ou 4º/ oácido clorídrico (HCI), ou 1/2 limão espremido ou limapode ser usado.

Nota: Usar ácido ou limão nessas formas diluídas não fará mal aos dentes. Você pode enxaguar a boca com água limpa ao terminar cada sessão. eu não

Recomenda-se o uso de bicarbonato de sódio ou água alcalina para neutralizar o ácido; enxágue com água limpa é sulficiente.

Passo 1

0 Adicione 20 gotas de ácido cítrico a 50% ou ácido HCl a 4%(de uma garrafa de ativador MMS), a 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. Ou use 1/2 limão espremido ou lima em 1/2 xícara de água. (Vinte gotas de ácido ativador MMS em 1/2 xícara de água é um ácido muito fraco. É muito mais fraco do que o suco de limão e é fácil de usar.)

0 Adicione 1 gota de MMS não ativado a esta solução eespere três minutos antes de usar.

Passo 2

0 Tome um gole (cerca de 1 colher de sopa) da mistura dea1/2 xícara que você preparou na etapa 1. Bata a água várias vezes na boca, certificando-se de que ela cubra bem os dentes e as laterais da boca. Se você tiver dentes falsos, certifique-se de que a água também entre por baixo dos dentes.

0Depois de mexer, incline a cabeça para trás e gargareje por alguns segundos e depois cuspa a mistura de água / ácido.

0 Repita esta etapa mais 1 vez.

etapa 3

0 Usando uma escova de dentes macia, (certifique-se de que a escova de dentesestá limpo e sem pasta de dente) despeje um pouco da solução que sobrou da 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água acidificada que você preparou na etapa 1 sobre a

escova de dentes. Escove os dentes e as gengivas por um minuto.Isso é para garantir que não haja película de muco deixada em seudentes.

Passo 4

0Enxágue a boca mais uma vez, com um gole (1 colher de sopa ou mais) da 1/2 xícara de água acidificada feita na Etapa 1.

Notas

bFaça essas quatro etapas sempre que surgir um ataque de tosse. Certifique-se de seguir qualquer protocolo em que esteja (se houver) ao fazer este procedimento extra para tosse.

*b Se tossir pemisma, recomendo fazer o Protocolo Nold / Fungus (ver página*99 / como passei a acreditar, como muitos outros profissionais, esse molde pode proteger várias doenças, incluindo doenças que criam muco que causa tosse.

bA Eer você completouo molde / fungoProtocolo, se a tosse ainda for um problema, sugiro o seguinte: Comece novamente com o Procedimento de Partida e trabalheatravés do Plano de Recuperação de Saúde. Se antes de fazer o protocolo de tosse você já estava em um protocolo MNScomo o protocolo 1000 ou 2000, ou se você não estava em nenhumProtocolo MMS, seja qual for o caso - vá para oProcedimento de partida. Simultaneamente, neste ponto, por favorreveja o Capítulo 8 e considere cuidadosamente se algoimpede a recuperação da sua saúde. A qualquer hora que vocêestão em um protocolo MNS, como regra, a tosse deve parar. É por isso que sugiro que você

analise o que pode estar atrapalhando sua recuperação, corrija tudo o que possa estar errado erecomece desde o início.

Protocolo de patch MMSI / DMSO

O patch MMS1 é outra maneira de usar MMS1 e DMSOtopicamente.esteNão é a mesma coisacomo protocolo3000 per se, masé uma variação de como usar MMS1 / DMSO externamente de forma eletiva para curar todos os tipos de problemas de pele. Nós temosteve sucesso com muitos tipos de tumores, tumores cancerígenos e infecções, como MRSA, úlceras diabéticas e outrosdoenças de pele. Ele trouxe alívio para as áreas de dor, especialmentequando o câncer está presente. Protocolo Enquanto3000 é uma maneira para absorver o dióxido de cloro no corpo, através da pele,o adesivo é projetado para atingir uma área específica da pele.

Nota: Consulte a página 265 para obter instruções sobre como preparar um*Patch NNS1 / DNSO para uma criança.*

Instruções para patch MMS1 / DMSO

Passo 1

0Em uma tigela limpa, ative 10 gotas de MMS com 10 gotasde 50%ácido cítrico ou HCI a 4%. Conte 30 segundos paraativação.

0 Imediatamente adicione 10 gotas de água purificada.

0 Em seguida, adicione 10 gotas de DMSO. Certifique-se de que esta solução esteja bem misturada.

Passo 2

0 Despeje a solução em uma gaze de algodão certificando-seo líquido é totalmente absorvido pela almofada.

0Cubra a área do problema com a compressa de gaze e deixe agir por sete minutos. Na primeira vez que você fizer este patch, sugiro aplicá-lo por apenas sete minutos para

teste como a pele reage. Se tudo correr bem, os próximos patches podem ser mantidos por 15 minutos a cada vez. Se a pele estiver muito irritada, ajuste a solução comodescrito nas notas abaixo.

0 É melhor segurar opatch no lugar, pois colocar fita adesiva na compressa de gaze encharcada pode ter uma reação com oDMSO.

etapa 3

0Após o tempo alocado, remova o patch.

Notas

b Se as etapas acima causarem queimadura ou irritação na pele, adicione mais 10 gotas de águapara o patch. Se10 gotas de água não param a queima no próximo adesivo, adicione mais 10 gotas de água e continue adicionando até que não haja mais queimação ou irritação.

b Dependendo do tamanho da área a ser coberta, estefórmula pode ser duplicadaou triplicou, ou cortou pela metade de acordo com isso. Aplique uma ou duas vezes ao dia até ficar bem.

Olhos, orelhase protocolos de nariz

Limpar seus olhos, ouvidos e nariz com MMS pode permitirpara curar quando nada mais o fará. MMS é muito gentil com esses delicados amigos do corpo. Siga as instruções fornecidas abaixo.

Nunca recomendamos o uso de água da torneira para suas doses de MMS. Especialmente para os olhos, ouvidos e nariz, você quer ter certeza de não usar

água da torneira para fazer a mistura, já que quase toda água da torneira nos EUA e em muitos outros países tem flúor e frequentemente cloro como

Nós vamos. Não permita esses venenosem seus olhos, ouvidos ounariz. Água destilada, se disponível, é a melhor escolha para oOlhos, ouvidos e protocolos de nariz e, em segundo lugar, purificadosagua. Evite água da torneira. Ao fazer as pazesessas fórmulas diferentes (que não são todas asmesmo), certifique-se de marcar claramente todas as garrafas para não confundir o que é o quê.

Olhos

No passado, usei uma fórmula de olho de 1 ativadogota de MMS para 1 onça / 30 ml de água destilada e, às vezes, 1/2 gota de MMS1 para 1 onça / 30 ml de água destilada. Ambas as soluções podem funcionar para alguns tipos de corpo. No entanto, esta força do MMS1 para os olhos temcausou desconforto em alguns casos. eud e s d e e n t ã o , d e s e n v o l v e r a m u m a n o v a f ó r m u l a p a r a o s o l h o s (a b a i x o) e d e s c o b r i r a m e s t a solução mais fraca terá o mesmo propósito de superar problemas oculares. Uma boa regra é se oos colírios ardem ou queimam mais do que apenas alguns segundos (alguns segundos é normal) ou em um grau que não pode ser folgado,então seria melhor diluir sua solução com destiladaagua. Se você tem tiras de teste e pode testar seu olhofórmula, os amigos por milhão para a solução ocular MMS1 descrita abaixo deve ser entre 6 e 10 ppm.

Fórmula MMS1 para olhos

0 Ative 1 gota de MMS com 1 gota de HCI 4%(preferido para os olhos), ou ácido cítrico a 50%. Tenha certezavocê esperou o tempo correto (30segundos) e que o líquido MMS ficou âmbaremcOIOr.

0 Adicione 4 onças / 120 ml de água destilada ou purificada a 1 gota ativada.

0 Despeje esta solução em frasco (s) conta-gotas ou frasco spray.

Notas

¥ *Esta é a fórmula básica para os olhos - 1 gota ativadaoFMNS a 4 onças / 120 ml de água purificada.*

¥ Esta mistura dura cerca de uma semana se estiver em uma garrafa com tampa bem fechada e mantida em local fresco e escuro. Portanto, certifique-se de preparar um novo lote a cada semana, se necessário. É provável que seja mais do que suficiente para colírios ou spray por um período de uma semana para uma pessoa. A fórmula real para os olhos deve ser uma gota ativada de 1/4 para 30 ml de água destilada. No entanto, como não é possível medir 1/4 de uma gota por conta própria, sugerimos misturarsua solução para os olhos desta forma.

Procedimento de olho MMS1

Estes são os nossos dois métodos preferidos de aplicação doMistura MMS1 aos olhos:

1. Frasco de spray para os olhos.

0Coloque a solução da fórmula para os olhos descrita acima (1 gota ativada de MMS para 4 onças / 120 ml de água) em um frasco de spray limpo.

0 Para obter a melhor ação de cura, lave o olho ou ambosolhos com essa mistura.Com a cabeça ligeiramente inclinada para trás, os olhos bem abertos e olhando para oteto, pulverize cada olho 4 a 8 vezes por aplicação.Tente manter os olhos abertos ao pulverizar e, em seguida,Pisque várias vezes para ajudar na lavagem. Pode queimar

apenasum pouquinho no início, mas se a sua mistura estiver correta, isso vaipassar rapidamente.

0Doisto 3 a 4 vezes ao dia para melhores resultados.

2. Frasco conta-gotas para olhos.

0Use a mesma mistura de fórmula para os olhos (1 gota ativada de MMS para 4 onças / 120 ml de água), adicionada a um frasco conta-gotas.

0Coloque 3 ou 4 gotas em cada olho enquanto pisca para espalhar ao redor.

0 Faça isso 3 ou 4 vezes ao dia.

Notas

¥ *Para a maioria dos problemas oculares, o MMS resolve em um a quatro dias, com alguns casos levando até uma semana, mas você pode continuar*usar a solução para os olhos se necessário, até bem.

¥*Use a mesma mistura e procedimento para crianças.*

¥ *Use o spray para os olhos ou conta-gotas 1 a 2 vezes por semana para manutenção.*

¥ *Seja diligente para marcar claramente seus boNles. Você não gostaria de misturar um spray para a pele com um spray para os olhos - são dois completamente diferentessoluções.*

Ouvidos

Observação:*A Fórmula da proporção degotas para a água são diferentes para o ganho e o nariz do que para os olhos.*

Fórmula MMS1 para orelhas

0 Ative 1 gota de MMS com 1 gota de 4^{O}/ oHCI ou 50^{O}/ o Ácido Cítrico. Certifique-se de ter esperado a quantia correta

de tempo (30 segundos) e que o líquido MMS1 tem ficou de cor âmbar.

0 Adicionar 1 onça / 30ml de água destilada ou purificada para o
1 gota ativada.

0Esta é a fórmula básica para orelhas - 1 gota ativada para 30 ml de água purificada. A mistura de ouvido dura cerca de uma semana quando conservado em garrafa com tampa bem fechada e em local fresco e escuro. Portanto, certifique-se de preparar um novo lote a cada semana, se necessário.

Procedimento de ouvido MMS1

Passo 1

0 Use a solução acima, 1 gota ativada para 1 onça / 30ml de água. Para adultos, encha um conta-gotas padrãoc o m 1 aperto forte (total) da lâmpada (isso é cerca de 18gotas). Use metade dessa quantia para uma criança.

0 Faça a pessoa deitar de lado com a cabeça alinhada com o corpo. Se estiver deitado em uma cama, você precisará usar um travesseiro, a cabeça deve estar no nível do corpo, não acima ou abaixo do pescoço e ombros.

Passo 2

0 Coloque lenta e cuidadosamente o conta-gotas no ouvido e, em seguida, aperte suavemente o bulbo 5 ou 6 vezes, permitindo que o líquido do conta-gotas entre e saia pelo ouvido a cada vez. Isso deve ser o suficiente para levar o líquido ao fundo da orelha. O objetivo é fazer com que o líquido chegue ao fundo

da orelha. (Enxágüe o conta-gotas algumas vezes com uma solução mais forte de MMS1, como a concentração do frasco de spray para pele, apertando o bulbo

para colocar e tirar a solução antes de colocá-la de volta no frasco.)

Notas

!> Normalmente, especialmente com crianças, (porque as crianças geralmente curam mais rápido do que os adultos) este procedimento elimina a maior parte da dor imediatamente, mas se não, continue com este procedimento de hora em hora até que a dor desapareça.

*b A dor pode diminuir, mas você deve continuar com este processo 2 a 3 vezes ao dia até que esteja completamente bom (livre de qualquer infecção), o que deve ser a partir de um dia*para*não mais do que uma semana.*

Nariz

Nota: a fórmula*d a p r o p o r ç ã o d e a t i v a d o g o t a s r e g a r é d i f e r e n t e p a r a o g a n h o e o n a r i z d o q u e o d o s o l h o s.*

Fórmula MMS1 para o nariz (esta é a mesma fórmula quanto às orelhas)

0 Ative 1 gota de MMS com 1 gota de 4^{O}/ oHCI ou 50^{O}/ oÁcido Cítrico. Certifique-se de tere s p e r o u o c o r r e t o q u a n t i a de tempo (30 segundos) e que o líquido MMS1 temficou de cor âmbar.

0 Adicione 1 onça / 30 ml de água destilada ou purificada a 1 gota ativada.

0E s t a é a f ó r m u l a b á s i c a p a r a o n a r i z - 1 g o t a a t i v a d a p a r a 3 0 m l d e á g u a p u r i f i c a d a . I s s o v a i d u r a r c e r c a d e uma semana se mantido em garrafa com tampa bem fechada e armazenado em local fresco e

escuro. Portanto, certifique-se de fazer um novolote a cada semana, se necessário.

Procedimento de nariz MMS1

O seguinte procedimento é eletivo quando o nariz de uma pessoaestá entupido e / ou quando está resfriado. Além disso, esteo mesmo método geralmente funciona quando alguém continuaproblemas de sinusite e um nariz entupido continuamente por semanas ou até anos. Esta mesma técnica pode ser usada emalém do Protocolo 1000 durante a superação da gripe.

Passo 1

0 Use a fórmula acima - 1 gota ativada de MMS para 1onça / 30 ml de água.

0 Deite-se de costas na cama. Não põe a cabeça em um travesseiro.

Passo 2

0Coloque 4 a 8 gotas desta solução em uma narina. Ele vaiqueimar um pouco, pois o nariz queimará mesmo com água pura,mas o MMS1 não causará nenhum dano. A ideia é permitirparte do MMS1 para drenar em seus seios da face e permanecerlá por aproximadamente cinco minutos. Você pode esperarparte disso acabe quando você se levantar. Ajuda atenha um lenço de papel à mão.

0 Repetir o passo acima para a outra narina.

Observação:*Faça isso 3 vezes ao dia até que você esteja bem, o que não deve demorar mais do que dias de excursão na maioria dos casos. No caso de você ser*não*bem em dias de turnê, continue até que você esteja bem.*

Protocolo de banho e pedilúvio

Tomar banho em MMS1 ou MMS2 é mais um método de obter MMS1 (que produz dióxido de cloro, Cl02) ou MMS2

(que quando misturado com água produz ácido hipocloroso [HOCI], que é um ácido que o corpo usa para destruir patógenos), no corpo, embora por uma via diferente, entãopode atingir outras áreas e penetrar mais profundamente nos tecidos.

Instruções para banhos MMS1

Banho Completo

Nota: Para banhos MME*não use água com cloroou flúor nele. Tente descobrir se sua água da torneira contémcloro ou flúor; se isso acontecer, use uma água de osmose reversafiltrar ou comprar água purificada em caixas grandes. Outropossi-Outra opção é que muitas pessoas dizem que o bórax pode eliminar o flúor e o cloro da água do banho. Há muitas evidências anedóticas na internet e alguma química indica que o boro no bórax cria fluoreto de boro a partir do fluoreto da água. Este não é um venenoquimiCal e não é perigoso para a saúde. Um similarproduto químico não venenoso também é produzido a partir do cloro. Use duas colheres de sopa redondas de bórax para um padrãobanheira de tamanho. Aguarde pelo menos 15 minutos após mexer obórax na água (água fria ou quente está OK) e, em seguida, adicioneseu MNS.*

Passo 1

0 Ative 20 quedas de MMS, conte até 30 segundos e façacertifique-se de que mudou para a cor âmbar.

0 Adicione as gotas ativadas a uma cuba com 15 a 30 cm de água. Use água quente, tão quentecomo você pode ficar confortavelmente.

0E n t r e n a b a n h e i r a e d e i t e - s e o u t e n t e s e s i t u a r para obter o máximo de água

possível. Se você não estiver totalmente submerso, use as mãos para lamber suavemente a água sobre seu corpo.

0 Fique na água por cerca de20 minutos.

Observação: comece usando 20 gotas de MMS ativadas por banho, da próxima vez use 40 gotas ativadas e depois 60.

Passo 2

0 Tome um banho de MMS1 1 a 3 vezes ao dia e geralmente
não mais de 60 gotas por banho.

etapa 3

0 No segundo ou terceiro dia, comece a adicionar gotas de DMSOpara a solução MMS1 após o tempo de ativação terconcluído. (Certifique-se de que sua banheira está completamente limpa e livre de qualquer resíduo de sabão, etc.) Emprimeiro use 1/2 gotas de DMSO quantas gotas de MMS ativado e, em seguida, cada vez que você preparar um banho, aumenteas gotas de DMSO até que você esteja usando3 gotas de DMSO para cada 1 gota de MMS ativado (MMS1). Não é necessário usar mais de 3 gotas de DMSO para cada gota de MMS ativada. (Lembre-se de que quando dizemos 1 gota de MMS1, isso é 1 gota de MMS ativado. Tecnicamente, 1 gota de MMS1 é 2 gotas de líquido, [1 gotaMMS + 1 gota de ácido ativador = 2 gotas de líquido].No entanto, nos referimos a isso como uma dose de 1 gota de MMS1.Nesse caso, não contamos a queda do ativador.Então uma dose de 3 gotas de MMS1 exigiria 9 gotas de DMSO, o que é 3 gotas de DMSO para cada 1 gota de MMS1[MMS ativado].)

0 Quer esteja a tomar banho apenas com MMS1, ou tenha adicionado DMSO à água, fique na água durantecerca de 20 minutos.

Notas

!> Os banhos podem ser muito importantes e se você se sentir melhor, não pare de tomar MMS1b a n h o s (p a r a c i m a a três banhos por dia) até ter certeza de que não há mais nada a ganhar.

*¥ As instruções acima, que sugerem tomar até três banhos de NNS1 por dia, e adicionar DMSO ao banho emo segundo ou terceiro dia, é particularmente recomendado emeste valor, no caso de quem está lutando contra um determinadodoença e / ou doença com risco de vida. No entanto, o NNS1banho (ou banho MMS2 - veja abaixo), pode servir a muitos propósitos. Esses banhos são ótimos para uma desintoxicação geral,especialmente se alguém souber que foi "exposto" a algumtoxinas de alta resistência, como devido a viagens / voos de avião, ou devido*a passar um ou vários dias em uma grande cidade poluída, ou estar em qualquer ambiente tóxico geral. Se você sentir necessidade de alguma desintoxicação extra por causa do que foi exposto, experimente um banho de MMS.

*!> Se por acaso você mora e trabalha em uma cidade grande e poluída, considere tomar um banho de MMS 1 a 3 vezes por semana. Ou, você pode querer*para desfrutar desses banhos algun*s v e z e s p o r s e m a n a s i m p l e s m e n t e p a r a o p r a z e r d o r e l a x a m e n t o , e para embelezar a pele.*

*!> Um banho MMS pode servir como um tratamento de beleza e muitos relataram uma pele mais clara, lisa e macia após adicionar banhos NNS à sua programação semanal. Experimente o banho NNS1 ou MMS2, veja o que seu corpo aguenta e, em seguida, adicione esses banhos*à sua rotina conforme a necessidade surge e / ou conforme você se sente conduzido.

Banho de pé

Um banho MMS completo é muito mais eletivo e, portanto, mais desejável do que um banho de pés MMS. Isso ocorre porque uma parte maior da pele está em contato direto com a solução MMS e

vários amigos do corpo têm a chance de obter o MMS diretamente através da pele em uma área-alvo. Por exemplo, se você tem câncer de mama e pode mergulhar (e seios) na água, pode ser benéfico. Ou, se oo problema está nos amigos particulares e você está imerso na água do MMS, mais pode ser absorvido diretamente para oárea problemática.

Para aqueles que não podem ter banheira, ou que não podempara entrar e sair de uma banheira por um motivo ou outro, ou para quem talvez não tenha água não contaminada suficiente para um banho completo, sugiro um escalda-pés. Os pedilúvios são uma ótima maneira de relaxar e, com esse método, uma boa quantidade de MMS ainda pode entrar no sistema e fazer algum bem. Por favor, note que eu sugiro a mesma quantidade de gotas para um banho de pés que um banho de corpo inteiro. Isso ocorre porque a pele dos pés, tornozelos e até mesmo das pernas tende a ser mais forte ou mais resistente do que o peito, costas, braços, estômago e amigos íntimos.

Passo 1

0Use água na altura do tornozelo em uma pequena bacia de plástico.

0 Seguiras mesmas instruções fornecidas acima para o banho completo com a mesma quantidade de gotas de MMS1 e DMSO.

Variações

X Se a água for escassa, pode-se preparar o escalda-pés com pouca água, nem mesmo o suficiente para atingir o topo do pé. Coloque um pano em cima do pé e deixe a água penetraro pano enquanto um pouco de água ainda permanece sob o pé. Isso serve como um

tipo de compressão e ainda vai ajudar maisMMS para entrar na pele / tecidos.

X Prepare o escalda-pés usando um recipiente mais profundo para a água, como um balde, de modo que a água chegue até o

panturrilha ou até os joelhos. Siga a mesma fórmula - some60 gotas ativadas de MMS por banho.Isso permite que uma área de pele maior seja coberta.

Instruções para banhos MMS2

Cuidado: Ao contrário do banho MMS1, nunca adicione DMSO a um banho MMS2! (Para obter mais detalhes, consulte o aviso empáginas 23-24.)

Passo 1

0 Prepare a água do banho ou escalda-pés de acordo com as instruções na nota na seção Banho completo, página 143.

Passo 2

0 Para um banho completo, use 3 colheres de chá rasas (15 ml) de MMS2 (hipoclorito de cálcio) na primeira vez. Se a pele fizerOK, você pode aumentar com cautela até 10 colheres de chá rasas (50 ml) de MMS2 por banho. Você pode quererpara borrifar os grânulos de MMS2 na água sem tocá-los, então, uma vez na água, misture ao redorcom a sua mão. Se você conseguir alguns dos grânulos secosem suas mãos, tome cuidado para não tocar seus olhosatéé bem enxaguado oP.

0 Para um banho de pés, use as mesmas medidas que o banho completo MMS2 conforme descrito acima.

Observação:*Tipos de pelevariam amplamente de pemon para pemon. SE você notar alguma irritação ou queimação na pele, saia imediatamente da água e enxágue. Na próxima vez, use apenas 1/2tanto NNS2.*

Variação: As mesmas variações listadas acima para o banho MMS1 podem ser aplicadas para os banhos MMS2, com o

exceção, novamente, que você nunca, nunca adiciona DMSO a um banho MMS2, pois os dois não são compatíveis.

Protocolo Enema

Os enemas têm sido usados há milhares de anos em muitas culturas para limpar o corpo, aliviar febres e curardoença. Era uma ferramenta comumente usada pelos médicos atérecentemente. Também pode ser um sistema de entrega eletiva para MMS1, especialmente quando um atingiu o máximodose oral tolerável pela mãe.

Usar um enema MMS1 é frequentementemuito impolante para orecuperaçãoda Saúde. O enema fornece dióxido de cloro para o fígado e para a corrente sanguínea, bem como neutralizantestoxinas e matando parasitas no intestino. Além disso,adicionar MMS1 no enema mata patógenos no cólon e muito do MMS1 é absorvido através do cólonparedes no plasma sanguíneo. Em muitos casos, o enema dará ao cólon uma limpeza muito necessária.

Se você não sabe como fazer um enema, por favorestude e familiarize-se com o processo antes de tentar. Existem muitos sites de instrução na Internet para esse fim. Basta inserir as palavras “enema how to” em qualquer mecanismo de busca e você encontrará todas as informações de que precisa.

A maioria dos equipamentos ou kits de enema vem com um bocal stiP que é inserido no reto e sobe no cólon cerca de 15 a 20 cm. Como alternativa ao uso do bocal de enema stiP, sugiro enfaticamente o uso de um cateter simples com a bolsa de enema no lugar do bocal de plástico rígido. O cateter é um tubo flexível e, portanto, pode ajudar a evitar a possibilidade de perfurar um orifício na lateral do cólon, como alguns

fizeram, usando a ponta mais rígida. Qualquer que seja o equipamento que você decidir usar, vá devagar e não prossiga

se houver desconforto. (Algumas bolsas para enema também incluem o tubo do cateter ou podem ser adquiridas separadamente junto com um conector que liga o cateter ao tubo da bolsa para enema. Este equipamento está disponível na maioria das farmácias ou online para uma seleção maior.)

Instruções para o protocolo Enema

Notas

b Se você estiver usando enemas por conta própria para vários problemas, como problemas de bexiga, ou se você estiver em outros protocolos ao mesmo tempo, E gotas de MMS ativado em 1000 ml (1 litro / quarto) de água purificada (morna ou temperatura corporal) na bolsa de enema seria uma boa quantidade para começar. Aumente as gotas em cada enemaaté chegar a 30 gotas. Sea q u a l q u e r m o m e n t o v o c ê s e n t e d e s c o n f o r t o ou que a solução é muito forte, corte as gotas pela metade e aumente lentamente a partir daí para o que você está confortável-capaz com.

b Usar ácido cítrico como ácido ativador pode tender a queimá-lo; sobe muito com suas gotas, especialmente após 20gotas. Para enemas, 4% de HCI (ácido clorídrico) é oácido ativador preferido para usar.

*b Não use um saco de enema de aço inoxidável. Algumas pessoas consideram isso o melhor, no entanto, o aço inoxidável pode reagir quimicamente com o NNS e, portanto, é*não um*Boaescolha.*

Cuidado: Nunca use DMSO em um enema! Por quê? OO cólon contém muitas toxinas que o corpo está liberando. Se vocêscoloque DMSO no cólon, você pode retornar alguns dessestoxinas de volta para a corrente sanguínea.

MMS
Health
Recover
y
Guldebo
ok

0 Prepare a água para o seu saco de enema aquecendo1000 ml (1 litro / qual) de destilado, osmose reversa ouágua engarrafada à temperatura corporal. (É impolente aquecer a água da bolsa de enema até a temperatura corporal, pois o uso de água fria pode causar cólicas graves.)

0 Selecione o número de gotas que deseja usar (5 gotasa primeira vez). Em um copo limpo e seco, ative suas gotas e conte 30 segundos. (Lembre-se, se estiver usando ácido cítrico,você não vai querer passar de 20 gotas por enema. HCI4^{0}/ o é o ativador preferido para enemas.)

0 Adicione as gotas ativadas à água quente que preparou. Despeje um pouco da água morna no copo ativador MMS e, em seguida, despeje a solução de volta no recipiente com a água morna. Agora você tem sua solução de bolsa de enema. (Certifique-se de que todos os utensílios usados para esta preparação estão bem limpos.)

Passo 2

0 Encha sua bolsa de enema com a solução. Para os primeiros enemas, é aceitável usar metade dessa solução ou até menos em sua bolsa de enema se você não for comfolable usando mais. Você pode aumentar a quantidade de líquido um pouco a cada vez até usar a quantidade total de 1000 ml (1 litro / qual) de solução. Siga seu próprio ritmo, não se torne excessivamente desleixado. Pare antes de chegar a 1000 ml (1 litro / qual) se você se sentir descompactável.

etapa 3

0 Comece o enema. Deixe a água fluir. Tente segurá-lo por 5 a 10 minutos, se puder. Se você não pode segurá-lo,

Isso não é um problema. Tente segurar uma quantidade menor, às vezes é mais fácil, então repita.

Notas

!> Se você começar com uma solução de 5 gotas, faça isso uma ou duas vezes e, em seguida, faça uma solução de 10 gotas e assim por diante.

!>V o c ê p o d e i r a t é 2 0 a 3 0 g o t a s s e t r a b a l h a r , m a s n ã o c o n t i n u e s e i s s o c a u s a r p r o b l e m a s .

bV o c ê p o d e f a z e r 2 a 3 e n e m a s p o r d i a .

!> Se notar melhora após fazer 4 ou 5 enemas, continue fazendo enemas até que não haja mais nenhuma indicação de melhora. Mas se não houver melhora após 4 ou 5 enemas, não continue com eles. Como eudisse, enemas podem ser uma parte muito importante da recuperação da saúde; no entanto, eu não sugiro prolongadouso de enemaspois podem ser duros para o corpo. Neste caso, se você não ver nenhum sinal de progresso após 4 ou E enemas, não continue. Vá para o protocolo ou procedimento neM descrito em S a ú d e Plano de recuperacao.

Exceção: se você estiver em outros protocolose lutando contra umdoença com risco de vida, você pode aumentar as quedas noenema em conformidade. Por exemplo, se você é uma daquelas pessoas que tolera uma quantidade maior de MMS1 - digavocê está tomando 9 a 12 gotas ou maisuma hora no seu oraldose — então você pode ser capaz de aumentar a quantidade de MMS1 que você coloca em sua bolsa de enema. Mas não vá

além60 gotas em 1000 ml (1 litro / quarto) de água por enema.Lembre-se de que esta é a exceção, não a regra.

Bons resultados foram obtidos com próstata e bexigader problemas com enemas, bem como muitos outros problemas.

Colônicos

Um cólon (também chamado de hidroterapia do cólon ou irrigação do cólon)ção) é a infusão de água no reto por um cólonterapeuta para limpar e enxaguar o cólon. Colônicos e enemas têm como objetivo limpar o cólon, introduzindoágua por meio do reto.Embora os dois métodossão semelhantes em abordagem e em seus benefícios para a saúde, existem algumas diferenças distintas entre colônicos e enomas.

Os enemas envolvem uma infusão única de água no cólon. O cólon envolve várias infusões de água no cólon. O objetivo principal dos enemas é evacuar a parte inferior do cólon, enquanto os colônicos são destinados a limpar uma camada maior do cólon. O cólon é mais completo e pode ser mais benéfico dependendo do problema e da doença.

Ao contrário dos enemas, que podem ser realizados em casa com oajuda de kits do-it-yourself, cólon requer especializadosequipamento e deve ser administrado por um treinadocólonterapeuta.

Durante o aquecimento do cólon, a água filtrada é lentamente liberada no cólon. A água faz com que os músculos do cólon se contraiam, o que é chamado de peristaltismo. O peristaltismo "empurra" as fezespara fora através da mangueira para ser descartado em um sistema de resíduos fechado. Durante esse processo, o terapeuta do cólon pode aplicar uma leve massagem na área abdominal do cliente para facilitar o processo.

Você vai querer encontrar um terapeuta do cólon experiente que saiba o que está fazendo. O terapeuta deve perguntar a vocêperguntas sobre o seu histórico de saúde para ter certeza de que não há contra-indicações para você receber os colônicos. Além disso, o terapeuta deve realizar um exame externo simples

verificação do cólon e do intestino, bem como um exame muito simplesexame retal para certificar-se de que as condições são adequadas para receber o cólon.

Você também vai querer encontrar um terapeuta que use o MMS1 no cólon por sua recomendação. Eles podem ou não ter experiência com MMS1 (você pode orientá-los sobre como usar os colírios). Certifique-se de verificar se eles estão usando água de boa qualidade e não água da torneira, pois geralmente contém cloro e / ou flúor. Rotineiramente, eles farão você colocar um vestido e deitar sobre uma mesa parao cólon.

Eu sugiro que você use 20 gotas de MMS1 (MMS ativado)pela primeira vez e 50 gotasd e M M S 1 o s e g u n d o T e m p o . S e t u d o c o r r e r b e m e v o c ê c o n t i n u a r c o m a h i d r o t e r a p i a d o c ó l o n , p o d e i r até 100 MMS1 gotas para sessões subsequentes do cólon.(Esta quantidade de gotas é de 20 a 25 litros / quals deagua. Se mais água for usada no cólon, as gotas podemser ajustado de acordo.)

Lembre-se de que há muita água usada no cólon, então essa quantidade de MMS1 não é um problema.

Protocolo Douche

Este protocolo é recomendado para problemas vaginais, infecções ruins, bem como câncer e a maioria das outras doenças e problemas (como miomas, pólipos e cistos) dos órgãos reprodutivos femininos (ovários, útero e mama). No caso do câncer de mama, o colo do útero absorve o MMS1 e o transporta para o sistema linfático e para a mama. O MMS1 na ducha mata os patógenos na área, permitindo que o corpo crie saúde ali. No geral, duchas só são necessárias quando algo precisa ser corrigido.

Instruções para MMS1 Douche

As instruções a seguir presumem que alguém sabe dar uma ducha. Se não, por favor, eduque-se suPicientemente sobre oprocesso antes de seguir este protocolo.

Passo 1

0Você precisará de um ducha de 2 xícaras / 500 ml. Você pode usar um ducha maior, mas não é necessário usar maisde 2 xícaras / 500 ml de água.

0 Prepare sua solução. Stat out com 5 gotas de MMS1para as 2 xícaras / 500 ml de purificado, destilado ou reversoágua de osmose. Como o enema, 4%/ o HCI, é opreferidoácido ativador para usar com ducha, embora ácido cítrico 50%/ o pode ser usado. É melhor aquecer a água para a ducha à temperatura corporal.

0 Ao fazer a ducha, deixe a água fluir até que pare para sair novamente e feche o fluxo. (O tubo com seu ducha geralmente vem com uma braçadeira para abrir e fechar o fluxo de água.)

0Contraia os músculos pélvicos / vaginais para segurá-los o máximo possível e, em seguida, solte. Repita este processo até o saco está vazio.

Passo 2

0 Se não tiver reações adversas, aumente a quantidade de gotas de MMS1 para a próxima ducha.

0 Na próxima vez, adicione 10 gotas ativadas à água que vocêdespeje no ducha e continue aumentando até 30 gotas enquanto não houver dor ou problema, mas não use mais do que 30 gotas. Aumente para este valor lentamente.

Adicionando DMSO a um Douche

0Sua ducha pode ser mais eletiva com o uso deDMSO,o que pode ajudar o MMS1 a penetrar mais profundamente nos tecidos. Adicione 3 gotas de DMSO para cada 1 gota deMMS1 que você está usando em sua bolsa.

Cuidado: Ao adicionar DMSO a uma ducha, é im-importante que você tenha um ducha que não é feito de borracha ou látex (que é uma forma refinada deborracha). Existem vários tipos de recipientes de duchadisponível, se você deseja adicionar DMSO, use um que é feitode plástico (incluindo a mangueira), não de borracha, como oa borracha pode penetrar no corpo junto com o DMSO.

Notas

!> Sevocê sentir queimação e / ou ardor, isso geralmente é uma indicação da presença de fungos. neste caso, eu sugiro fazendo uma ducha de argila. Use 1 colher de chá rasa de argila (argila asteca, bentonita, argila ou argila montmorilonita) em 2 xícaras de água para sua ducha. Mantenha o recipiente de ducha bem agitado para essas duchas de argila. Faça dois ou três barroducha por dia e sempre "lave" a argila (usando oducha e água limpa) após uma hora. AEer trêsdias, você pode verificar se o fungo desapareceu usandoa mesma solução MMS1 quecausou inicialmente a queimação e / ou picadas. Se você não sentir mais ardor e / ou ardor, isso significa que o fungo se foi, mas podem ser

necessárias mais duchas sem argila. Você pode continuar comseu MMS1 duplica de acordo com as instruções neste DoucheProtocolo.

!>Em caso de câncer ou infecções ruins que você pode aplicar 4 a E vezes ao dia (trabalhe até isso). Certifique-se de que a ducha não causa irritação.

*b Normalmente, douche 1*a 4 vezes ao dia, dependendo da gravidade do problema. Uma vez por dia pode ser suficiente. Depende de você determinar quantas vezes por dia. Lembre-se da regra, enquanto você estiver melhorando não pare, mas não continue se não houver benefício.

!> Faça sua última ducha do dia antes de dormir para absorção e desintoxicação enquanto você dorme. Lembre-se, se após cerca de uma semana você não notar nenhuma melhora, não continue, mas continue enquanto houver melhora.

*¥S e m p r e q u e v o c ê e s t á f a z e n d o o p r o t o c o l o D o u c h e , é s e m p r e uma boa ideia*estar tomando o protocolo oral, seja o protocolo*1000 ou ProtoCol 2000, dependendo da situação.*

Protocolo de Bolsa MMS

Esse processo é uma forma adicional de obter dióxido de cloro MMS1 para dentro e sobre o corpo, ajudando a superar patógenos, venenos e metais pesados. Este processo de gaseificação émais intenso do que usar um borrifador.

Cuidado: Evite respirar qualquer um dos vapores. Vigarista-o contato com a pele controlado de MMS1 está ok, mas seus pulmões não toleram muito gás de dióxido de cloro. Abra uma janela nosala enquanto você está fazendo isso. Se acontecer de você respirarem algumas respiraçõesde fumaça de MMS1, você pode não ter muitode uma reação no início, mas se você respirar, épossível que algum tempo depois (quatro horas ou mais), você podesentir dificuldade em respirar por algum tempo. É melhorevite respirar diretamente para começar.

Instruções para protocolo de bolsa MMS1

Este procedimentopode ser feito 2 vezes ao dia, durante um período de alguns dias, se necessário. Será necessário estabilizar com um número de gotas ativadas de celain e construir o

montante durante três dias. Certifique-se de ler atentamente e ter um bom entendimento de cada ponto abaixo antes de tentar este protocolo.

Passo 1

0 Pegue dois sacos de lixo grandes (os grandes e pretos funcionam melhor) e faça um saco com eles. Coloque-os sobre uma mesa, ou no chão, junte-os na abertura de cada bolsa. Nesta junção, prenda-os em toda a volta com fita de transporte / embalagem de 2 “(Scm) de largura, de modo que a boca de cada saco fique colada na outra, formando um saco longo. (Você pode endurecer usando pequenos pedaços de fita para mantê-los juntos e, em seguida, prenda-os em toda a volta com fita larga, colando primeiroum lado e depois o outro.)

0 Corte uma extremidade do saco aberto e, em seguida, verifique se não está grudado no centro onde vocêcolou as duas sacolas juntas.

Passo 2

0 Tire a roupa completamente ou use o mínimo de roupa possível.

0 Abra o saco e entre nele. Neste ponto, ajuda ter uma cadeira à mão, para que você possa se sentar. Com os pés na sacola, puxe-a até a altura da cintura, depois sente-se na cadeira e prepare suas gotas.

0 No primeiro dia, coloque 20 gotas de MMS e 20 gotas de 50^{O}/ o ácido cítrico ou 4 / o HCl em um copo, e imediatamente(não espere para contar 30 segundos) coloque o copo dentro da bolsa de forma que fique no chão próximo aos seus pés, sendocuidado para não derramar. Se derramar, tome cuidado para nãocoloque-o em seus pés, mas vá em frente e

use-o como quisertambém criam vapores de dióxido de cloro.

0 Levante-se com cuidado e puxe o saco para cima em volta dos ombros e pescoço, envolvendo e dobrando o plástico para que não escape fumaça.

Cuidado: Não coloque a cabeça dentro da bolsa nem respire
qualquer um dos vapores.

etapa 3

0 No primeiro dia, fique na bolsa cinco minutos, não mais. Se você sentir qualquer sensação de queimação na pele, saiada bolsa imediatamente, mesmo que não tenham se passado cinco minutos. (Neste caso, enxágue oP e / ou ducha.)

0 Repita todo este procedimento mais uma vez no primeiro dia,(em outras palavras, 2 vezes ao dia).

Passo 4

0 Desde que não haja irritação na pele, faça este procedimento por mais dois dias. No segundo dia de uso
30 gotas ativadas, e no terceiro dia use 40 gotas ativadas. Desde que não haja irritação na pele, pode-se estender o tempo na bolsa em até 10 minutos, mas não mais. Se você sentir qualquer sensação de queimação na pele, saia da bolsa imediatamente e tome um banho imediatamente. Com ou sem sensação de queimação, não ultrapasse 10 minutos na bolsa. Não há necessidade de tomar banho após esse processo, a menos que haja uma sensação de queimação.

Etapa 5

0 Se as coisas estiverem indo bem, você pode continuar por mais alguns dias até determinar se

está ajudando ou não. Sevocê nota uma melhora,continue assim enquanto está ajudando.

Notas

!> Use este protocolo para problemas de pele ou simplesmente para obter mais MMS em seucorpo. Seestá ajudando,lembrar,guardaisso!

¥Você não pode usar CDS ou CDH para este protocolo.

Protocolo de pulmão (a taça)

É irrelevante notar que este protocolo deve serseguido explicitamente. Por favor, certifique-se de ler todo o protocolo algumas vezes e de ter uma compreensão clara de cada etapa, antes mesmo de tentar executá-la. O gás dióxido de cloro por si só, uma vez queé usado neste procedimento, é a maneira mais forte de ingerirmosisto. Portanto, não posso enfatizar o suficiente a necessidade de seguir atentamente as instruções ou pode ser perigoso.Da mesma forma, se você seguir cuidadosamente as instruções,também pode dar uma nova vida aos seus pulmões.

Se você seguir essas instruções ao pé da letra, não haverá perigo, mas as pessoas geralmente ficam muito entusiasmadas e fazem muito e então podem sofrer. Hesito em contar ao mundo sobre esse protocolo, não por causa do que estou dizendo aqui, mas porque pessoas entusiasmadas às vezes exageram porque querem se curar rapidamente. Alguns podem levar o que eu digo aqui e ir longe demais. Então vá devagar e não exagere. Neste caso, mais definitivamente não é melhor.

Problemas pulmonares

Posso dar muitos nomes de doenças para os pulmões: asma, DPOC, fibrose cística, pneumonia bacteriana, enfisema, embolia pulmonar e respiratória leve a gravedoenças de todos os tipos, como resfriado comum, crupe, tuberculose e câncer de pulmão. A maioria das doenças do

pulmões causam sintomas que você pode sentir, e muitos delesvai fazer você tossir. Tossindo em geralnão é causado poruma coceira na garganta, mas principalmente porque o corpo estátentando tossir muco que tende a bloquear os tubos respiratórios. O muco também pode ocultar várias doenças. Obtendolivrar-se do muco nos pulmões é a chave para curá-los. esteprotocolo, que gosto de chamar de “a xícara” é para esse propósito. Além de se livrar do muco, o gás dióxido de cloro liberado do MMS1 (MMS ativado) podetambém matam patógenos de doenças nos pulmões que não sãoescondendo-se no muco.

Como ajudar seus pulmões com o gás MMS1 (usando o P)

Passo 1

0 usoum copo ou copo limpo e seco que contém 8 onças delíquido. (Um vidro com cerca de 3 polegadas / 7,6 cmem diâmetrono topo é o ideal.) Absolutamente não use um metalcopo, pois vai reagir negativamente com a mistura.

0Ative 2 gotas de MMS com 2 gotas de ácido cítrico 50% ou HCl 4%. Imediatamente coloque sua mão sobre o boca do copo, cobrindo-o completamente, e conte10 segundos. (Enquanto conta, agite as gotas no copoligeiramente para misturá-los bem.)

Passo 2

0 Após 10 segundos, leve a xícara até o nariz lentamente e, em seguida, remova a mão. Colocando seu nariz direitosobre a borda do copo, respire lentamente até que vocêsentir uma "mordida" (uma sensação de

picada ou arrepio) noponta do seu nariz. Assim que sentir uma mordida, pareimediatamente. Faça isso apenas uma vez, respirando pelo nariz.

Etapa 3

0 Em seguida, coloque a mão sobre a boca da xícara novamente por mais 10 segundos.

0 Após a segunda contagem de 10 segundos, leve o copo atésua boca, retire a mão do copo e inspire lentamente pela boca da boca do copo até começar a sentir uma “picada” nos pulmões, depois pare.

É isso para esta

sessão.Lembrar

- Ao respirar pelo nariz e peloboca - respire devagar.

- Você deve ter um cuidado especial para respirar apenas o suficiente para começar a sentir uma picada (uma sensação de picada ou arrepio). A chave é chegar a esse ponto, mas não mais.

- O início da mordida é o sinal para parar.

Passo 4

0 Após cerca de oito a dez horas, repita as etapas 1 a 3 conforme descrito acima. Faça este procedimento apenas 2 vezes ao dia, uma de manhã e outra à noite.

O que procurar

Provavelmente, a coisa mais indelicada a se observar e ter em mente ao fazer esse processo é que o MMS supostamente faz você se sentir melhor, não pior. Se você estiver se sentindo pior ao usar este protocolo

pulmonar, algo está errado e você deve voltar ao normal. Reduza a quantidade de gotas no

copo para 1 gota de MMS1, respire um pouco menos ou parecompletamente por um tempo. Vá devagar até sentirMelhor.

Pontos importantes para o procedimento da Copa

1. Ao seguir o procedimento do copo: Se você tiver umdoença pulmonar grave, você deveriatambém está fazendo os protocolos MMS. Normalmente você começaria com o EstacamentoProcedimento e trabalho até o Protocolo1000, protocolo1000 Plus e prossiga para o Protocolo 2000, se necessário (ac-de acordo com o Plano de Recuperação de Saúde conforme descrito nestelivro). Lembre-se, aumente sua dosagem lentamente.

2. Siga todas as instruções: O tempo deste procedimento e o tamanho do copo ou copo que você usa éextremamente importante. O copo / copo deve ser pelo menos8 onças (aproximadamente 250 ml), um pouco acima desta capacidadeestá OK, mas obtenha o mais próximo possível de 8 onças. Este é o tamanho preferido para ser capaz de criar gás suficiente dentroa xícara. A contagem de 10 segundos também é muito importante,como se você esperasse muito mais, a quantidade de gás a ser inalada será mais forte e pode ser demais para tomar de uma vez. Como mencionei acima, siga estas instruçõesexplicitamente.

3. Tosse: você pode ter um ataque de tosse em qualquer lugar deimediatamente após respirar o copo até várias horas ou mesmo um dia após a realização deste procedimento. Isto é normal,como o gás dióxido de cloro está trabalhandoem quebrar o muco e ele precisa ser expelido. Isso vai afrouxar um pouco deo muco que se forma em seus pulmões que pode conterpatógenos. Este muco irá então correr para baixo em seuestômago e lentamente trabalhando para fora de seu sistema, ou seu corpo tossirá o muco e você será

capaz de cuspi-lo. Você pode tossir longa e forte, possivelmente atéa uma hora ou mais, para obter apenas um pouquinho de mucopara cima - isso é amigo do processo. Você pode achar que é enorme

quantidades de muco sairão pelo nariz, portanto, tenha bastante lenço à mão.

No caso de um ataque de tosse que não para, se continuar por mais de uma hora, pode ser necessário afrouxarum pouco mais do muco que está preso com muita força (preso nas laterais dos tubos de respiração). Neste pa1ic-Caso contrário, você pode se sentir um pouco pior devido à tosse. A próxima etapa neste caso é começar a tomarA r g i l a a s t e c a (o u a r g i l a b e n t o n i t a o u a r g i l a m o n t m o r i l o n i t a) . T o m e u m a c o l h e r r a s a d e c h á d e a r g i l a e m 1 / 2 x í c a r a d e á g u a o u a p r o p r i a d o comeu suco a cada hora por três ou quatro horas até oa tosse para.

Com esse procedimento palicular, quando você está acordado, geralmente tosse com muco que foi liberado dos pulmões ou dos tubos respiratórios, mas quando você dorme, o muco geralmente desce para o estômago, o que não é ruim. Seu corpo vai cuidar disso com o ácido do seu próprio estômago e processá-lo por meio de seu sistema, e isso não vai confundir você.

Notas

!> Se os acessos de tosse mencionados acima (que podem ocorrer após respirar o copo) durarem mais do que um período de uma hora, esta é uma indicação de que você precisa reduzir as gotas no copo para 1 gota em vez de 2 gotas.

!> SeA t o s s e c h e g o u a o p o n t o d e n a d a s a i r para cima, vá para o Protocolo de Tosse (página 131) e siga as instruções lá.

4. Pegando um resfriado: é possívelpara pegar um resfriado ao fazer este protocolo. Isso ocorre porque o muco é drenado dos pulmões e, em raras

ocasiões, pode liberar germes do resfriado protegidos pelo muco. Se você pegar um resfriado, simplesmente continue com o processo e ele deve desaparecer em um dia

ou dois, desde que você também esteja tomando MMS1 ou MMS2 por via oral de acordo com o Protocolo 1000 ou 2000, de acordo com sua necessidade.

5. Vá devagar: o processo pulmonar é algo que você podefacilmente exagerar. Mas lembre-se, uma das minhas regras de ouro:enquanto você está melhorando, não mude o que você éfazendo. Se a sua condição parecer piorar, pare ou façaquantidades menores de MMS. Continue assim até que seus pulmões estejamsaudável. Lembre-se, vá com calma. E use argila (como mencionado acima no ponto 3 sobre tosse) quando necessário.

BronchiGs: Sofri um caso grave de brônquios todos os anos no inverno por 5 anos consecutivos. Encontrei o MMS e comecei a tomá-lo ao primeiro sinal de sintomas. Não tenho bronquite há mais de 3 anos. Eu tomo uma vez por semana durante a estação fria, apenas como prevenção e toda vez que alguém em nossa casa mostra algum sintoma de resfriado, gripe, etc., tomamos a dosagem de MMS e staN.Funciona sempre. —M.R., Estados Unidos

Respire fácil: Eu sou fumante há muitos anos. Quando eu misturo um lote de MMS e começo a tomar a 3 gotadoseem 4 onças de água, minha respiração é muito mais fácil. Se você tiver problemas respiratórios ou congestão pulmonar, comece a tomar 3 gotas de MMS a cada hora. —BS, Estados Unidos

Eczema: Descobri que o MMS eliminou totalmente o eczema facial que eu sofria gravemente há dois anos. Tentei de tudo e nada funcionou, mas em poucos dias o MMS bateu na cabeça. Surpreendente. —Peter, Nova Zelândia

Capítulo 10

Erva indiana - O último esforço de recuperação da saúde

Se, depois de fazer todos os protocolos descritos no Plano de Recuperação de Saúde, você não recuperou sua saúde, entãousar Indian Herb é o próximo curso de ação. No entanto,antes de você ir para esta finalprocedimento por favor com cuidadoconsidere, mais uma vez, a lista de possíveis motivos pelos quais você pode não estar tendo sucesso total com o MMS até o momento.(Consulte o Capítulo 8, Verificação da realidade.)

Este procedimento pode ser um amigo muito indelicado para a recuperação da saúde. Existem alguns casos em que parece que o MMS não está ajudando um tumor a diminuir. Isso pode ser temporário, mas talvez não. A1er usando os protocolos 1000, 1000 Plus, 2000, 3000, bolor / fungo e todos os vários protocolos de suporte descritos neste livro conforme se aplicam, se o progresso suficiente não for visto, só então é hora deconsidere tomar Indian Herb.

Indian Herb ajudou milhares de pessoas nos últimos 80 anos. Esta pomada não funciona da mesma maneira que o MMS, portanto, espere efeitos colaterais diferentes. Esta mistura de ervas pode causar dor, inchaço, coceira e, às vezes, febre, portanto, preferimos MMS. No entanto, há pessoas vivas hoje que de outra forma não estariam aqui se não tivessem usado a erva indiana. Muitas pessoas usaram analgésicos para resistir à dor da erva, mas muitos não o fizeram.

Instruções para a erva

indiana, etapa 1

0 Não pare de receber MMS. Continue com todas as várias coisas que você adicionou ao seu protocolo: MMS1, MMS2, DMSO, enemas, banhos, etc. Em outras palavras, continue com tudo o que você já usou.

Passo 2

0 Inclua Indian Herb como amigo do que você já está fazendo. Você pode encomendá-lo de Kathleen (McDanielÁgua da linha de vida) em:

http://www.lifelinewater.com

etapa 3

0 Siga as instruções enviadas com Indian Herb.

As instruções sugerem que você dilua com 4 amigos de vaselina para 1 amigo de erva indiana. Em algumas pesadas difíceiscasos, se a erva indiana não estiver funcionando quando misturada com vaselina, você pode ter que usar a força total da erva. Use-o apenas com força total quando você tentoua mistura 4 para 1 sugerida. Observe, omais forte a mistura, mais dor você sentiráexperiência.

Em outras palavras, você pode usar até o dobro doquantidade queé dadanas instruções, e tão forte como erva indiana de força total. Mas não use força totalcerto oP, já que a quantidade menor (4 para 1) provavelmente fará o trabalho etambém dá menos dor. (Você poderiatente também uma mistura 2 para 1

mais forte, se o 4 para 1 não estiverresultados para ver se ajuda antes de atingir a força total.)

Passo 4

0 Para câncer dentro do corpo, deve-se tomar Indian Herboralmente. Geralmente usamos um vegetal ou gel de tamanho # 1cápsula cheia 1/2 cheia, mas para stal, só preencha até 1/4 e tome duas vezes ao dia. Siga as instruções quevenha com Indian Herb, mas por favor observe ocomentários acima. Ao tomar erva indiana por via oral,distancie-o de suas doses de MMS por duas horas.

Bálsamo preto

Bálsamo pretovendida por Adrian Jones, na Austrália, é semelhante à Indian Herb mencionada acima - aplicam-se quase as mesmas instruções. O ingrediente principal desta pomada é o mesmo da Indian Herb, que é o cloreto de zinco. Os outros ingredientes são ervas muito fortes e apenas dois deas quatro ervas são diferentes da fórmula da erva indiana.Se você obter Black Salve de Adrian, certifique-se de seguirsuas instruções para ocarta. Se por algum motivo você não tivesse as folhas de instruções de Adrian, seria aceito-capaz de seguir as instruções da Indian Herb e vice-versa.

Existem outras fórmulas de pomadas curativas um tanto semelhantesacessível. Os termos"Black Salve" e "Indian Herb"freqüentemente relacionam-se com unguentos de câncer em geral. Existem muitas receitas diferentes para propósitos diferentes. Quando digo Indian Herb e Black Salve, estou me referindo a Indian Herb deKathleen e Black Salve de Adrian Jones, já que sãoas duas fórmulas com as quais estou familiarizado. Eu tenho usadoIndian Herb extensivamente para superar o câncer. indianoA erva foi vendida por Kathleen no Texas e seu paiantes dela, por mais de 70 anos.E l a r e c e b e u c e n t e n a s de cartas falando de sucesso contra

câncer e outros tumores. Black Salve de Adrian Jones teve muitosucesso semelhante.

Para livros e produtos, entre em contato com Adrian em:

http://www.adrianjonesnaturopath.com/products.htm

Vesícula biliar: Meu filho (24) foi internado no hospital com ducto biliar bloqueado e cálculos biliares. Ele estava com muita dor e não conseguia comer, pois trouxe tudo de volta para cima. Os médicos queriam tirar sua vesícula biliar, mas ele recusouporque existe para um propósito. Ele ficou no hospital por 10 dias porque os médicos não pareciam querer remover o bloqueio sem a vesícula biliar. Ele também estava muito ictérico. Fiquei com ele o tempo todo porque estava [cuidadosamente] dando-lhe MMS a cada hora ... Eles tiraram sangue testa a cadadia e no nono dia disseram que ele tinha pancreaGtis (risco de vida) e estariam operando pela manhã. Naquela manhã, ele ultrapassou o bloqueio e tentou se sentir muito melhor. De manhã, quando fizeram um exame de sangue, tudo estava voltando ao normal. Eles ainda entraram para remover o bloqueio, mas ele havia sumido. Em vez disso, colocaram um stent para ajudar a drenar todo o lixo que ainda estava para trás. Quando ele voltou, em três meses, as pedras na vesícula também haviam desaparecido. Ele não teve mais problemas com a vesícula biliar. —Ruth B., Austrália

Diabetes: Muito obrigado, é um produto maravilhoso, o avô agora é dos seus comprimidos para diabetes (tantos

deles)e está muito mais feliz e cheio de vida novamente. É um produto milagroso. —Nikki

Capítulo 11

Protocolos Adicionais

Protocolo 6 e 6

O protocolo 6 e 6 é algo que pode ser usado em seupróprio — separado de todos os outros protocolos. Este protocolo consiste em tomar uma dose de 6 gotas de MMS1 e esperar uma hora e depois tomar outra dose de 6 gotas de MMS1. Oo objetivo deste protocolo é lidar com muitas coisas agudasqueparecem surgir de vez em quando, como resfriadosou gripe chegando, dores de cabeça, febres, um toque de intoxicação alimentar ou qualquer tipo de doença que pareça ser justoafirmando, ou imediatamente alertado de ser exposto a um maudoença ou germes. Também tems i d o p r o v a d o b e m - s u c e d i d o com dores crônicas, mesmo aquelas que persistiram pormuitos meses ou anos. Deve ser usado imediatamenteapós qualquer tipo de acidente, quanto mais cedo oM e l h o r , a t é no local do acidente. Os protocolos 6 e 6 provarambem-sucedido em uma ampla gama de situações, portanto, sugerimos que você mantenha um pouco de MMS e ativador de ácidoa c e s s í v e l e m t o d o s o s m o m e n t o s , p a r a q u e v o c ê p o s s a m i s t u r a r u m a d o s e d e M M S 1 s e m p r e q u e necessário.

Instruções para o protocolo 6 e 6

Passo 1

0 Prepare um 6-dropdose de acordo com as instruções em Ativando MMS e Misturando uma Dose Básica de MMS1, na página 32. (Certifique-se de que as gotas mudem para a cor âmbar.)

0 Adicione 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água ou outrolíquido aprovado que é compatível com MMS1 de acordo comas instruções nas páginas 41-45.

0 Beber diminuir a dose de 6 gotas.

Passo 2

0 Em uma hora prepare-seoutra dose de 6 gotas e beba
baixa.

etapa 3

0 Na hora seguinte, depois de tomar sua segunda dose de 6 gotas, se você estiver se sentindo bem, é isso.

Passo 4

0Se você não está se sentindo bem no final da segunda hora,é hora de se intrometer nos protocolos-chave do plano de recuperação da saúde - comece com o procedimento de piquetagem (consulte a página 79). A partir do momento em que você tomou sua última dose de 6 gotas (dos Protocolos 6 e 6), continue com 1/4 das doses a cada hora pelo resto do dia.

Etapa 5

0 No dia seguinte (dia dois), vá direto para o segundo dia do procedimento de piquetagem, que está levando 1/2 gotadoses a cada hora durante oito horas.

0 Continue para completar os dias três e quatro do procedimento de piquetagem.

Etapa 6

0 Quando terminar o procedimento de piquetagem, prossiga daí para o Protocolo 1000 e continue com o HRP conforme necessário (consulte o Capítulo 5).

Observação: os protocolos 6 e 6 oRen tratam de uma variedade de doenças que se aproximam rapidamente, destruindo os patógenos antes que eles se instalem no corpo. No entanto,*descobrimos que, quando essas duas doses de 6 gotas fazemnão cortar o problema pela raiz, então é melhor ir paradoses de hora em hora de acordo*ao HRP (ver Capítulo 5). Vigarista-*continuar a tomar doses de 6 gotas a cada hora provavelmente causará uma reação Herxheimer, o que retardará a cicatrização a longo prazo. Então, se depois de duas doses de 6 gotas você não está bem,comece o procedimento de partida e continue com o HRP comonecessário.*

Protocolo 4000

Este protocoloenvolve o uso de MMS2 (hipoclorito de cálcio)por conta própria, ou seja, sem usar MMS1 ao mesmo tempo.O protocolo 4000 não é utilizado no line-up do HRP (HealthPlano de Recuperação) como a próxima etapa do Protocolo 3000,que se pode pensar que seu nome implica. Era originalmentedestinado a ser usado principalmente em emergências quando o sódioclorito (MMS) não estava disponível.

Protocolo 4000 é basicamentetomar 5 cápsulas de MMS2 por dia.

Instruçõespara protocolo 4000

Passo 1

0 Prepare algumas cápsulas de MMS2 e siga os procedimentos sobre como aumentar suas doses de acordo com as instruções no Protocolo 2000, etapas 3 e 4 (consulte a página

93). No primeiro dia, tome um total de 5 cápsulas de MMS2. Preencha as 2 primeiras cápsulas conforme sugerido na Etapa 3 e, em seguida,continue aumentando a quantidade lentamente de acordo com as instruções na Etapa 4. (Consulte também MMS2 — Detalhes, página274.)

Passo 2

0 Uma vez que você atingiu o máximotamanho da dose, continue tomando 5 cápsulas de MMS2 por dia. Espaço para foracada dose por duas horas.

etapa 3

0 Faça isso por 21 dias ou até ficar bem. Certifique-se de seguir oTrês regras de ouro do MMS.

Notas

¥ *Lembre-se, em caso de náusea ou diarreia, reduza a quantidade de hipoclorito de cálcio em cada cápsula em E0%.Quando esses sintomas diminuírem, aumente lentamente ovalor aos valores sugeridos indicados na página 94.*

¥ *Nunca tome uma cápsula de MME3 e uma dose contendo DMSO no*mesmo tempo? Para uma explicação completa, veja*páginas 23-24.*

¥*Manutenção para cápsulas de MMS2: Tome uma cápsula da dose máxima administrada para MNS2 na página 94 uma vez (de manhã ou à noite), todos os dias para manutenção. Se você não tomou MMS2 antes de iniciar uma dose de manutenção com ele, aumente gradualmente até issodosagem sugerida.*

Procedimento de Vacina

Até onde sei, com base em 20 anos detrabalhar com MMS, acredito que o MMS pode ajudar a evitarlesões vacinais quando o processo descrito abaixo é seguido. De todas as milhares de pessoas que usaramMMS, há ampla evidência de que MMS remove venenos,toxinas e mata patógenos que causam doenças. De acordo comàs folhas de informações incluídas com as vacinas, a maioria das vacinas contém exatamente essas coisas. Portanto, significarazão MMS seria eletiva em neutralizar qualquer possi-efeitos colaterais negativos das vacinas,usado dentro de minutos, horas ou mesmo vários dias após a vacinação. (No entanto, fazê-lo o mais rápido possível após a vacinação émelhor.)

Muitas pessoas estão preocupadas com as possíveis injúrias da vacina, e um número crescente de pais não quer que seus filhos sejam submetidos a elas. Portanto, eu queroapresentar o seguinte procedimento. Incluído está o protocolo de patch MMS1 / DMSO, que descobrimos ser muito eletivo na neutralização de venenos e toxinas da pele.

Aqueles de vocês nos Estados Unidos e em outros países onde possi-ble, pode querer investigar como reivindicar isenção religiosa de vacinas. No entanto, se você estiver em uma posição em que não tem escolha a não ser tomar a vacina, você pode tentar este protocolo.

Observação:*Eu sugiro que este procedimento seja seguido usando gotas NNS1 misturadas de hora em hora*,não*outras formas oFNNS (CDS ouCDH).*

Instruções para o Vaccine Procedimento - Dosagempara Adultos

Duas semanas antes da vacinação

0 Faça o procedimento inicial, seguido pelo protocolo 1000 (consulte as páginas 79-87).

Dia da Vacina

0 Tome 6 gotas de MMS1 (MMS ativado) a cada duas horas, (para um total de 4 vezes) durante um período de oito horasperíodo. Comece esta dosagem uma a duas horas antes de vocêpegue a vacina.

0 Imediatamente após a vacinação ser injetada(de preferência quando você voltar para o carro ou no momento em que chegar em casa - embora quanto antes melhor),faça o protocolo de patch MMS1 / DMSO (consulte a página 135). O patch MMS1 / DMSOvai ajudar a neutralizar as toxinas na vacina.

0 Aplique este adesivo mais 1 vez no dia da vacinação, três horas após a primeira aplicação. Se sentir necessidade de aplicar um terceiro adesivo em mais três horas, pode fazê-lo. Mas três patches no total devem ser suficientes.

Nota: Siga atentamente as instruções para fazer um patch MNS1 / DNS0 na página 13E. Adicione mais água ao adesivo ou interrompa o uso se houver queimação ou irritação. Fique de olho.

Dia da Vacinação

0 Continue o Protocolo 1000 por uma semana para certificar-se de que todas as toxinas são eliminadas do corpo.

Notas

!>Se a qualquer momento enquanto estiver tomando essas doses você começar a sentirnáuseas ou diarreia, diminua a ingestão de MMS1. Corte pela metade a quantidade que você está ingerindo e, em seguida, trabalhe a partir delá quando os sentimentos ruins diminuem.

!> Pode haver momentos em que você não receberá nenhum aviso antes de engendrar uma vacina. Às vezes, durante a viagem, as vacinas podem ser exigidas para entrar em vários países. Se você não for avisado antes de dar a vacinação, simplesmente comece com os pontos do "Dia da Vacina" listados acima. Nesse caso, dependendo de como seu corpo está reagindo, você pode querer continuar com o Protocolo 1000 por três semanas após ovacina, em vez de uma semana.

X Este mesmo procedimento se aplica às vacinações orais, coma exceção de que não haveria necessidade deProtocolo de patch MMS1 / DMSO.

Instruções para o procedimento de vacina - dosagem para crianças

O procedimento de vacinação para crianças segue uma rotina semelhantetine como para adultos. Ou seja, duas semanas antesuma vacina inicia o protocolo. Depois, há sugestões de dosagem específicasções para o dia da vacina e instruções para a mulher no dia seguinte à vacina, etc. A quantidade de MMS1 caiadministrado a crianças, deve ser ajustado de acordo com o peso da criança.

Os adultos seguem o procedimento padrão de piquetagem e proto-col 1000 para grande parte desse procedimento para vacinas. Nocaso de crianças, eu também sugiro fazer o padrão Stak-Procedimento de ing e Protocolo 1000 para crianças (calculadode acordo com

o peso da criança) que está listado nas páginas256-258. Contanto que haja uma ou duas semanasaviso prévio antes de receber uma vacina. Se houver menos

aviso prévio de uma semana,dose a criança de acordopara o Chat de Dosagem de Vacinas para Crianças (abaixo) com o máximo de dias de antecedência da vacina. Ou, se houversem aviso você pode parar com o Chat do Dia da Vacina no dia da vacina.

Duas semanas antes da vacinação

0 Comece com o Procedimento de piquetagem seguido pelo Protocolo 1000 para crianças (páginas 256-258) e continue com esteaté o dia da vacina.

0 Se você não conseguir parar com uma ou duas semanas de antecedência, comece a administrar de acordo com o Vaccine Dosage Chat for Children sempre que puder, seja com uma semana de antecedência, três dias de antecedência ou o que quer que sejao caso pode ser.

Gráfico de dosagem de vacinas para crianças	
Peso	Dosagem MMS1
Bebês com peso inferior a 7 libras (3,2 kg)	Comece com 1/4 de queda porhora no primeiro dia, e 1/2 queda uma hora depois.
7-24 libras (3,2-10kg)	Comece com 1/2 gota por hora no primeiro dia e 3/4 gota por hora depois.
Acima de 25 libras (11 kg), a regra básica é dar 1 gota de MMS1 (MMS ativado) para cada 25 libras adicionais para uma criança.	
25-49 lbs (11-22 kg)	1 gota por hora
50-74 lbs (22-33 kg)	2 gotas por hora
75 lbs (34 kg) e mais	3 gotas por hora

Dia da Vacina

- Dê à criança a quantidade adequada de gotas de MMS1(MMS ativado) de acordo com o Dia da VacinaBate-papo para crianças (veja abaixo). Faça isso a cada doishoras, (para um total de 4 vezes) durante um período de oito horasperíodo. Comece esta dosagem uma a duas horas antes dovacina é administrada.

- Imediatamente após a vacinação ser injetada(de preferência quando você voltar para o carro ou no momento em que chegar em casa - embora quanto antes melhor),faça o protocolo de patch MMS1 / DMSO (veja a seguirpágina). Ou, no caso de um bebê ou crianças com muitopele sensível, siga as instruções para ajustar o protocolo do patch para bebês e pessoas com pele sensível(veja a página seguinte). O patch MMS1 / DMSO ajudaráneutralizar as toxinas da vacina.

- Aplique este adesivo mais 1 vez no dia da vacinação, três horas após a primeira aplicação. Se sentir necessidade de aplicar um terceiro adesivo em mais três horas, pode fazê-lo. Mas três patches no total devem ser suficientes.

Observação: siga atentamente as instruções*para fazer um patch MMS1 / DMSO na página 13E. Adicione mais água ao adesivo ou interrompa o uso, se houverardor ou irritação. Fique de olho.*

Dia da Vacina MMS1Dosagens para crianças	
Peso	Dosagem MMS1
Bebês com menos de 7 libras (3,2 kg)	3/4 de queda a cada 2 horas
7-24lbs (3,2-10 kg)	1 gota a cada 2 horas
25-49 lbs (11-22 kg)	2 gotas a cada 2 horas
50-74 lbs (22-33 kg)	4 gotas a cada 2 horas.

75 lbs (34 kg) e mais	6 gotas a cada 2 horas.

Ajustando o protocolo de patch MMS1 / DMSO para bebês e pessoas com pele sensível

Leia e tenha um bom entendimento das instruções para o protocolo de patch MMS1 / DMSO padrão (página 135). Este protocolo é basicamente o mesmo procedimento, mas as quantidades de gotas / água de MMS1 e o tempo para a aplicação do adesivo são ajustados para acomodar a sensibilidadepele.

0 Stat com 5 gotas de MMS1 (MMS ativado). Adicione 5 gotas de DMSO e 10 gotas adicionais de água paradiluir a solução.

0 Para a primeira aplicação, não aplique o patch paramais de cinco minutos.

0 Quando o adesivo for removido, observe se há irritação. Se não houver irritação após cinco minutos com o primeiro adesivo, em duas horas aplique outro adesivo, desta vez deixe por 15 minutos. Se não houver irritação ou queimação na pele nos próximos 15 minutos da aplicação, está OK continuar com mais uma aplicação (no caso de uma vacina) se você sentir necessidade.

0 Se a qualquer momento houver irritação ou queimação na pele, dobre a quantidade adicional de água além da que foi usada na última aplicação.

Dia da Vacinação

0 Continue a administrar a criança de acordo com o Vaccine Dosage Chat for Children (página 176) durante 1 semana para se certificar de que todas as toxinas são eliminadas do corpo.

b Para obter instruções sobre como medir uma queda de Fração oFa,consulte o Procedimento de Inicialização, página79

*¥ Nunca exceda o máximo**quantidade de MMS1 por hora para cada pesocategoria.***

!> Lembre-se, se a qualquer momento enquanto estiver tomando essas doses o seu filho começar a sentir náuseas ou diarreia, diminua aingestão de NNS1. Corte a quantidade pela metade e aumente novamentea partir daí, quando os sentimentos negativos diminuem.

Sinus Infemon: I Tive uma condição de sinusite por anos. Meus seios da face sempre ficavam bloqueados, principalmente pela manhã. Eu também peguei sangue nos Gssues bastante frequentemente quando assoei meu nariz para aliviar os bloqueios. Inicialmente eu tomava MMS porque estava sempre com fome e por causa do excesso de peso. Este foi apenas um tiro no escuro após ler as histórias de sucesso de outras pessoas. O resultado de meu tratamento com MMS foi que minha fome consistente foi embora e, para minha surpresa, a condição dos seios da face também foi embora. Eu tenho a condição dos seios da face há tanto tempo que parecia normal. Olhando para trás, acredito que ambos foram causados por cândida. —Chris, Unidade-ed States

Recuperação do Nefrito: Teve nefrito e meus pés incharam por mais de dois anos. Fiz o Protocolo 1000 e em 10 dias o inchaço diminuiu e agora meus dois pés estão de volta ao normal. Obrigado Jim. —Andy Z., UnitedEstados

Protocolo de Malária

A malária é uma das doenças mais simples de tratar com o MMS, pois requer apenas 1 ou 2 doses de gotas de MMS1. No entanto, ao contrário de usar MMS1 para outras doenças, para malária você dá 1 dose inicial muito forte de gotas ativadas (MMS1), seguido por mais 1 dose forte uma ou duas horas depois. Em outras circunstâncias, você normalmente não daria uma dose tão forte e, se o fizesse, a pessoa provavelmente sentiria náuseas ou possivelmente vomitaria, a menos que aumentasse essa quantidade lentamente. Mas, com a malária, isso raramente acontece, e a grande dose parece eliminar o parasita da malária em cerca de quatro horas, normalmente sem náuseas ou doenças adicionais.

Em meus livros anteriores, eusugeriram o uso de uma dose de 15 gotasde MMS1 para lidar com a malária. Mas porque o parasita da malária parece variar amplamente em sua capacidade de resistiroxidação causada por MMS1 (dióxido de cloro) enquanto no corpo, descobri a necessidade de ajustar esta dosagem. Láainda resta apenas quatro cepas de malária que afetam o hu-homem. No entanto, essas quatro cepas variam amplamente em seusforça ou fraqueza de região para região e, portanto, em sua resistência ao poder de oxidação do MMS1.

Normalmente, uma única dose de 18 gotas ativadas de MMS irámata a maioria das cepas de malária em um adulto, mas infelizmente nãosempre. Para algumas áreas com malária no mundo, são necessárias até 30 gotas em uma única dose para eliminar a malária, enquanto emem outras áreas, são necessárias apenas 6 gotas para matar totalmentemalária em um adulto. Como eu disse acima, normalmente uma dose de 18 gotas vai tratar a maioria da malária, e isso é o que eu sugiropara a dose básica de malária. Você não gostaria de ficaralguém

tomou uma dose de 30 gotasde MMS1 se não for necessário, pois isso pode deixar as pessoas extremamente nauseadas.

Então, especialmentequando alguém está em uma área de malária e tentando ajudar muitos casos de malária, ele / ela deve determinar a dose mínima necessária para matar a malária, emsua região específica. Vou esboçar como lidar com essa mulher ao longo desta seção.

A fêmea do mosquito Anopheles é o portador do parasita da malária. Quando alguém é picado por um mosquito transmissor da malária, os parasitas da malária viajam para o fígado, onde se multiplicam e finalmente chegam ao sangue após sete dias ou mais. Quando no sangue, eles começam a dominar e destruir os glóbulos vermelhos. Este é o ponto em que a vítima adoece e sente todos os sintomas da malária. A pessoa não sentirá nenhum sintoma até que a malária saia do fígado e vá para o sangue. O MMS1 pode matar os parasitas da malária antes de saírem do fígado ou pode matar os parasitas no sangue.

Quando o MMS1 é tomado por via oral, parece ter o melhor efeito contra a malária. Normalmente, 98^{0}/ o de toda a malária étratada com 2 doses orais de MMS1 e você não precisavá a qualquer fulher ajudando a vítima da malária. No entanto, acrescentei instruções extras abaixo para a situação em que são necessárias doses maiores e também para as áreas que não requerem as grandes doses de 18 gotas.

As tiras de teste rápido (testes de diagnóstico rápido para RDTs da malária), que são usadas para determinar se uma pessoa tem malária, são consideradas eletivas. No entanto, as tiras de teste rápido não podem ser usadas para dizer se uma pessoa está livre da malária depois de tomar MMS1 ou qualquer um dos vários outros tratamentos para a malária. Isso ocorre porque os antígenos da malária estarão presentes no sangue por semanas. Os antígenos são o que dão uma leitura positiva que pode ser falsa. O teste preciso para determinar se uma

pessoa está livre da malária envolve a observação do sangue em um microscópio. (Veja a página 185.)

Uma onça de prevenção ...

Para todos aqueles que vivem ou viajampara, um conhecidoregião da malária, eu sugiro fortemente uma dose de manutenção diária de MMS1. A prevenção é melhor do que a doença. (Consulte a página 200 para obter detalhes sobre odose de manutenção para adultos e crianças.)

Instruções para o protocolo da malária

Adulto

s

Etapa

1

0 Uma pessoa deve tomar uma dose de 18 gotas de MMS1 (MMS ativado) em 3/4 de xícara (6 onças ou 180 ml) de solução purificadaágua se possível.

Passo 2

0 Dentro de uma a duas horas após a primeira dose, repita a Etapa 1 acima, ou seja, tome outra dose de 18 gotas de MMS1.

Nota: Duas doses de 18 gotas irão superar 90% de toda a malária*casos. Na verdade, geralmente a dose final de 18 gotas mata a malária, mas sugiro dar uma segunda dose de 18 gotas apenas para ter certeza de que a malária foi totalmente eliminada. Este é o básicoprocedimento de dosagem para malária.*

Ações adicionais que podem ser necessárias para a dose básica de malária

¥ •Ao seguir a dosagem básica para a malária, (dada acima) se a primeira dose de 18 gotas parece causar a malária

vítima mais doente, isso indica que menos MMS1 é necessário. A pessoa deve beber água até passar o enjôo provocado pela dose de MMS1 e deve ficar bem. Se os sintomas da malária não diminuíram e ele não está se sentindo melhor, sugiro que tome uma segunda dose de MMS1, mascom 25% menos quedas - isso seriaser uma dose de 13 gotas. Atése seus sintomas de malária tiverem ido embora, sua primeira gota de 18 anosdose, e mesmo que essa dose possa ter feito dele umum pouco mais doente no início, seria aconselhável dar a ele mais uma dose de 13 gotas, para ter certeza de que toda a malária foi erradicada.

X Se as primeiras 2 doses (duas doses de 18 gotas ou, uma dose de 18 gotas e uma dose de 13 gotas) não superam a malária em um total de quatro horas, em outras palavras, em quatro horas se a pessoa não for sentindo-se muito melhor, então dê uma terceira dose ao fim de quatro horas. Esta terceira dose deve ser de 18 gotas de MMS1 se a vítima da malária não sentiu mais nenhuma doença com as duas primeiras doses de 18 gotas. Ou, se a pessoa já teve que diminuir para uma dose de 13 gotas, conforme explicado no parágrafo acima, dê outra dose de 13 gotas para a 3ª dose. Após esta 3ª dose, aguarde duas horas. Se os sintomas da malária desaparecerem, você pode assumir que está tudo bem e que a pessoa pode ir para casa. (No caso de eles continuarem se sentindo mal novamente no dia seguinte, eles devem retornar e fazer mais MMS1. Pode haver uma variedade de razões pelas quais a pessoa pode perder os sentimentosruim de novo. Veja a explicação da mulher abaixo.)

XSeos sintomas da malária continuam alertas com 3 dosesde MMS1, a vítima deve continuar tomando MMS1 a cadahora, mas reduzaa dose de 6 gotas de MMS1 a cadahora. Se a vítima ficar mais doente enquanto toma as 6 gotas por hora, pare

imediatamente o MMS1; você não deve dar à pessoa mais MMS1 até que sua doença adicional causada poro MMS1 sumiu.

¥ • Em um caso em que uma pessoa teve que recuar oP do 6-dropdoses, espere até que a doença adicionada desapareça e então ele

deve começar no Protocolo 1000, que deve continuar seguindo as instruções neste livro, aumentando ou indo para o próximo protocolo, conforme sugerido no Plano de Recuperação de Saúde (HRP). Ele pode parar de tomar MMS1 quando omalária se foi, a menos que umdoença ou doença está presente, o que também indicaria continuar a fazer Protocolo 1000 e seguindo as Três Regras de Ouro deMMS.

Notas

*bComo eumencionado acima, a dosagem padrão de MMS1 de duas doses de 18 gotas geralmente erradicam a malária. Se você encontrar a necessidade*para continuar dando doses de NNS1, como tenho feito*explicado acima, isso pode ser necessário para uma variedade derazões. Pode haver muitos fatores envolvidos na equação que exigiriam Continuação com MMS1. Por exemplo, um dos principais motivos pode ser que a vítima da malária também tenha outra doença - ou mesmo várias doenças -es — além disso*à malária, e isso exigiria mais*MMS1 e possivelmente MMS2.*

*!> Além disso, tenha em mente todos os motivos pelos quais o MMS pode não estar tendo um efeito, conforme descrito no Capítulo 8 deste livro. Felizmente, a malária é eliminada muito rapidamente com MMS1, no entanto, o pemon deve*não*comer ou beber coisas que não são compatíveis com MMS1 enquantotomando suas doses e assim por diante. Lembre-se, se MMS1 parece*não*estar trabalhando lápode haver muitas razões para isso.Entãoem um caso em que o NMS1 parece não estar funcionando, o melhor ponto de ação seria o pemon iniciar no protocolo 1000 a 1 queda ativada por hora e seguir conforme fornecido nas instruções do protocolo de acordo com o plano de recuperação da saúde.*

!> Já houve casos em que alguém ainda teve malária no dia seguinte e foi descoberto que não gostou do sabor e cuspiu a dose sem ninguém saber. Se o

pemon não toma a dose inteira, pode muito bem nãotrabalhar. Isso pode ser um problema com crianças pequenas que têmproblemas com gosto.

Ajudando as massas a se recuperarem da malária

As instruções a seguir levam em consideração queestá em uma área de malária do mundo com a intenção de ajudar muitas pessoas a se recuperarem da malária. Como mencionei acima, descobri que há momentos em que você deve dar um pouco mais ou menos da dose padrão da malária para ajudar as pessoas a recuperarem sua saúde. Novamente, isso ocorre porque os diferentes tipos de malária parecem ser mais fortes ou mais fracos em diferentes áreas devido a uma série de razões, que não irei abordar aqui. Mas o ponto principal é que você desejará determinar qual deve ser a dose padrão de MMS1 para o tipo palicular de malária prevalente na área em que você está.

Em uma situação em que você tem apenas um ou dois casos de malária para lidar, pode não importar se você tiver que reservar um tempo para dar várias doses às suas vítimas de malária - elas ficarão boas, embora possa demorar um pouco mais. Mas em uma situação em que você pode ter centenas ou mesmo milhares de pessoas para ajudar, você vai querer matar a malária com a primeira dose, seguida da segunda em duas horas, pois muitos não serão capazes de retornar para mais doses Por uma variedade de razões. Portanto, é melhor cuidar disso o mais rápido possível. Esta é a razão principal e muito indelicada pela qual recomendo que você determine a dosagem a tomar para combater a malária rapidamente em qualquer região.

Microscópio

Muitas pessoas que se propõem a ajudar a eliminar a malária acham que precisam de um microscópio para

determinar se a malária está presente e quando é eliminada. Seria bom se um

devíamos ter um microscópio e um técnico para determinarse a malária sumiu completamente, mas infelizmente na África e em muitos lugares do mundo isso nem sempre é possível por causa das finanças e outros motivos. Se você tiver um microscópio e puder determinar a presença ou ausência de malária no sangue, isso é útil, mas está muito longe de ser uma necessidade absoluta.

Acredite em mim, nas áreas com malária do mundo, as pessoas sabem se têm ou não malária. Eles convivem com isso ano após ano;infelizmente, é um amigo de suas vidas. Eles sabem quando estão doentes e quando se sentem bem. Portanto, determine como a pessoa está se sentindo, porque ao usar MMS, se a pessoa está se sentindo muito melhor, normalmente é umindicação clara de que superaram a malária. Isso pode não ser verdade com outros medicamentos contra a malária, mas depois de tomarMMS1 e a vítima da malária diz que está se sentindo bem, vocêpode ter certeza de que ele está livre da malária. Ao usar o microscópio, você terá que esperar 24 horas para provar quetoda a malária se foi, enquanto apenas cerca de quatro horas énecessário, simplesmente perguntando à pessoa como ela está se sentindo.Minha experiência depois de ajudar milhares de vítimas da malária, quando a pessoa está se sentindo bem depois de tomar a segunda dose de MMS, você pode ter certezaque ele está livre da malária.

Muitas pessoas que se sentem bem vão para casa depois de quatro horas enunca volte. No entanto, alerta tomando MMS1, um micro-o teste de escopo depois de apenas quatro horas provavelmente não será preciso.Isso ocorre porque, embora o MMS mate os venenos,parasitas e outros materiais permanecem no sangue para algunstempo mais. O prazo padrão antes de testar comum microscópio para ver se alguém está livre da malária, seria esperar 24 horas inteiras após a última

dose da pessoa para ser celainaque a malária foi embora.

Cepas de malária mais fracas do que as normais - Quando reduzir as gotas da dose padrão de 18 gotas

¥ • Se várias vítimas de malária tomaram o 18-dropdoses e eles parecem ficar mais doentes no início, isso indica que o tipo de malária na área é uma cepa mais fraca evocê pode dar menos gotas para stal. Neste caso, o próximoa vítima da malária na fila pode tomar menos gotas. Reduza ocai em 25º/ o da dose padrão de 18 gotas. estesignifica que você iria parar de dar 13 doses de MMS1. Seisso ajuda as pessoas a melhorarem ou se elas não estão se sentindo mais doentes duas horas após tomar a primeira dose, então sempre dê uma segunda dose de 13 gotas (após duas horas) apenas para fazercerteza de que a malária foi embora.

¥ • Mencionei anteriormente queEstive em áreas do mundo onde a malária foi tratada com uma dose de 6 gotas de MMS1. A regra geral e o princípio básico do MMS é, se a vítima está ficando mais doente do que sua doença já a está causando com as doses de MMS1, então você deve diminuir a dose, mas não pare de dar MMS1. Então, no caso de a dose de 13 gotas ainda estar deixando um doente, entãoabaixe a dose novamente. Experimente uma dose de 8 gotas da próxima vez ou, para a próxima pessoa, continue o processo até encontrar odose comfolable que ajuda as pessoas daquela região a obterbem, e não os torna mais doentes. Neste caso, de um modo geral, estamos falando sobre dar o próximopessoa na fila uma dose menor.

Nota: Lembre-se, se a dose de fimt era muito ou as doses de fimt2 eram demais e isso tornava a malária vítima*mais doente de alguma forma, então volte à mão e não faça nada por várias horas, pois o pemon provavelmente estará bem assim que seucorpo elimina a*

maioria dos venenos. Dê-lhe água para beber até que ele se sinta melhor, mas nunca force a águaele.

Mais fortes do que as cepas normais de malária - QuandoAumente as quedas do padrão de 18 quedasDose de MMS1

X No caso em que uma pessoa precisa de três doses de 18 gotas para se recuperar da malária, você pode ter certeza se está continuando a ajudar as pessoas a recuperarem sua saúde na mesma área, que as próximas pessoas que vierem até você dessa áreavai precisar de uma primeira dose mais forte do que 18 gotas. Se você tem algumas pessoas que precisam de três doses de 18 gotas, este é umindicador de que é hora de aumentar a quantidade de quedas emadministrar as pessoas se você quiser lidar com a malária em uma dose, seguida pela segunda dose sugerida para ter certeza. (Emmuita malariaáreas pelas quais as pessoas não conseguem ficarvárias horas para tomar suas doses. Então, há uma pequena janela de tempo para ajudá-los. Se a malária puder ser eliminada mais rapidamente, com menos dosagem, tanto melhor). Neste caso, eu aumentaria MMS1 para 25 gotas para a primeira dose, (um poucomais de 25%porque é uma cepa mais forte da malária),seguido por uma segunda dose de 25 gotas em duas horas.

X No caso em que uma dose de 18 gotas não está tendo umePect suPiciente e as pessoas não estão obtendobem alerta 3doses (para várias vítimas de malária), stal aumentando atévocê encontra o que funciona. Primeiro tente doses de 25 gotas e depois váaté 30 se necessário. Pode levar até 30 gotas para matar omalária em algumas áreas.

Nota: Depois de estabelecer uma dosagem adequada para o*área em que você está, usando água para misturar suas doses, éaceitável usar refrigerante ou um suco compatível com MNS1(consulte as páginas 42-4E para obter mais informações) para as dosesporque muitosa s p e s s o a s t ê m p r o b l e m a s c o m o* taça. Então*se por algum motivo*

o refrigerante ou o suco não funcionar, ou seja, as pessoas não estão mais indo bem, você sempre pode voltar à água. Um nunca é realmentecertifique-se de que o refrigerante ou suco em qualquer área nãodestruir NNS1 (consulte as páginas 42-45).

Crianças

A dosagem padrão para ajudar as crianças a se recuperarem da malária deve ser determinada pelo peso da criança.Fora isso, todos os mesmos princípios se aplicam conforme declarado acima. Em outras palavras, se você está dando a uma criança o “nor-mal "dosagem de MMS1 para malária e ele / ela éficando mais doente ou não melhorando após 3 doses, então você seguiria o mesmo procedimento descrito acima para diminuir ou aumentar as gotas. O chalon página 190 iráajudar a determinar odosagem para crianças de acordo com o peso.

AdicionalMMSDoses: Em todos os casos, se as doses de malária dadas acima não funcionarem e a criança ainda estiver doente, háuma alta probabilidaded e haver um segundodoençapresentena vítima. Nesse caso, aqueles que ainda têm doença presente devem iniciar o Procedimento de Piquetagem, seguido porProtocolo 1000 de acordo com as instruções para crianças nas páginas256-258.

Alzheimer: Depois que minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, ela odiava tanto os efeitos da pílula que se dispôs a experimentar o MMS. Seus sintomas desapareceram quase da noite para o dia. Na manhã seguinte, depois de beber apenas 6 gotas 3 vezes, ela me contou a história de como conheceu meu pai cerca de 60 anos antes, o que era impossível no dia anterior.

Ela continuou tomando por uma semana e então se sentiu tão bem que parou de tomar. Em um mês, os sintomas voltaram. Añer tomando MMS novamente, os sintomas foram embora novamente. Ela teve que tomar uma dose de manutenção diária para mantê-la sob controle. Obrigado Jim Humble você é meu herói. — Keith P., Estados Unidos

Observação:*Todas as quedas no gráfico a seguir referem-se agotas ativadas oFNNS (NNS1).*

Protocolo de Malária para Crianças					
Gotas MMS1 necessárias					
Peso	Mínimo Força **Malaria**	Baixo Força **Malaria**	**Normal Strength Malaria**	Mais forte Força **Malaria**	Máximo Força **Malaria**
Bebês com menos de (2.5 kg)	1 gota dose	2 gotas dose	**2-drop dose**	**3-drop** dose	Dose de 3 gotas
12-24 libras **(5.5 -11 kg)**	3 gotas dose	3 gotas dose	**4-drop dose**	**5-drop** dose	7 gotas dose
25-49 libras (11-23 kg)	4 gotas dose	5 gotas dose	**6-drop dose**	8 gotas dose	9 gotas dose
50-74 libras. (23-34 kg)	6 gotas dose	8 gotas dose	**10-drop dose**	**13-drop** dose	**15-drop** dose
75-100 libras (34-45 kg)	8 gotas dose	11 quedas dose	**14-drop dose**	18 queda dose	22 quedas dose
100 libras (45 kg)para cima	10 gotas dose	13 quedas dose	**18-drop dose**	23 quedas dose	29 queda dose

Chikungunya e Protocolo de dengue

Tanto a chikungunya quanto a dengue são doenças viraiscausada por mosquitos. Eles estão aparecendo cada vez mais em todo o mundo. Alega-se que ambas as doençasnão tem nenhum tratamento médico específico. O corpo pode acontecersuperar essas doenças, às vezes, após sofrimento prolongado e / ou com complicações diPiculcro. Ambas as doenças podem causar a morte. MMS é eletivo para ajudaras pessoas recuperam a saúde em um curto espaço de tempo, tanto da chikungunya quanto da dengue.

Chikungunya: geralmente esta doença estanca com um início abrupto de febre, geralmente acompanhado de dor nas articulações. Outros sintomas comuns incluem dores musculares, cabeçador, náusea, fadiga e erupção na pele. Também pode afetar os olhos, os ouvidos e a digestão. É semelhante à dengue em alguns aspectose pode ser diagnosticado incorretamente em áreas onde a dengue é com-seg. O corpo geralmente cura-se sozinho da doença em várias semanas, mas é possível que esta doença se tornecrônica e, portanto, durar meses ou anos. Normalmente, chikungunya aparece em algum lugar entre quatro edoze dias depois de ser picado por um mosquito que carregava oVírus.

Dengue: esta doença geralmente vem com febre. É semelhante ao chikungunya, mas existem algumas diferenças importantes. Existem as dores musculares e articulares extremas e geralmente uma erupção cutânea e, muitas vezes, dor por trás doolhos. Istopode parecer desaparecer em quatro ou cinco dias oumais, mas depois de dois a quatro dias, ele volta comuma erupção que cobre completamente o corpo, exceto o rosto. A erupção também costuma estar nas palmas das mãose planta dos pés. Pode desaparecer em alguns dias oupode durar muito mais tempo. Também pode haver calafrios durante a doença. Às vezes fica muito grave e pode causarhemorragia e morte, especialmente em crianças pequenas. A dengue aparece em algum momento dentro de três a quinzedias depois de ser picado pelo mosquito que carrega ovírus da dengue.

Tanto a dengue quanto a chikungunya podem ser superadas porMMS1 ou MMS2 que mata o vírus e então o corpo pode rapidamente reconstruir a saúde. Superar essas doenças énão é o mesmo que com a malária. A malária é um parasita queé um microorganismo muito maior e requer um grande choque inicial (dose) de MMS1 para ser erradicado. Os vírus requerema

presença de MMS 1 ou 2 durante um período de tempo paradestruí-los. Tivemos o maior sucesso com essas duas doenças, declarando-as oP com duas mais fortes do que

doses normais de MMS1, então indo direto para o Protocolo 1000, que mantém MMS1 presente no corpo por oitohoras ou um pouco mais a cada dia. MMS2 pode ser substituído por MMS1 (quando não disponível) neste protocolo, de acordo com oinstruções abaixo.

Instruções — Usando MMS1 para Dengue e Chikun-Gunya

Passo 1

0 Faça os Protocolos 6 e 6, que consiste em tomar uma dose de 6 gotas de MMS1, espere uma hora e tome uma segunda dose de 6 gotas de MMS1. (Consulte a página 169 para obter instruções completas sobre os protocolos 6 e 6.)

Observação:*Se a dose ñmt de 6 gotas causa náusea, diminua para 1/2 disso (uma dose de 3 gotas), para a segunda dose.*

Passo 2

0 Após duas doses de 6 gotas (ou a dose de 6 gotas / 3 gotas se você tiver que reduzir), continue o Protocolo 1000 de acordo com as instruções na página 84. Continue o Protocolo 1000 por pelo menos três semanas (21 dias).

Crianças

X Se você está ajudando uma criança, siga as dosagens adequadas para crianças para o Protocolo 6 e 6 e Protocolo 1000. Lembre-se de que a dosagem para crianças é determinada de acordo com o peso da criança. Consulte o Capítulo 13 para obter instruções sobre como ajustar as dosagens do protocolo para crianças. Siga todas as regras; por exemplo, reduza a dosagem quando houver náusea ou aumento da doença.

Instruções — Usando MMS2 para Dengue e Chikungunya

Se MMS1 não estiver disponível, mas MMS2 (hipoclorito de cálcio) estiver, você pode substituir MMS2 por MMS1 para dengue echikungunya. Siga cuidadosamente as etapas abaixo:

Passo 1

0 Primeiro, leia atentamente as instruções na seção Detalhes do MMS2, página 274, sobre o MMS2. Não use o MMS2 sem ter uma compreensão clara de como elefunciona.

Passo 2

0Depois de compreender o MMS2 e estar totalmente ciente dos cuidados necessários para usá-lo, prepare o seu gel ou cápsulas vegetais. Use cápsulas de tamanho # 0 ou # 1, de acordo com as instruções nas páginas 275-278.

0 Por favor, note que você precisa encher as cápsulas com uma pequena quantidade de MMS2 primeiro e trabalhar até a quantidade recomendada. Este protocolo exige 5doses(5 cápsulasno total, 1 cápsulapor dose)de MMS2 por dia. No primeiro dia, use a menor quantidade para encher as cápsulas nas primeiras 2 doses e, em seguida, comece a encheras cápsulascom mais MMS2 em incrementos, de acordo com as instruções na página 276, Etapa 3). Se você ficar doente, mais do que já

está sentindo com a doença, reduza a quantidade de MMS2e vá em um ritmo mais lento para acumular a quantidade recomendada de MMS2 em cada cápsula. Siga as Três Regras de Ouro do MMS.

etapa
3

0 Tome 1 cápsula de MMS2 a cada duas horas até ter tomado 5 cápsulas por dia.

0 Continue a tomar 5 cápsulas por dia até o enjôo passar. Geralmente a dengue e a chikungunya desaparecem em três ou quatro dias, mas mesmo assim continue com este protocolo. Não pare por três semanas inteiras. Isso é para garantir que você supere totalmente a doença e paraprevenção contra recaídas.

Crianças

Eu não recomendo MMS2 para crianças pequenas, nempara todas as crianças, independentemente da idade ou do peso.Há exceções a isso, mas não continue dando MMS2 para crianças até que você leia as diretrizes e as instruções.informações sobre MMS2 e crianças nas páginas 259-260. Se depois de ler isso você determinar que a criança pode tomarCápsulas MMS2, proceda de acordo com as seguintes instruções.

0Use cápsulas vegetais ou gel de tamanho # 3 para crianças, cheias 1/8 com MMS2 para começar e aumente para enchê-las até 3/4.

0 Se náusea ou aumento da doença aparecer, reduza opó nas cápsulas pela metade. Se necessário, continue reduzindo até que as cápsulas não causem mais enjôos ou náuseas. Você pode tentar

de novo aumentar lentamente o pó até a dosagem recomendada, mas reduza sempre que ocorrer um enjôo adicional.

0 Lembre-se, só dê isto a uma criança velhao suficiente e pode ser confiável para engolir adequadamente umcápsula sem quebrá-la no processo.

Vírus Ebola

A doença pelo vírus Ebola é grave e freqüentemente fatal. No momentodesta escrita, mata repolidamente até 50o/ o de pessoas queestão infectados. Ele se espalha principalmente pelo contato com uma pessoaquem está infectado e às vezes através do contato com umsuperfície como uma escrivaninha, cadeira ou mesa com a qual uma pessoa infectada fez contato. Os sintomas podem incluir febre, náusea, vômito, diarreia, olhos vermelhos, aumentoerupções cutâneas, dor no peito, tosse, dor de estômago, perda de peso,sangramento dos olhos, ouvidos, nariz, reto e muito maissangramento interno.

Na África Ocidental, os Ministros da Saúde da Igreja Genesis II tiveram sucesso em ajudar as pessoas a superar a doença do vírus Ebola. Isso foi confirmado, quando possível, em testes de laboratórioantes e depois em alguns dos casos.

O protocolo usado era basicamente o mesmo que o Protocolo de Chikungunya / Dengue (ver página 190). As vítimas recuperaram a saúde em sete a dez dias. Eu sugiro fortemente, no entanto, que mesmo se sentindo bem em uma semana a dez dias, aqueleos 21 dias completos do protocolo para evitar uma possível recaída.

Vírus zika

No momento em que escrevia este livro, o vírus Zika, também transmitido por um mosquito com semelhanças com chikungunya edengue, está se tornando mais prevalente no mundo. Atualmente, de acordo com o CDC (Centros para Controle e Prevenção de Doenças), a maioria das pessoas infectadas com a doença pelo vírus Zika não apresenta sintomas. A incubaçãoperíodo para a doença pelo vírus Zika não é conhecido, mas é provável que demore alguns dias para umsemana. Os sintomas mais comuns do Zika são febre, erupção cutânea, dor nas articulações ou conjuntivite (vermelhoolhos), dores musculares e dores de cabeça.

Até o momento, não recebemos prova contínua suficiente desucesso usando MMS1 ou MMS2 com o vírus Zika.H o w e v - er, recebemos a confirmação de alguns de nossosMinistros da Saúde, de pessoas que recuperam totalmente a saúde do Zika após seguir o protocolo descrito neste livro parachikungunya e dengue.

Se você estiver em uma área com zika e suspeitar que foi infectado, ou desejar ajudar outras pessoas infectadas, eusugerir este mesmo protocolo. Mantenha as doses de hora em hora comofornecido no protocolo até oos sintomas sumiram totalmentee a saúde é restaurada.

Picadas de mosquito

Quando picado por um mosquito, enxugue uma gota deMMS bem na mordida e esfregue suavemente. A coceira deve parar em alguns minutos. Normalmente não é necessário lavar o MMS oP depois de esfregá-lo, mas se preferir,lave a área com água e sabão depois de esperar pelo menoscinco minutos.

Protocolo MRSA

MRSA(Staphylococcus Aureus resistente à meticilina), é comumente conhecido como staph. Tanto no interior como no exterior do corpo, esta infecção pode tornar-se um grande problema. É uma infecção resistente a todos os antibióticos conhecidos. Infelizmente, todos os anos, o MRSA mata muitas pessoas.Além disso, com o MMS, é fácil de controlar.

MRSA pode ser um problema tanto interna quanto externamente,manifestando-se em erupções dolorosas do lado de fora docorpo. Qualquer pessoa com MRSA deve tomar protocolos MMS1 de acordo com o Plano de Recuperação da Saúde, começando com

oProcedimento de piquetagem e depois para o Protocolo 1000, econtinuando com mais protocolos, se necessário, conforme descrito em

este livro. Aqueles com erupções na pele também devem usar gás dióxido de cloro (conforme explicado nas instruções a seguir) nessas erupções externas, visto que trata a infecção com bastante facilidade. Este mesmo procedimento também é opcional para qualquer fervura padrão.

Instruções para superar MRSA (e furúnculos)

Passo 1

0 Comece tomando MMS1 com o Procedimento de piquetagem,
seguido pelo Protocolo 1000 (consulte as páginas 79-87).

Nota: Para aqueles que têm MRSA que se manifesta do lado de fora do corpo, ou aqueles que têm fervura, comece imediatamente as seguintes etapas usando gás dióxido de cloro, enquanto simultaneamente inicia a Etapa 1 acima. Se preferir, o protocolo de patch NNS1 / DMSO também pode ser usado em feridas ou furúnculos de MRSA no lugar do procedimento a seguir (consulte a página *135).*

Passo 2

0 Encontre um copo, xícara ou tigela que cubra a infecção por MRSA ou a fervura. É melhor se a tigela ou copo for de vidro transparente para que você possa ver através dele e observar o que está acontecendo. O vidro é preferível, mas um recipiente de plástico transparente funcionaria. Se você não conseguir encontrar isso, use um copo ou tigela comum coPee.

etapa 3

0 Limpe a área ao redor da infecção por MRSA ou ferva para que o copo ou copo possa assentar com segurança sobre e ao redor da infecção e para que

nenhum gás MMS consiga escapar. Você estará segurando o copo no lugar. Não vai demorar mais do que cinco minutos.

Passo 4

0Determine quantas gotas de MMS1 (ativadoMMS) para usar. Dependendo do tamanho da infecção, use de5 a 20 gotas de MMS1 (usando 4% HCI ou 50º/ ocitricácido para ativar). Use 5 gotas para uma infecção por MRSA ou ferva com cerca de 1,25 cm de diâmetro. Use 10gotas de MMS1 para uma infecção por MRSA ou ferva 1 polegada (2,5cm) de diâmetro. Para qualquer ferida de 2 polegadas (5 cm) ou maior emdiâmetro, use 15 a 20 gotas.

Etapa 5

0 Usando o Passo 4 acima como seu guia para o número de gotas a serem usadas, coloque essas gotas em seu recipiente e cubra imediatamente a infecção ou ferva. Tenha o cuidado de segurar o recipiente para que o MMS1 não escorra em sua pele e não permita que nenhum gás escape. Você pode ter que se deitar ou se inclinar, dependendo do local do furúnculo.

0 Não aplique isso por mais de cinco minutosmáximo, para evitar queimar a pele. Se um tempele particularmente sensível, seria melhor fazer issoprocedimento por apenas três minutos na primeira vez em ordempara ver como a pele reage. Se a pele reage bem,pode ser repetido novamente em quatro horas (veja as instruções abaixo), e por até cinco minutos na segunda vez, senecessário. Mas lembre-se, não mais do que cinco minutos.

Etapa 6

0 O gás dióxido de cloro gerado peloO MMS cobrirá a infecção em segundos, e você poderá ver a infecção se abrir, e o interior dea infecção será drenada em alguns minutos. Fique de pé, ou sente-se ou deite-se para que a infecção - sejaa lateral do braço, rosto ou perna - pode drenar,

permitindo a transmissão de energia
para baixo para dentro
suarecipiente.

0 Tenha alguns lenços de papel à mão para absorver o pus remanescente ao remover o recipiente.

Etapa 7

0 Depois de fazer as etapas 1 a 6 uma vez, cubra a áreacom vaselina, que ajudará a prevenir qualquer infecção por fulher.

Etapa 8

0 Se parecer que ainda pode haver pus na infecção, você pode repetir as etapas 1 a 6 asegundo tempo. Faça isso somente após esperar pelo menos quatro horas após a primeira aplicação, e somente depois de ter lavado a vaselina comocompletamente possível com água e sabão.

0 Depois de repetir as etapas 1 a 6 uma segunda vez, cubra mais uma vez a área com vaselina para evitar infecção.

Etapa 9

0 Você pode repetir as etapas 1 a 6 uma terceira vez, mas novamente,apenas para solicitar que você espere pelo menos quatro horas após osegunda aplicação, e só depois de terlavei a vaselina o mais completamente possívelcom água e sabão.

Etapa 10

0 Em um caso raro em que a dor persiste, você pode repetir as etapas 1 a 6 uma vez a cada quatro horas até que a condição desapareça. Neste

ponto, aguarde quatro horas entre cada aplicação das etapas 1 a 6. Cada

Cada vez que repetir as etapas 1 a 6, você deve revestir a área com vaselina para evitar infecção por fulher e certifique-se de lavar a vaselina antes das aplicações de fulher das etapas 1 a 6.

Etapa 11

0 Provavelmente, haverá um buraco na pele e na carneonde a infecção foi localizada. Você pode colocar um poucoVaselina no buraco. Deve sarar em dois ou três dias. A vaselina previne a reinfecção da fulher. Vocêpode borrifá-lo com o frasco de spray MMS1 (verinstruções na página 76), mas raramente é necessário.

Etapa 12

0 Conforme a Etapa 1 acima, a pessoa com MRSA devecompletar o procedimento de piquetagem, seguido pelo protocolo1000Se eles também estiverem usando MMS1 em feridas na pele, eas feridas desaparecem antes das 3 semanasperíodo queAs chamadas do protocolo 1000 estão concluídas, ele nuncamelhor terminar os 21 dias do Protocolo 1000. Isso vaifulher limpa o corpo de bactérias indesejadas etoxinas.

Dose de manutenção diária MMS1

Uma dose de manutenção diária de MMS é muito importante.Com a tremenda quantidade de toxinas, venenos e outrosperigos para a saúde que causam doenças na sociedade de hoje, a prevenção é essencial para ajudar a desfrutar de uma vida saudável e equilibrada. O MMS1 pode ajudá-lo a atingir esse objetivo. Um bemhora de tomar sua dose de manutenção é antes de deitar,que auxilia no processo de desintoxicação durante o sono. Em tempos de estresse ou quando a doença local está "circulando"

gripe, tosse, resfriado, etc., ou a qualquer momento que você tiver exposição extracertifique-se de toxinas, como durante viagens e assim por diante, sugiro dobrar a dose de manutenção. Ou seja, se você tomar um diário

dose de manutenção e você tem exposição extra, tome-a duas vezes ao dia (manhã e à noite) em vez de uma vez. Se você tomar uma dose de manutenção 3 vezes por semana, tome-a diariamente durante esses horários.

Você notará nos campos de dosagem abaixo que estou sugerindo que adultos com menos de 60 anos de idade tomem uma dose de manutenção 3 vezes por semana, mas eu sugiro que as crianças tomem uma dose de manutenção diária (ajustada de acordo com seu peso). Isso ocorre porque as crianças, via de regra, estão expostas a uma grande variedade de toxinas ao longo do dia; eles brincam no chão ou no di1, colocam as mãos na boca, etc.

Dose Diária de Manutenção - Crianças	
Idade e Peso	Dosagem Diária
12 libras ou menos (5,5 kg ou menos)	1 gota diariamente
12-24 libras (5,5-11 kg)	2 gotas por dia
25-49 lbs (11-23 kg)	3 gotas por dia
50-74 libras (23-34 kg)	4 gotas por dia
75-100 lbs (34-45 kg)	5 gotas por dia
100 libras e acima (45 kg e acima)	6 gotas por dia

Dose de manutenção diária - Adultos	
Idade e Peso	Dosagem Diária
Adultos com 60 anos ou mais, 100 a 200 libras	6 gotas por dia
Adultos com 60 anos ou mais, 200 libras e mais	8 gotas por dia
Adultos com 60 anos ou menos, 100 a 200 libras	6 gotas 3x por semana
Adultos com 60 anos ou menos, 200 libras e mais	8 gotas 3x por semana

Nota: Se você precisar usar o MMS2 para sua principal rotina diáriadose de permanência, consulte as notas do Protocolo 4000, na página172 para obter instruções.

Morgellans e MMS: Idigo que foi um milagre como consegui colocar o MMS em minhas mãos. Eu estava sofrendocom o que eu acredito agora ser Morgellons. Meu médico me disse: “Não consigo diagnosticar e nem tratar” e saiu da sala. Eu também lutei por anos com Candida sem nada funcionando, ia melhorar e voltar. Minha filha me pediu para encontrar um produto que a tivesse ajudado com um problema de saúde. Encontrei um produto que pensei ser o que ela queria.Logo recebi um e-mail dizendo que meu MMS estava sendo enviado. Eu pesquisei MMS. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, era exatamente o que eu precisava para os sintomas que estava tendo. Comecei o protocolo e quase imediatamente as feridas e a coceira estavam melhorando.

Hoje, os Morgellons e a Cândida se foram. Fui ao iridologista e quando ela me viu disse. "Meu Deus, eu nunca vi ninguém se curar assim, o que você fez?" Eu disse a ela como consegui o MMS. Ela disse que você precisa escrever isso e compartilhar com outras pessoas que possam estar sofrendo com Morgellons. Eu estou vivoe saudávelhoje porquede MMS. Eu estava pensando em suicídio por causa da dor e coceira e da incapacidade de dormir por um ano antes de encontrar este produto maravilhoso. Acredito que Deus me deixou encontrar um produto barato que curaria meu corpo. Obrigado Jim Humble. —Joy S., Estados Unidos

Edema se foi: eu Tive um caso grave de edema nas pernas e pensei que tinha um coágulo sanguíneo. Tratei-me com o Protocolo 1000 e, em poucos dias, minhas pernas voltaram ao normal. Sem corrosão, inchaço, etc. —CP, Estados Unidos

Capítulo 12

Protocolos de Emergência

A ideia básica quando ocorre uma emergência é agir rápido.Você quer colocar algo no corpo que o ajudelidar com a condiçãoe matar os venenos que possam estar presentes. Abaixo, você encontrará algumas situações de emergência nas quais achamos que o MMS é particularmente útil.não é, de forma alguma, uma lista abrangente.MMS tambémtrabalhar para muitas outras situações de emergência.Tenha em mente que, com esses protocolos, pode ser necessário desconsiderar o conselho dado em outra parte deste livro de nãotomando muito MMS, ao mesmo tempo, sendocuidado para não ir longe demais. Siga estas instruções eescute o queo corpo diz a você - seja o seu corpo ou o de outra pessoa.

Isenção de responsabilidade

Esses protocolos de emergência são uma alternativa para aquelesindivíduos que se encontram em uma situação terrível eincapaz de buscar médicos convencionaisajuda por uma razãoou outro, seja ele logístico, financeiro,ou então,como a decisão pessoal de não querer ir ao hospital e se submeter a procedimentos alopáticos. O deci- decisão de escolher uma alternativa é uma escolha pessoal. A responsabilidade é 100º/ oon cada indivíduo paratodo e qualquer uso feito de qualquer informaçãoaqui em. Se umnão está preparado para assumir total responsabilidadepara sua própria saúde, seja em um

caso grave ou menos grave, eu fortementeaconselhar que procurem atendimento médico convencional.

Picadas e mordidas

Insetos, escorpiões ou aranhas que picam ou picam podem ser prejudiciais à saúde.Os resultados das picadas ou mordidas dessas criaturas variam de irritantes a graves e possivelmente fatais se não forem tratados. A decisão de seguir as informações descritas abaixo cabe ao indivíduo. Em qualquer situação, cada pessoa deve decidir o que fazer.

Para quem é alérgico a picadas de abelha e outras picadasque são venenosos, minha experiência pessoal mostra que o MMS tem sido eletivo para lidar com a doença,enquanto elimina o risco de efeitos colaterais graves de medicamentosfarmacêuticos. Por exemplo, picada de aranha e escorpiãoantivenin quase sempre listavários efeitos colaterais adversos, incluindo a possibilidade de morte. MMS, até onde sabemos,nunca causou efeitos colaterais permanentes a ninguém. Oos seguintes procedimentos para mordidas e picadas funcionaram paramuitas pessoas, no entanto, não há 100º/ oguarantee.

Picadas de Escorpião

A maioria das picadas de escorpião não é mortal, apenas dolorida. Você não pode, entretanto, depender da ideia de que aquele queapenas picou você não é mortal. Existe uma espécie de escorpião nos Estados Unidos que é mortal. Existem mais de 2.000 espécies de escorpiões em todo o mundo, com apenas algunssendo da espécie mortal, mas, novamente, nunca assuma que aquele que acabou de picá-lo não é um escorpião mortal. Sepicado por um escorpião, eu tentaria os seguintes passos. Se eunão estava melhorando em um período de tempo razoável,e pareciaestar recebendopior euiria para um hospital ou clínica que tem soro antivenínico. Ore

para que o antivenenonão tem efeito negativo, pois o mesmo problema existe para picadas de escorpião e picadas de aranha, em que a morte é uma daspossíveis efeitos colaterais olen listados para o antiveneno.

Imediatamente AKer sendo picado por um escorpião

Passo 1

0 No caso de uma picada de escorpião, stal tomando MMS1 porboca imediatamente. Tome uma dose de 6 gotas de MMS1 em1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água, seguido por umsegunda dose de 6 gotas de MMS1, meia hora depois.

Observação: isso é semelhante ao Protocolo 6 e 6 (consulte a página 169), porém, neste caso, as doses são tomadas mais próximas, meiohouraparte, em vez de uma hora de intervalo. No caso de seguir este procedimento para uma criança, siga as mesmas regras de dosagem do Protocolo 6 e 6, ajustando a dose de acordo com o peso conforme tabela da página 265.

0 Se a primeira dose de MMS1 causar náuseas ou vomitar, beba mais água (8 onças) e tentevomite novamente se puder. Nesse caso, vomitar é bome ajudará a expulsar o veneno.

Passo 2

Simultaneamente com a Etapa 1, imediatamente após ter tomado sua primeira dose oral de MMS1 - comece a neutralizar o veneno da picada:

0Em uma limpeza,vidro seco,ative 3 gotas de MMS com 3gotas de ativador ácido. Conte 30 segundos. Não adicioneagua.

0 Mergulhe a ponta do dedo na mistura de MMS1 e aplique no local da picada. (Tente obtê-lo diretamenteo ponto onde o escorpião atacoue não tambémmuito na pele ao redor.) Tente aplicar pressão para forçar o MMS1 para dentro do orifício. Faça isso a cadacinco minutos ou mais. Enxágue o dedo após cadaaplicativo.

0 Misture uma nova dose de MMS1 de acordo com as instruções
acima, a cada 15 a 20 minutos.

0 Pare de aplicar a mistura de MMS1 diretamente na picadaassim que a dor da picada passar.

0 Continue por um período mais longo de tempo se a picada continuar a formigar ou coçar.

Observação:*Pare de usar o NNS1 por várias horas até que a pele comece a ficar muito irritada ao redor da picada.*

etapa 3

0 A1er tomando a segunda dose de 6 gotas de MMS1, continuartomar uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora de vigília, até que todos os sintomas negativos desapareçam.F a ç a i s s o m e s m o q u e d e m o r e alguns dias.

Observação:*Uma dose de 3 gotasé o padrãoProtocolo1000dose. No caso em que uma criança é picada por um escorpião, siga o guia de dosagem de acordo com o peso para o Protocolo 1000 para crianças (consulte a página 2E8).*

Picadas de abelha e vespa

Para muitas pessoas, as picadas de abelha e vespa não representam um grande problema e causam poucos problemas. Existem alguns remédios caseiros que são eletivos para essas picadas, como fazer uma pasta de bicarbonato de sódio para uma picada de abelha ou usar vinagre para uma picada de vespa. Da mesma forma, se você tiver uma pequena reação a uma picada, este protocolo pode ajudar. Se você é alérgico a picadas de abelha ou vespa e tem uma

reação grave a elas, sugiro que siga diretamente este protocolo.

A picada de abelha é ácida por natureza e pode ser neutralizada com MMS não ativado (solução de clorito de sódio a 22,4% em

água), isto sem misturá-lo com um ativador de ácido. Oa picada de vespa é alcalina e deve ser neutralizada com ácido. Você pode usar ácido 4O / o HCI ou ácido cítrico 50%. A seguir estão as instruções para neutralizar o veneno no local de uma picada de abelha ou vespa.

Instruções para picadas de abelha e vespa

Passo 1

0No caso de uma picada de abelha ou vespa, tome o MMS1 por via oral imediatamente.Tome uma gota de 6dose de MMS1 em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água, seguida por uma segunda dose de 6 gotas de MMS1, meia hora depois.

Observação:*Isso é parecido*para*Protocolos 6 e 6 (ver página 169), no entanto, neste caso, as doses são tomadas mais próximas, uma-haIFhourapart, em vez de uma hora de intervalo. Emo evento de seguir este procedimento Para uma criança, siga o mesmoregras de dosagem conforme Protocolo 6 e 6, ajustando a dose de acordo com o peso conforme tabela na página 26E.*

0 Se a primeira dose de MMS1 causar náuseas ou vômitos, beba mais água (8 onças) e tente vomitar novamente, se puder. Neste caso, vomitar é bom eajudará a expulsar o veneno.

Passo 2

0 Simultaneamente com a Etapa 1, imediatamente após você tertomou sua primeira dose oral de MMS1 - comece a neutralizar o veneno de picada. Observe que essas instruções paraA etapa 2 é diferente para a picada da abelha e da vespa.

Picada de Abelha

0 Use MMS (clorito de sódio, 22,4 'o em água purificada) mas sem ativá-lo. O MMS não ativado

é altamente alcalino e neutraliza o ácido da abelha picada.

0Colocar 4 ou 5 gotas de MMS em um vidro limpo e seco. Não
Adicione água.

0 Mergulhe a ponta do dedo no MMS não ativado e esfregue-o cuidadosamente na picada. Pressione com força para forçar uma pequena quantidade na picada. Repita isso a cada cinco minutos ou assim.

0 Pare de aplicar o clorito de sódio (MMS não ativado) diretamente na picada assim que a dor passar.

0 Continue por um longo período de tempo, até uma hora, sea picada continua a formigar ou coçar.

0 Depois de parar de aplicar o MMS, enxágue oárea completamente com água limpa.

Se a picada continuar a doer por uma hora

0 Enxágue o área completamente com água limpa.

0 Depois de aplicar apenas MMS (MMS não ativado) para umhora, a natureza ácida da picada de abelha é suficienteneutralizado. Se ainda huls, agora você pode aplicar oMMS (MMS1) para destruir qualquer veneno que possa ser deixado. Ative 3 gotas de MMS (clorito de sódio) com 3 gotasde ácido ativador e contar 30 segundos. Não adicioneagua.

0Dab na picada e esfregue-o com cuidado.

0 Isso pode ser repetido a cada cinco minutos ou mais por até meia hora.

Picada de Vespa

0 Não use MMS. Use o ácido ativador sozinho, (4% de HCI ou 50% de ácido cítrico). Se estes não estiverem disponíveis,Suco de limão puro ou vinagre é a segunda melhor opção.

0 Coloque 4 ou 5 gotas de ácido em um copo limpo e seco. Não adicione água.

0 Mergulhe a ponta do dedo no ácido e aplique no local da picada. (Tente colocá-lo diretamente no local da picada e não muito na pele ao redor.) Esfregue-o cuidadosamente no buraco da picada, mas pressione com força para colocar um pouco de ácido no buraco para neutralizar o veneno da picada.

0 Faça isso a cada cinco minutos ou mais. Enxágüe seu dedo com alercada aplicativo.

0 Pare de aplicar o ácido diretamente na picada assim que a dor passar.

0 Continue por um longo período de tempo, até uma hora, sea picada continua a formigar ou coçar.

0 Depois de parar de aplicar o ácido, enxágue oárea completamente com água limpa.

Se a picada continuar a doer por uma hora

0 Enxágue bem a área com água limpa.

0 A1er aplicando apenas ácido na picada de vespa por uma hora,a natureza alcalina da picada deve ser neutralizada.Se ainda assim, você pode aplicar o MMS ativado (MMS1) para destruir o veneno restante. Ative 3 gotas de MMS (clorito de sódio) com 3 gotas

de ácido ativador e contar 30 segundos. Não adicione agua.

0Dab na picada e esfregue-o com cuidado.

0 Isso pode ser repetido a cada cinco minutos ou mais por até meia hora.

etapa 3

0A 1er o segundoDose de 6 gotas de MMS1, continuartomar uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora de vigília, até que todos os sintomas negativos desapareçam. Faça isso mesmo que precise de um poucos dias.

Nota: Uma dose de 3 gotas é a dose padrão do Protocolo 1000. No caso em que uma criança é picada por uma abelha ou vespa, siga o guia de dosagem de acordo com o peso do Protocolo 1000 para crianças (ver página 258).

Picadas de aranha

Ambas as aranhas viúva negra e castanha reclusa não são apenas dolorosas, mas também mortais. eulistaram-nos separadamente, cada um com um protocolo distinto. Se você suspeitar que sua mordida é uma viúva negra ou uma reclusa marrom, consulte o protocolo específico respectivamente, já que esses protocolos sempre funcionam (até agora). (Veja as páginas 213, 217.)

Se você suspeita que alguma outra aranha venenosa o mordeu (existem muitas aranhas venenosas em todo o mundo),Os seguinteso remédio simples pode ser eletivo. Se este remédio não superar a dor e o

inchaço dentro de um período de tempo razoável (algumas horas), sugiro ir a um hospital ou clínica que tenha antiveneno.

Nota: MMS é um oxidante e é conhecido por oxidar e destruir muitos tipos de venenos. No entanto, não há como testarmos a capacidade do NMS de destruir literalmente centenas de tipos de veneno de aranha que existem. É nossa experiência que o MMS ajudará na maioria das situações de veneno, mas a decisão de usar ou não o MMS no caso de picada de aranha é de responsabilidade total do indivíduo.

Imediatamente ARer sendo mordido por um espião venenosoder

Passo 1

0Leia os parágrafos introdutórios nos protocolos da viúva negra e da aranha marrom reclusa (consultepáginas 213, 217), para ter certeza de que a mordida não foi uma dasEssa.

0 No caso de uma picada de aranha, pare de tomar MMS1 por via oral imediatamente. Tome uma dose de 6 gotas de MMS1 em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água, seguida de uma segunda dose de 6 gotas de MMS1, meia hora depois.

Observação: isso é semelhante ao Protocolo 6 e 6 (consulte a página 169), porém, neste caso, as doses são tomadas mais próximas, meiohouraparte, em vez de uma hora de intervalo. No caso de seguir este procedimento para uma criança, siga as mesmas regras de dosagem do Protocolo 6 e 6, ajustando a dose de acordo com o peso conforme tabela da página 265.

0 Se a primeira dose de MMS1 causar náuseas ou vomitar, beba mais água (8 onças) e tentevomite novamente se puder. Nesse caso, vomitar é bome ajudará a expulsar o veneno.

Passo 2

0 Simultaneamente com a Etapa 1, imediatamente após ter tomado sua primeira dose oral de MMS1 - comece aneutralize o veneno da mordida.

0Em um vidro limpo e seco,ative 3 gotas de MMS com 3 gotas de ativador ácido. Conte 30 segundos. Não adicione água.

0 Mergulhe a ponta do dedo na mistura MMS1 etoque na mordida. (Tente aplicá-lo diretamente na mordida e não muito na pele ao redor.) Faça isso a cadacinco minutos ou mais. Enxágue o dedo após cadaaplicativo.

0 Misture uma nova dose de MMS1 de acordo com as instruções
acima, a cada 15 a 20 minutos.

0 Pare de aplicar a mistura de MMS1 diretamente na mordidaassim que a dor da mordida passar.

0C o n t i n u e p o r u m p e r í o d o m a i s l o n g o d e t e m p o s e a m o r d i d a c o n t i n u a r para cabana ou coceira.

Observação: pare de usar o NNS1 por várias horas se a pele começar a ficar muito irritada ao redor da picada.

etapa 3

0 A1er tomando a segunda dose de 6 gotas de MMS1, continue tomando uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora de vigília, até que todos os sintomas negativos desapareçam. Faça isso mesmo que demorealguns dias.

Nota: Uma dose de 3 gotas é a dose padrão do Protocolo 1000. No caso em que uma criança é biKen por uma aranha venenosa,

Siga o guia de dosagem de acordo com o protocolo Tor 1000 para
crianças (consulte a página 2E8).

Protocolo Brown Recluse

No geral, a aranha marrom reclusa é considerada a picada de aranha mais perigosa que alguém pode receber (exceto as espécies raras na selva). Muitas pessoas morreram de mordidas de Brown Recluse. Um site lista isso a cada ano25% das pessoas mordidas morrem com a mordida. Isso pode ou não ser verdade; no entanto, não há dúvida de que essa mordida pode causar muitos problemas a uma pessoa. Ainda não conheci um médico que possa oferecer um tratamento bem-sucedido para uma mordida Brown Recluse. No entanto, descobri que o procedimento a seguir é bastante eletivo. Com o Brown Recluse, você quer ter certeza de cuidar de qualquer mordida logoque possível.

Nota: eu morei por 40 anos nos desertos da Califórnia e*Nevada, durante o qual tratei pemonally 20*para 2E*pessoas para picadas de Brown Recluse com a pomada de óxido de zincomencionado abaixo. Nos últimos anos, também adicioneiMMS. A pomada de óxido de zinco sempre funcionou com ou sem MMS. A decisão de usar ou não este protocolo é de sua total responsabilidade. Na minha opinião, este protocolo pode salvar sua vida como sistema médicon ã o t e m t r a t a m e n t o e H e c : t i v o para a picada da aranha marrom reclusa.*

Como saber se você tem uma mordida marrom reclusa?

Normalmente, você não saberá imediatamente que foi mordido por um Recluso Marrom, a menos que realmente veja a aranha mordendo você. Com um Brown Recluse, você nunca sente a mordida. Mas se

você foi mordido, geralmente depois de cerca de quatro horas, você começará a sentir coceira. Não vai parecer muito forte no início, nem mesmo o suficiente para arranhar, mas depois vai

tornam-se mais intensos. Ao olhar para a área que coça, você notará uma pequena mancha vermelha do tamanho de um grão de trigo e, a essa altura, é provável que já a tenha coçado várias vezes. A partir desse ponto, as coisas pioram rapidamente. A coceira fica extremamente forte e depois se transforma em coceira dolorosa, que então se torna uma dor aguda. O tempo que leva para chegar a esse ponto de dor aguda pode variar, geralmente de 8 a 24 horas.

Se nada for feito, a dor vai piorar até que você vá parao médico onde o remédio é prescrito para a dor. Oanalgésico pode possivelmente tirar a dor, mas nãoabordar a causa subjacente da dor. Em breveum pequeno buraco começa a se desenvolver. O buraco pode ficar cada vez maior eeventualmente irá até o osso. Dependendo de onde está a mordida, sabe-se que as pessoas perdem metadeuma perna, ou a maior parte de seu rosto conforme o buraco fica maior.Em casos graves, algumas pessoas sofrem até dois anos antes de morrer. Estou compartilhando esses detalhes, na esperança de que você possa evitar essa situação e, da mesma forma, ajudar alguém, se necessário.

Instruções para mordida de aranha marrom reclusa

Passo 1

0 Comece uma ligeira variação do Protocolo 6 e 6 (consulte a página 169). Tome uma dose de 6 gotas de MMS1 e, em seguida, tome a segunda dose de 6 gotas após apenas meia hora, comoem oposição a uma hora.

0 Aler de meia hora tomando a segunda dose de 6 gotas, comece o Protocolo 1000. Mas comece tomando uma dose de 1/2 gota na primeira hora e aumente a quantidade a cada hora em 1/2 gota,

aumentando para uma dose de 3 gotas dose a cada hora. Continue com o Protocolo 1000 por duas semanas e, se necessário, por uma terceira semana ou pelo tempo que for necessário.

emergência, etapa 2

0 Simultaneamente, logo após a primeira dose de MMS1, comece a aplicar o óxido de zinco. Misture pares iguais de óxido de zinco e vaselina vaselina. Faça isso em uma pasta.

etapa 3

0 Espalhe um generoso polion da pomada na área da mordidae esfregue suavemente por um ou dois minutos.

0 Então, depois de um ou dois minutos, adicione mais pomada à mordidaárea para se certificar de que é boa e grossa. Cubra a área com gaze e fita adesiva. Faça um curativo bem, mas não tão apertado que não pegue um pouco de ar.

Passo 4

0 Repita a Etapa 3 (acima) após quatro horas. Não é necessário lavar após a aplicação anterior.

Etapa 5

0 Repita a Etapa 3 (acima) novamente, alertando por mais quatro horas. Esta será a terceira aplicação da pomada de óxido de zinco.

Etapa 6

0 Após três aplicações da pomada de óxido de zinco, (cadaapós quatro horas), a dor e a coceira devem diminuir. Se, no entanto, ainda houver desconforto, comece a usar o frasco de spray MMS1, que é uma solução de 10 gotas ativadas

de MMS para 1 onça de água purificada (consulte a página 76). Lave a área antes de usar o borrifador.

0 Pulverize a área afetada a cada 20 minutos aproximadamente, até que tudo esteja limpo.

Notas

!> Lembre-se, durante todo este procedimento, a vítima deve tomar NNS1 de acordo com o Protocolo 1000, a cada hora, na hora, durante oito horas consecutivas por dia. Continue por duas semanas ou mais, se necessário.

!>Caso você não consiga obter óxido de zinco, você pode encontrar cloreto de zinco, que pode ser usado em seu lugar. O cloreto ou óxido de zinco normalmente produzirá resultados em menos de quatro horas, mas se você tiver algum problema persistente com o uso do cloreto de zinco, tente o seu melhor para obter um pouco de óxido de zinco e repita o procedimento novamente.

b Existem várias marcas de vaselina nomercado. Eu recomendo a marca "Vaselina" original paramisturando-se comargila ou óxido de zinco para fazer uma pomada. Vaselina(o original, que é triplamente purificado para ser100% puro) tem a capacidade única de umedecer, penetrar e permanecer na pele por mais tempo do que a maioria dos óleos. Às vezes, o óleo de coco, azeite de oliva e outros óleos podem ser usados para transportar várias substâncias medicinais para a pele e mantê-las ali. No entanto, nada se compara à capacidade do Vasilíneo de manter as substâncias curativas em contato com a pele por um tempo e, ao mesmo tempo, agir como um agente curativo. Use os vários

outros óleos apenas se você não conseguir obter oVaselina.

¥O procedimentoacima com óxido de zinco foi conhecido por aliviar uma picada de aranha marrom reclusa em quatro horas.

Variação: se disponível em seu país, a pomada para assaduras para bebês Desitin - força extra, também tem sido bem-sucedida na cura de picadas de aranha marrom reclusa. Esta fórmula contém óxido de zinco. Verifique os ingredientes para ter certeza de obter aquele que contém 40% de óxido de zinco, que é a fórmula extra forte. As fórmulas que contêm

20 a 25⁰/ o óxido de zinco pode funcionar, mas o 40ᴼ/ o fórmula é
mais celain para trabalhar.

Protocolo da Viúva Negra

Não é uma fábula; a Viúva Negra realmente tem uma forma de ampulheta vermelha brilhante em sua barriga. Muitas pessoas são picadas pela aranha Viúva Negra todos os anos, mas muito poucas morrem por causa de sua picada. Provavelmente, menos de 5 pessoas morrem nos EUA a cada ano, de acordo com a maioria dos sites.

Nota: Eu morei por 40 anos nos desertos da Califórnia e Nevada, período durante o qual ajudei pemonally mais de 20 pessoas biNen por uma aranha Black Widow com o protocolo fornecido abaixo./ *t s e m p r e t r a b a l h a d o . A l é m d i s s o , e u f o i b i K e n p o r uma aranha viúva negra duas vezes, e funcionou para mim. O usode Aloe vera neste protoCol é algo que encontrei em um antigo livro de remédios quando eu era um jovem com cerca de 20 anos de idade. Então, as pessoas têm usado essa parte dof3rotOCOl para lidar com picadas de viúva negra por muitos anos! eudesde então adicionaram o MMS1 e descobriram que a combinação dos dois traz bons resultados. A decisão de seguir este procedimento, entretanto, é de sua total responsabilidade.*

A picada da Viúva Negra é diferente da da aranha Reclusa Marrom. Normalmente, com esta mordida há dor imediata, seguida por uma série de reações possíveis. Pode haver cãibras musculares, dor abdominal (dor de estômago), fraqueza, tremores, dores no corpo e, em casos mais graves, náuseas, vômitos, desmaios, tonturas, dores no peito e dificuldade em respirar.

Para a viúva negra mordida, existe um antiveneno acessível. Não estou dizendo a você de uma forma ou de outra para tomar o antiveneno. Eu não usei quando fui mordido por uma viúva negra, mas muitos usaram. No entanto, como a maioria das drogas farmacêuticas, há uma longa lista de efeitos colaterais

deste medicamento, incluindo possível morte para aqueles que têm histórico de asma. Outras reações incluem erupção na pele, urticária, coceira, dificuldade para respirar, dificuldade para engolir, aperto no peito e inchaço da boca, rosto, lábios e língua. Uma alternativa para tomar o antiveneno, se você escolher, é o MMS1 e o Aloe vera.

Instruções para a mordida da viúva negra

Passo 1

0 A primeira coisa a fazer é iniciar uma ligeira variação dos Protocolos 6 e 6 (consulte a página 169).

0 Tome uma dose de 6 gotas de MMS1, mas no caso de uma picada de viúva negra, tome a segunda dose de 6 gotas depois de apenas meia hora em vez de uma hora.

Passo 2

0 Simultaneamente, imediatamente após tomar o primeiroDose de 6 gotas de MMS1, de acordo com a etapa acima, e enquantoesperando para tomar a segunda dose de 6 gotas, faça oSegue:

0Obter uma grande folha de Aloe vera fresca.

0 Corte as bordas serrilhadas e, a seguir, corte a folha aberta no sentido do comprimento. Em seguida, corte um pedaço sobre2 polegadasx 2 polegadas (5 cm x 5 cm) e coloque o Aloe xera fresco - com o lado da carne para baixo - bem sobre a mordida. Segure a peça no lugar e cubra-a com gaze e fixe-a firmemente com fita adesiva. Certifique-se de que o ar não pode

entrar entre o Aloe vera folha e a picada na pele.

0 Em uma emergência, use tudo o que estiver disponível para manter o Aloe vera no lugar até que você possa obter o adequado

suprimentos, (ou seja, gaze / fita adesiva), mas prenda-obem, então não há ar para a picada.

0 Deixe isso por 12 horas e a mordida deve estar OK. No entanto, para ter certeza, repita este procedimento mais uma vez com um novo pedaço de *Babosa*. Cole-o por mais 12 horas e isso deve ser tudo o que é necessário.

etapa 3

0 Meia hora depois de tomar a primeira dose de 6 gotas e, com sorte, aplicar o Aloe vera, tome a segunda dose de 6 gotas.

Passo 4

0 Aler de meia hora tomando a segunda dose de 6 gotas (com sorte, você terá aplicado a primeira aplicação de Aloe vera durante este período), comece o Protocolo 1000. Mascomece tomando uma dose de 1/2 gota na primeira hora eaumentar a quantidade a cada hora em 1/2 gota, aumentando para uma dose de 3 gotas a cada hora, conforme o protocolo 1000 chama para.

0 Siga o Protocolo 1000 por duas semanas, tomando MMS1, oito horas consecutivas por dia. Se necessário, continue pela terceira semana no Protocolo 1000 ou pelo tempo que for necessário.

Protocolo de mordida de cobra

Este protocolo não foi amplamente utilizado ou comprovado,devido à falta de casos de mordidas de cobra chegando até nós. Eu tive um caso de teste de uma cobra chocalho mordendo um cachorro pequeno. Com o MMS, dois dias após a mordida, o cão estava bem. No entanto, o fato é que o MMS1 neutraliza os venenos da maioria dos tipos. O veneno de

a variedade da cobra é uma molécula muito complexa, e MMS1 (dióxido de cloro) destrói moléculas complexas por óxidoção Portanto, em uma emergência, seria melhor fazer alguma coisa do que nada. E, em qualquer caso, seria uma boa idéia aplicar este protocolo além de qualquer tratamento médico que seja usado, mas não permita que ninguém corte sua picada de cobra porque isso pode piorar a situação.

Instruções — Snake Bite

Cuidado: Com uma picada de cobra você não querperder tempo! É vital que o mais rápido possível vocêstal recebendo MMS1 no corpo de acordo com as dosagens fornecidas abaixo.

Passo 1

0 Tome imediatamente uma dose de 12 gotas de MMS1.

Passo 2

0 Simultaneamente, em conjunto com a tomada de MMS1doses, aplique o Snake Bite Patch na área da picada. Faça isso imediatamente após tomar a primeira dose de MMS1 comode acordo com a Etapa 1 acima. Por favor, note que o patch de mordida de cobraé uma fórmula significativamente diferente doPatch MMS1 / DMSO na página 135 deste livro.Nunca, jamais coloque DMSO em uma picada de cobra, pois isso vaileve o veneno fulher para dentro do corpo, não extraia. Consulte Fazendo um patch de mordida de cobra, seguindo a etapa 6 desteprotocolo, página 221.)

etapa 3

0 Meia hora depois, tome a primeira dose de 12 gotas deMMS1,tome uma segunda dose de MMS1, desta vez, uma dose de 6 gotas.

Passo 4

0 Meia hora depois, receba a segunda dose de MMS1,tome uma terceira dose. A terceira dose será uma dose de 6 gotasde MMS1.

Recapitulação: quando alguém foi mordido por uma cobra, elesdeve tomar imediatamente uma dose de 12 gotas de MMS1. Meia hora depois, eles devem tomar uma dose de 6 gotas de MMS1.Meia hora depois disso, tome outra dose de 6 gotas deMMS1. São 3 doses de MMS1 tomadas meia hora apal. Após a primeira dose de 12 gotas de MMS1, eles devem aplicaro patch para uma picada de cobra.

Etapa 5

0 Meia hora depois, (depois de tomar as 3 doses de MMS1 mencionadas nas etapas 2, 3 e 4 acima), inicie o Protocolo 1000. Ou seja, tome uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada horapor oito horas consecutivas por dia. No caso de uma picada de cobra, você pode pular o Procedimento de piquetagem.

Etapa 6

0 Continue com o Protocolo 1000 por pelo menos duas semanas ou mais se houver qualquer indicação de que a picada de cobra ainda está causando problemas. Reduza o número de quedas de hora em hora pela metade se houver náusea, diarréia ou mal-estar. Reduza, mas não pare de tomá-los de hora em hora.

Fazendo um patch de mordida de cobra conforme exigido na etapa 3
Acima

Nota e cuidado: a receita para*o patch para picada de cobra é diferente do descrito no protocolo de patch NNS1 / DMSO na página 135 deste livro. O patch para picada de cobra não contém DMSO. Não use DMSO em um patch para uma picada de cobra. Isso pode ser um erro grave.*

O DNS0 espalhará o veneno e o levará mais profundamente para os tecidos, eliminando o problema.

Passo 1

0 Ative 10 gotas de MMS com 10 gotas de ácido cítrico 50% ou 4º/ oHCl. Conte até 30 segundos e, em seguida, adicione 20gotas de água.

0 Despeje imediatamente esta mistura em um pedaço de gaze de aproximadamente 2 polegadas por 2 polegadas (5 cm por 5 cm)e pelo menos duas camadas de espessura. Se esta mistura não foro suficiente para embeber completamente o patch e, em seguida, o dobro da receita. Ative mais 10 gotas de MMS e adicione 20 gotas de água de acordo com a mesma fórmula no pontoacima,de modo a ser capaz de embeber o patch nomistura.

0 No caso de uma picada de cobra extra grande, você pode ajustar o adesivo para incluir mais de 10 gotas de MMS ativado. (Observe que o Snake Bite Patch exige a adição de 2 gotas de água para cada 1 gota deMMS.)

Passo 2

0 Cole a gaze embebida na picada da cobra, deixe agir por 15 a 20 minutos - não mais!

0 Lembre-se, o patch para a picada de cobra nãocontém DMSO.

etapa 3

0 Aplique um adesivo novo (um segundo adesivo) em uma hora. estesignificará que nas primeiras duas horas, após ser mordido, você terá aplicado dois patches MMS1. Adicione mais água ao adesivo se notar irritação na pele.

Passo 4

0 Após os primeiros dois adesivos, espere três horas e aplique outro adesivo novo e continue aplicando um adesivo novo a cada três horas.

Notas

!>No total, você deve continuar aplicando os patches de acordo com essas instruções, a cada três horas, por um período de 24 horas. (Defina um alarme durante as horas de sono e levante-se para aplicar o adesivo.) Lembre-se, você também está fazendo protocolo 1000 durante este tempo.

!> Se o patch NNS1 está queimando sua pele, continueadicionar um pouco mais de água até que o adesivo não queime,mas não adicione mais água do que o necessário.

Protocolo de Intoxicação Alimentar
(ou qualquer veneno recebido pela boca)

De acordo com o CDC (Centros de Controle de Doenças), mais de 5.000 pessoas morrem de venenos ou doenças transmitidas por alimentos emos Estados Unidos a cada ano, com números semelhantes em todo o mundo. A questão aqui é que é vantajoso saber o que fazer com a intoxicação alimentar.

Um amigo meu foi envenenado uma vez enquanto jantava comigo e com outras pessoas. Ele se levantou da mesa e imediatamente desabou no chão. Eu o ajudei a se levantar. Ele me garantiu que estava bem e queria ir ao banheiro. Ele não estava de forma alguma embriagado. Ele caminhou oP para usar o banheiro e

depois de um minuto eu o verifiquei e o encontrei deitado de costas no chão. Ele conseguiu se apoiar em um cotovelo e olhou para mim e tentou dizer algo, mas não conseguia falar.

Rapidamente misturei uma dose de 15 gotas de MMS1 (procuro sempre carregar pequenos frascos comigo) e entreguei a ele. Ele imediatamente bebeu. Em cinco minutos, ele disse: "Cara, isso foi uma loucura." Então ele se sentou. Ele disse que antes de tomar a dose, tudo estava ficando preto nele. Em 10 minutos ele estava se sentindo bem e eu pude ajudá-lo a se levantar. Voltamos para a mesa onde ele pediu um novo prato de comida e ele estava bem.

Isso serve como um exemplo maravilhoso de como o MMS1 pode cancelar alguns venenos na hora.

A primeira etapa do Protocolo de Intoxicação Alimentar é uma boa dose grande de MMS1, nos mesmos moldes do Protocolo da Malária. Com o envenenamento, você quer acertar com força com oprimeira dose. Mas não espere que sempre esclareça imediatamenteately; você pode ter que persistir um pouco. Nós ajudamosmuitos casos de intoxicação alimentar. Nem sempre esclarecetão rápido quanto com meu amigo, mas o MMS1 já provou ser bem-sucedido em casos como esse. Vocêdeve sempre levar duas garrafas pequenas (MMS e ativa-tor) com você o tempo todo. Esteja pronto - se você suspeitar de intoxicação alimentar ou qualquer outro tipo de intoxicação, pegue um pouco de MMS1no corpo o mais rápido possível.

Instruções para protocolo de intoxicação alimentar

Quando uma pessoasuspeita de envenenamento:

Passo 1

0 Tome uma dose de 15 gotas de MMS1 (MMS ativado). Consulte a página 32 para saber como preparar uma dose de MMS1.

Passo 2

0 Espere 15 minutos após a primeira dose de 15 gotas e, em seguida,
tome uma dose de 6 gotas de MMS1.

etapa 3

0 Espere mais 15 minutos e tome outra 6 gotasdose, esta seria a terceira dose. (Isso significa que em um período de 30 minutos, a partir do ponto inicial, umtomaram 3 doses de MMS. O primeiro e afirmandodose - 15 gotas ativadas. A 2ª e 3ª doses - 6gotas ativadas de MMS.)

Observação:*Se o pemon for provocado a vomitar durante estetempo - seja bem-vindo, não lute contra isso, pois isso ajudará a expulsar oveneno do corpo. O vômito pode ou não ocorrer seo NNS1 neutraliza todo o veneno do corpo. Podeenxágue sem a necessidade de vomitar.*

Passo 4

0 Se não ocorrer vômito durante a administração das primeiras 3 doses, não se preocupe. Mas, tome pelo menos mais 2 doses(4ª e Sth doses); estes devem ser MMS1, 3 gotasdoses, espaçadas por 15 minutos.

Etapa 5

0 Normalmente, a quantidade acima de MMS1 é suficiente para resolver o problema, mas se ainda estiver muito doente por causa do envenenamento, pode ser necessário tomar mais MMS1 e vomitar. Não há nada de errado em vomitar, se for preciso. No caso de envenenamento, o vômito pode ser necessário em alguns casos, então não hesite se for necessário - é melhor eliminar o veneno.

0 Pode ser necessário usar o velho truque de enfiar o dedo na garganta para induzir o vômito. Isso não é tão agressivo quanto ir a uma clínica de emergência e fazer uma lavagem estomacal. Você pode calcular a necessidade de vomitar de acordo com o quão doente você ainda está. Se você é

ainda doente, você pode precisar vomitar e / ou tomar mais MMS1, pois não há lado negativo em tomar mais MMS1, além de sentir náuseas e, em seguida, possivelmente vômitos, diarreia ou dor de cabeça.

Observação:*Com envenenamento, embora desagradável, vômitos ea diarreia é uma forma eficaz de livrar o corpo das toxinas.*

Etapa 6

0 Se ficar alerta fazendo todos os itens acima, você ainda está muito doente, vocêpode precisar de uma lavagem estomacal. Nesse caso, não hesite; vá a uma clínica. No entanto, normalmente soba maioria das condições de envenenamento, se você tiver tomado o acimaprotocolo, você estará bem neste momento.

Protocolo de Concussão

Muitas pessoas usaram DMSO para superar uma concussão. Alguns gerentes de arenas de spols mantêm DMSO disponível emtodas as vezes. O livro DMSO em Trauma e Doenças daO médico pesquisador de DMSO de renome mundial, Dr. Stanley W. Jacob, recomenda o DMSO em todos os casos de concussão.Outros profissionais de saúde e gerentes de spols também rec-pedir DMSO para o tratamento de uma concussão.

Uma concussão é geralmente considerada uma lesão cerebral traumática leve, embora as concussões ocorram em vários graus de gravidade. Alguns sintomas de concussão são:

- Fadiga
- Dores de cabeça
- Distúrbios do sono

- Tontura e desequilíbrio
- Problemas de visão / sensibilidade extra à luz

- Problemas de audição e ruído
- Problemas Musculares e Motores
- Perturbações sensoriais e metabólicas
- CrônicaProblemas de dor
- Disfunção Sexual
- Convulsões

Há vários anos, incorporei o DMSO junto com o MMS1 em vários de nossos protocolos, já que esses doiscomplementam-se. No caso de uma concussão, eusugiro fazer a seguinte emergênciaProtocolo de AVC.

Protocolo de AVC

Cerca de 700.000 acidentes vasculares cerebrais acontecem nos Estados Unidos a cada ano, e desse número aproximadamente 150.000 mortesocorrer. Portanto, os golpes não devem ser ignorados. Quando um AVC estiver ocorrendo, siga o protocolo abaixo. Usar DMSO e MMS1 pode pará-lo em suas trilhas. Tanto o DMSO quanto o MMS1 irão dissolver coágulos sanguíneos por todo o corpo, inclusive no cérebro. DMSO tem sido usado nos EUAdesde 1955e muitas pessoas testemunharam sobre como issoajudou a superar derrames. Da mesma forma, DMSO e MMS1têm sido usados juntos para um maior benefício pormilhares.

Nota: Eu uso o NNS há 20 anos. No início de 2012, eu havia ajudado pemonally mais de E0.000 pessoas ao redor do mundo usando NNS, (e pontuações mais desde então, mas perdi a conta). Só ajudei um pemon que estava tendo um derrame, e foi bem-sucedido. O conselho que dou aqui é o que eu mesmo faria se eu*estava tendo um derrame e um hospital não estava disponível para mim.Se houvesse um hospital, eu ainda*

faria isso: começaria o protocolo ainda em casa e continuaria a fazer no caminho para o hospital, por mais que demorasse. Quando voltasse do hospital, continuaria com

o protocolo. Na minha opinião, usar DMSO e MMS1 pode significar a diferença entre a vida e a morte, ou a diferença entre ter efeitos colaterais de longo prazo ou não. No entanto, é totalmente sua responsabilidade fazer ou não fazereste protocolo.

Os sinais de um derrame são:

- Face caída - faz umlado do rosto está caído ou está dormente? Peça para a pessoa sorrir. O sorriso da pessoa é irregular?

- Fraqueza do braço - um braço está fraco ou dormente? Peça à pessoa para levantar os dois braços.Um braço oscilapara baixo?

- Dificuldade de fala - a fala está arrastada? A pessoa não consegue falar ou é difícil de entender? Peça à pessoa para repetir uma frase simples, como "A grama é verde". A frase é repetida corretamente?

Se alguém apresentar algum desses sintomas, mesmo que os sintomas desapareçam, é hora de adiar o protocolo abaixo ou levar a pessoa ao hospital imediatamente se forsua escolha. Verificaro tempo para que você saiba quando os primeiros sintomas apareceram. No caso de procurar médicoassistência, pode ainda começar com as primeiras doses de DMSO, seguidas de MMS1 de acordo com as seguintes instruções. Colocar DMSO e MMS1 no corpo imediatamente pode salvar uma vida. E se você fizer isso, a pessoa pode estar bem quando você puder chegar ao hospital. Se for tomada a decisão de ir ao hospital, é melhor sempre chamar uma ambulância ou pedir que outra pessoa dirija. Uma pessoanunca deveriatentar dirigir-se a um hospital seexperimentando um derrame.

Instruções para superar um derrame com MMS1 e DMSO

Os coágulos sanguíneos podem causar acidentes vasculares cerebrais. DMSO é capaz de se dissolvercoágulos de sangue. MMS1também funciona para dissolver coágulos. UsandoO DMSO em conjunto com o MMS1 pode ser muito eletivo tanto para superar um derrame quanto para reparar danos causados por um derrame. Quando um coágulo sanguíneo impede o fluxo sanguíneo para qualquer área do cérebro, um derrame pode ocorrer e causaraquela área palicular do cérebro para desligar. No entanto, se o coágulo sanguíneo puder ser dissolvido usando DMSO e MMS1, o oxigênio mais uma vez será capaz de fluir para essa área do cérebro para que essa área do cérebro comece a funcionar adequadamente.

Embora as instruções abaixo expliquem o que fazer noinício de um derrame, é indelicado saber que, emborauma pessoa já sofreu um derrame, e depois de algumas horas a um ou dois dias, ainda é possível começar e seguircom estas instruções declarando no primeiro dia (ver chal no Guia de dosagem para protocolo de AVC, dia 1). Láainda há esperança de que o dano possa ser evitado ou revertido. Istofoi repelido que, embora muitos meses ou alguns anos tenham se passado após um acidente vascular cerebral, se alguém fizer um regime regular de DMSO junto com MMS1, isso pode reverter a doença ou todos os danos.

O sabor do DMSO está longe de ser agradável. No entanto, o benefício de usá-lo supera em muito o gosto ruim. O DMSO de grau farmacêutico foi descrito como tendoquase nenhum cheiro ou gosto ruim. Ele pode ser encontrado na internet e em algumas farmácias. O custo é substancialmentesuperior.

Dia 1 - no início de um derrame

As instruções abaixo são muito detalhadas. Incluímos um bate-papo do guia de dosagem no final desta seção para ajudar

facilite um seguindo este protocolo. No entanto, por favor, não corte atalhos e siga direto para o chal; Thor-leia atentamente todas as instruções abaixo para obter uma boacompreensão do procedimento.

Primeira hora

- ❑ No início de um derrame, primeiro oP, misture 2 colheres de sopa cheias (30 ml) de DMSO diluído em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. Beba imediatamente. Este é o ponto de partida do protocolo Stroke.

- ❑ Também no início de um derrame, inicie o Protocolo 6 e
  6. Estas são duas doses de 6 gotas de MMS ativado (MMS1),tomado uma hora apal. (Ver página 169 para detalhes completos deProtocolo 6 e 6.) MMS1 e DMSO funcionam emconjunção um com o outro, portanto, o primeiro 6-dropdose de MMS1 para um acidente vascular cerebral, deve ser tomada em menos de dois minutos após a primeira dose de DMSO. O MMS1deve ser misturado em uma segunda 1/2 xícara (4 onças / 120ml) de água. (Deve ser tomado logo após a dose de DMSO, mas não misture com o DMSO). Se a qualquer momento você perder o limite de dois minutos, vá em frente etome a dose mesmo que tenham passado três, cinco, dez minutos ou mais. Tente não perder o limite de dois minutos.

- ❑ Dez minutos após o ponto de partida desteprotocolo, deve-se tomar uma segunda dose de 2 colheres de sopa (30 ml) de DMSO em 1/2 xícara (4 onças / 120ml) de água. Nenhum MMS1 foi feito neste momento.

- ❑ Trinta minutos após o ponto de partida, um terceiro2Deve-se tomar uma dose de colher de sopa (30 ml) de DMSO em 1/2 xícara (4 onças /

120 ml) de água. Nenhum MMS1 étomadas neste momento.

- Quarenta e cinco minutos após o ponto de partida, um
  falta de 2 colheres de sopa (30 ml) de dose de DMSO em 1/2 xícara

(4 onças / 120 ml) deve ser tomado. Nenhum MMS1 foi usadoNeste momento.

Segunda hora

0U m a h o r a d e p o i s d e i n i c i a r e s t e p r o t o c o l o d e A V C , (q u e é o i n í c i o d a s e g u n d a h o r a) , c o n t i n u e a t o m a r DMSO a cada 15 minutos,reduza a dosagem para 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO em 1/4 de xícara (2 onças / 60 ml) de água.

0 Também uma hora após iniciar este protocolo de AVC, dentro de dois minutos após tomar a dose de DMSO, tomeoutra dose de 6 gotas de MMS1. Esta é a segunda dose de 6 gotas, tomada uma hora após a primeira dose de 6 gotas.Não tome mais do que duas doses de 6 gotas de MMS1, umahora um amigo.

TerceiroHora

0 Duas horas após o ponto de partida, (que seráinício da terceira hora), tome outro DMSOdose. Continue tomando 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO em 1/4 xícara (2 onças / 60 ml) de água a cada 15 minutosa terceira hora.

0 Também duas horas após o ponto de partida, noinício da terceira hora, comece a tomar o Protocolo 1000.Esta é uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora durante oito horas por dia. Esta dose de 3 gotas de MMS1 deve ser administrada dentro de dois minutos após a primeira dose de DMSO no início da terceira hora.

0 Geralmente, eu sugiro trabalhar gradualmente até a dose de 3 gotas ao iniciar o Protocolo 1000. Indo direto para 3cai uma hora para o protocolo Stroke, é uma

exceção à regra. Se, no entanto, alguém tiver uma reação Herxheimer e sentir náuseas, tiver diarreia ou vômitos,

cortar a dose de MMS1 pela metade. Senecessário, guardareduzindo pela metade até que esses sintomas diminuam. Quando oos sintomas passam, gradualmente trabalhe de volta para uma queda de 3dose a cada hora, ou a uma dose tão alta que seja comfolable para você sem causar um Herxheimerreação. Mas não ultrapasse mais de 3 gotas por horaenquanto no Protocolo 1000.

Notas

!> Lembre-se, se um pemon é levado a diminuir sua dose deMMS1, eles devem diminuirisso, mas não pare de tomá-locompletamente.

b Até este ponto, o pemon neste protocolo terá completado três horas no total tomando DMSO a cada 15 minutos.

!> Observe que quando você reduz a quantidade deDMSO em sua dose, é importante também diminuir oquantidade de água que você mistura com ele.

Quarta à oitava hora

0 AR nas primeiras três horas após tomar DMSO a cada 15minutos nas diferentes dosagens descritas acima,continue a tomar DMSO durante o resto do dia do primeiro dia, mas reduza a frequência das suas doses. Umvez a cada hora, tome 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO em 1/4 de xícara (2 onças / 60 ml) de água. A pessoajá deveria ter parado de tomar o Protocolo 1000,que é uma dose horária de 3 gotas de MMS1. A dose horária de DMSO e a dose horária de MMS1 devem sempreser tomado dentro de dois minutos (máximo) apal.

*b Não misture a dose de MMS3 com a mistura de DMSO. Não confunda isso com outros protocolos ondeexige a adição de gotas de DMSO na dose de MMS1. Neste caso, a dose de DMSO é muito maior do que em outrasprotocolos, portanto, é recomendado*não misturar DMSO em*a mesma dose com MMS1. Tome a dose de MMS3 em menosde dois minutos após a dose de DNS0, mas separadamenteou seja, não no mesmo copo de água.*

!> Mencionamos aqui o que fazer no "primeiro dia" no início de um AVC. No entanto, um derrame pode ocorrer a qualquer momento, e se alguém sentir um derrame vindo à noite, por exemplo, seria aconselhável seguir a dosagem mencionada acima durante a noite. Em outras palavras, fique acordado ou configure um alarme se for necessário, a fim de tomar suas doses,já que os derrames podem afligir as pessoas durante o sono.

Dia 2 a 7

- No segundo dia após um derrame, e após ter seguido o procedimento do primeiro dia acima, continue tomando MMS1, de acordo com o Protocolo 1000. Isso é tomar uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora por oito horas consecutivas. Eu recomendo completar as três semanas completas sugeridas de fazer o Protocolo 1000, mesmo que alguém tente se sentir muito melhor, como uma medida de precaução.

- No segundo dia após um derrame, pode-se reduzir oIngestão de DMSO para 1 colher de sopa (15 ml) pela manhãe 1 colher de sopa (15 ml) à noite. Este montantede DMSO deve ser tomado em 1/4 xícara (2 onças / 60ml) de água. Essas dosagens de DMSO devem ser tomadas em coordenação com a dosagem de MMS1. Um deve estar no Protocolo

1000, então sugiro que tomem a dose de DMSO dentro de dois minutos após a primeira dose de MMS1 do dia,e a última dose de MMS1 do dia.

Dia 8 a 21

- Continue com o Protocolo 1000, até completar o período de 21 dias.

- Reduza a ingestão de DMSO para 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO apenas 1 vez ao dia (dentro de dois minutos de uma de suas doses de MMS1), durante os 21 dias restantes.

- Se você sentir que não está progredindo em sua recuperação, recomendo voltar ao primeiro dia do Protocolo de AVC e declarar todo o processo novamente, conforme descrito acima. Em outras palavras, continue desde o início e continue até completar os 21 dias.

Notas

!> Se alguém teve um derrame e se recuperou totalmente, eu recomendo uma dose diária de manutenção deMMS1 (dose de 6 gotas) e 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO em1/4 xícara (2 onças / 60ml) de água. Se, a qualquer momento, os sintomas de um AVC surgirem novamente, o procedimento completo descrito acima deve ser seguido.

*!>Dê uma olhada em sua dieta e hábitos de exercício*para ver se há espaço para melhorias.

b Infelizmente, não há garantia completa de recuperaçãoery de um acidente vascular cerebral. no entantomuitas pessoas se recuperaram de derrames usando DNSO, e o NNS1 também ajudounesta área.

Seguindosão dois chals para guiarVocê através deeste protocolo. É indelicado que você interrompa a hora 00:00 imediatamente quandonecessário e continue com o 15intervalos de minutos de seuponto de afirmação (por exemplo, se um derrame ocorrer às 12h20, tomando DMSO e MMS1 imediatamente, então 15 minutos depoisseria 12h35 e assim por diante).

Guia de dosagem para protocolo de AVC, dia 1				
Hora de início 00:00 imediatamente, sempre que foré preciso, **independentemente da hora real. Não espere.**				
Etapa	**Hora**	**Hora / Min.**	**MMS1**	**DMSO / Água**
1	**Hora Inicial 1**	**00:00**	**6 gotas**	**2 colheres de sopa (30 ml)** **4 oz (120 ml)**
2		**00:15**	**0**	**2 colheres de sopa (30 ml)** **4 oz (120 ml)**
3		**00:30**	**0**	**2 colheres de sopa (30 ml)** **4 oz (120 ml)**
4		**00:45**	**0**	**2 colheres de sopa (30 ml)** **4 oz (120 ml)**
5	**Hora 2**	**01:00**	**6 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml)** **2 oz (60 ml)**
6		**01:15**	**0**	**1 Colher de sopa (15 ml)** **2 oz (60 ml)**
7		**01:30**	**0**	**1 Colher de sopa (15 ml)** **2 oz (60 ml)**
8		**01:45**	**0**	**1 Colher de sopa (15 ml)** **2 oz (60 ml)**

9	**Hora 3**	**02:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
10		**02:15**	**0**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
11		**02:30**	**0**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
12		**02:45**	**0**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
13	**Hora 4**	**03:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
14	**Hora 5**	**04:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
15	**Hora 6**	**05:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
16	**Hora 7**	**06:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
17	**Hora 8**	**07:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**

Guia de dosagem para protocolo de AVC, dias 2 a 7				
Etapa	Hora	Hora / Min.	MMS1	DMSO / Água
1	Hora Inicial 1	00:00	3 gotas	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
2	Hora2	01:00	3Drops	0
3	Hora3	02:00	3Drops	0
4	Hora4	03:00	3Drops	0
5	Hora 5	04:00	3Drops	0
6	Hour6	05:00	3Drops	0
7	Hora7	06:00	3Drops	0
8	Hora 8	07:00	3 gotas	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
Dia 8 - 21				

- Conecte-se ao Protocolo 1000, até completar o período de 21 dias.
- Reduza a sua dose de DMSO de 2 colheres de sopa (30 ml) para 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO diariamente, durante os 21 dias restantes.

o Se não estiver progredindo, volte ao Dia 1. Inicie todo o processomais uma vez.

o Consulte o protocolo completo na página 227 para obter detalhes.

Protocolo de Ataque Cardíaco

Cerca de 600.000 mortes por ataque de cura acontecem nos EUA cadaano. Quando um ataque de cura está ocorrendo, seguindo o protocolo DMSO / MMS1 combinado abaixo, pode pará-lo imediatamente. O DMSO tem sido usado nos EUA desde 1955 ehá muitos testemunhos sobre como isso ajudousuperar ataques de cura. Além disso, o MMS1 tem sido usado extensivamente desde o ano de 2000, e o DMSO e o MMS1foram usados juntos para um benefício aumentado pormilhares.

Nota: Eu uso o NNS há 20 anos. No início de 2012, já havia ajudado pemonally mais de E0.000 pessoas em todo o mundo usando NNS, (e pontuações mais desde então, mas perdi a contagem). Eu só ajudei três pessoas*que estavam passando por um ataque cardíaco, cada caso foibem-sucedido. O conselho que dou aqui é o que eu mesmo faria se estivesse com o coração partido e um hospital não estivesse disponível para mim. Se um hospital estivesse disponível, eu ainda faria isso. eu começaria o protocolo ainda em casa e continuaria*para fazê-lo no caminho para o hospital, por mais que demorasse. Quando voltasse do hospital, continuaria com o protocolo. Na minha opinião, usar DNS0 e MMS1 pode significar a diferença entre a vida e a morte,*ou a diferença entre ter efeitos colaterais de longo prazo ounão. No entanto, é totalmente sua responsabilidade fazerou não fazer este protocolo.*

Os sinais de um ataque de cura são dor no peito, nos braços (especialmente no esquerdo), nas costas, no pescoço, na mandíbula e na parte superior do estômago; e falta de ar, náusea, tontura e suores frios.

Seu m s u s p e i t a u m a t a q u e d e c u r a c h e g a n d o , é h o r a d e p a r a r nos protocolos, ou leve a pessoa ao hospital imediatamente se for sua escolha. Verifique a hora para que você saibaquando apareceram os primeiros sintomas. No caso de buscarassistência médica, você ainda pode começarc o m a s p r i m e i r a s d o s e s de DMSO, seguido por MMS1 de acordo com as instruções abaixo.Colocar DMSO e MMS1 no corpo imediatamente pode salvar uma vida. E se você fizer isso, a pessoa pode estar bem quando você puder chegar ao hospital. Se a decisãoé feito para ir ao hospital, é melhor chamar sempre uma ambulância ou mandar outra pessoa conduzir. Uma pessoa deverianunca tentedirigir-se a um hospital se estiver experimentandoum ataque de cura.

Instruções para superar um ataque cardíaco com MMS1 e DMSO

Embora as instruções abaixo expliquem o que fazer no início de um ataque de cura, é indelicado saber que mesmoembora uma pessoa já tenha sofrido um ataque de cura, eistoé de algumas horas a um ou dois dias depois, ainda é possível começare siga estas instruções declarando no diaum (ver chal no Guia de dosagem para protocolo de ataque de calor, dia 1, página 244). Ainda há esperança de que o dano possa serevitado ou revertido. Se alguém vai em um regime regular de tomarDMSO junto comMMS1, pode reverter amigoo u todos os danos.

O sabor do DMSO está longe de ser agradável. No entanto, oo benefício de usá-lo supera em muito o gosto ruim. O far-DMSO de grau farmacêutico foi descritocomo tendoquase nenhum cheiro ou gosto ruim. Ele pode ser encontrado noInternet e em algumas farmácias. O custo é substancialmentesuperior.

Dia 1 - no início de um ataque cardíaco

As instruções abaixo são muito detalhadas. Incluímos um Bate-papo do Guia de Dosagem no final desta seção para ajudar a facilitar o seguimento deste protocolo. No entanto, por favor, façaNão corte atalhos e prossiga direto para o desafio, leia atentamente todas as instruções abaixo para obter uma boa compreensão do procedimento.

Primeira hora

0 No início de um ataque cardíaco, primeiro oP, misture 2 completocolheres de sopa (30 ml) de DMSO diluídas em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. Beba imediatamente.Este é o ponto de partida do protocolo HealAttack.

0T a m b é m n o i n í c i o d e u m a t a q u e c a r d í a c o , c o m e c e P r o t o c o l o 6 e 6. Estas são duas doses de 6 gotas de MMS ativado (MMS1), tomadas uma hora apal. (Veja a página 169 para detalhes completos dos Protocolos 6 e 6.) MMS1 e DMSO funcionam emconjunção um com o outro, portanto, o primeiro 6-dropdose de MMS1 para um ataque de cura, deveser administrado em menos de dois minutos após a primeira dose de DMSO. O MMS1 deve ser misturado em um segundo 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. (Deve ser tomado logo após a dose de DMSO, mas não misture com o DMSO.) Sea qualquer momento que você perder o limite de dois minutos, vá sempreem frente e tome a dose mesmo que tenham se passado três, cinco, dez minutos ou mais. Tente não perder o limite de dois minutos.

0FiReen minutos aRer o ponto de partida deste
protocolo, deve-sedê umasegunda dose d e 2 colheres de sopa (30 ml) de DMSO em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. Nenhum MMS1 foi feito neste momento.

0 Trinta minutos após o ponto de partida, um terceiro 2Deve-se tomar uma dose de colher de sopa (30 ml) de DMSO em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. Nenhum MMS1 étomadas neste momento.

0 Quarenta e cinco minutos após o ponto de partida, umfalta de 2 colheres de sopa (30 ml) de dose de DMSO em 1/2 xícara(4 onças / 120 ml) deve ser tomado. Nenhum MMS1 foi usadoNeste momento.

Segunda hora

0 Uma hora depois de iniciar este protocolo de ataque de cura, (que é o início da segunda hora), continue a tomar DMSO a cada 15 minutos, mas reduza a dosagem para 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO em 1/4 de xícara (2 onças / 60 ml) de água.

0 Também uma hora após iniciar este ataque de curaprotocolo, dentro de dois minutos após tomar a dose de DMSO, tome outra dose de 6 gotas de MMS1. Isto é osegunda dose de 6 gotas, tomada uma hora após a primeiraDose de 6 gotas. Não tome mais do que duas doses de 6 gotasde MMS1, uma hora por amigo.

TerceiroHora

0 Duas horas após o ponto de partida, (que seráinício da terceira hora), tome outro DMSOdose. Continue tomando 1 colher de sopa(15 ml) de DMSO em 1/4 xícara (2 onças / 60 ml) de água a cada 15 minutosa terceira hora.

0 Também duas horas após o ponto de partida, noinício da terceira hora, comece a tomar o Protocolo 1000.Esta é uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora durante oitohoras por dia. Esta dose de 3 gotas de MMS1 deve sertomado dentro de dois minutos após a primeira dose de DMSO no início da terceira hora.

0 Geralmente, eu sugiro trabalhar gradualmente até a queda de 3dosar ao começarProtocolo 1000. Indo direto para 3cai uma hora para o Protocolo de Calor, é uma exceção à regra. Se, no entanto, alguém experimenta um Herxheimerreaçãoe sente náuseas, tem diarreia ou vômitos,cortar a dose de MMS1 pela metade. Senecessário, guardareduzindo pela metade até que esses sintomas diminuam. Quando oos sintomas passam, gradualmente trabalhe de volta para uma queda de 3dose a cada hora, ou a uma dose tão alta que seja comfolable para você sem causar um Herxheimerreação. Mas não ultrapasse mais de 3 gotas por horaenquanto no Protocolo 1000.

Notas

b Lembre-se, se uma pessoa for levada a diminuir a dose deMMS1, eles deveriam abaixá-lo, mas não pare de tomá-locompletamente.

!>Até este ponto, o pemon neste protocolo terá completado três horas no total tomando DNS0 a cada 15minutos.

*b por favor pegue*observe que quando você diminui a quantidade de DMsO em sua dose, é importante também diminuir a quantidade de água que você mistura com ele.

Quarta à oitava hora

0 AR nas primeiras três horas após tomar DMSO a cada 15minutos nas diferentes dosagens descritas acima,continue a tomar DMSO durante o resto do dia do primeiro dia, mas reduza a frequência das suas doses. Uma vez a cada hora, tome 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO em 1/4 de xícara (2 onças / 60 ml) de água. A pessoajá deve ter parado de tomar o Protocolo 1000, que é uma dose de 3 gotas de MMS1 de hora em hora. A cada horaDose de DMSOe a dose horária de MMS1 deve sempreser tomado dentro de dois minutos (máximo) apal.

Notas

¥ Não misture a dose de MMS1 com o DMSOmistura. Não confunda isso com outros protocolos em que exige a adição de quedas DNS0 na dose de NNS1. Nesse caso, a dose de DMSO é muito maior do que em outros protocolos, portanto, é recomendável não misturar o DMSO na mesma dose

com o MNS1. Tome a dose de MMS3 em menosde dois minutos após a dose DNS0, mas separadamenteou seja, não no mesmo copo de água.

*b Mencionamos aqui o que*para fazer no “primeiro dia” no início de um ataque cardíaco. No entanto, um coração aNack pode atacar a qualquer momento, e se alguém sentir um coração akack vindo à noite, por exemplo, seria aconselhável seguir a dosagem mencionada acima, durante a noite. Em outras palavras, fique acordado ou configure um alarme se for necessário, a fim de tomar suas doses, como um coração aKack pode a / ñictple em seus*dorme.*

Dia 2 a 7

0 No segundo dia após um ataque de cura, e alguém mais alerta temseguiu o procedimentopara o dia um acima, continuetomando MMS1, de acordo com o Protocolo 1000. Isso significa tomar uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora durante oitohoras. Eu recomendo completar os três sugeridossemanas inteiras de fazer o Protocolo 1000, mesmo se alguém tentarse sentir muito melhor, como medida de precaução.

0 No segundo dia após um ataque de cura, pode-se reduzira ingestão de DMSO para 1 colher de sopa (15 ml) de manhã e 1 colher de sopa (15 ml) à noite. Esta quantidade de DMSO deve ser ingerida em 1/4 de xícara (2 onças / 60 ml) de água. Essas dosagens de DMSO devem ser tomadas em coordenação com a dosagem de MMS1. Um deve estar no Protocolo 1000, então eu sugiro que eles tomem a dose de DMSO dentro de dois minutos da primeira dose de MMS1do dia e a última dose de MMS1 do dia.

Dia 8 a 21

0 Continue o Protocolo 1000, até completar o 21-diaperíodo.

0Reduza a ingestão de DMSO para 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO apenas 1 vez ao dia (dentro de dois minutos de uma de suas doses de MMS1), durante os 21 dias restantes.

0 Se você sentir que não está progredindo em sua recuperação, recomendo voltar ao primeiro dia do Protocolo de Ataque Térmico e declarar todo o processo novamente, conforme descrito acima. Em outras palavras, pare do início e continue até completar os 21 dias.

Notas

¥S e a l g u é m t e v e u m c o r a ç ã o q u e b r a d o e s e r e c u p e r o u t o t a l m e n t e , No entanto, recomendo uma dose de manutenção diária deMMS1 (dose de 6 gotas) e 1 colher de sopa (1E ml) de DMSO em1/4 xícara (2 onças / 60ml) de água. se a qualquer momento os sintomas de uma doença cardíaca aparecerem novamente, o procedimento completo descrito acima deve ser seguido.

!> Dê uma olhada em sua dieta e hábitos de exercício para ver se há espaço para melhorias.

!>I n f e l i z m e n t e , n ã o h á g a r a n t i a d e r e c u p e r a ç ã o d e c o r a ç ã o aNack, mas milhares de p e s s o a s s e r e c u p e r a r a m d e c o r a ç ã o aNacks usando DNS0, e NMS1 t a m b é m f o i uma ajuda nesta área.

Seguindos ã o d o i s c h a l s p a r a g u i a r Você a t r a v é s d e e s t e p r o t o c o l o . É i n d e l i c a d o q u e v o c ê i n t e r r o m p a a h o r a 0 0 : 0 0 i m e d i a t a m e n t e q u a n d o necessário e continue com os intervalos de 15 minutos de seuafirmando ponto (por exemplose um ataque de cura ocorrer às 12h20stal tomando DMSO e MMS1 imediatamente, depois 15 minutosmais tarde seria 12h35 e assim por diante).

Guia de dosagem para protocolo de ataque cardíaco, dia 1

Hora de início 00:00 imediatamente, sempre que foré preciso,

independentemente da hora real. Não espere.

Etapa	Hora	Hora / Min.	MMS1	DMSO / Água
1	Hora Inicial 1	00:00	6 gotas	2 colheres de sopa (30 ml) 4 oz (120 ml)
2		00:15	0	2 colheres de sopa (30 ml) 4 oz (120 ml)
3		00:30	0	2 colheres de sopa (30 ml) 4 oz (120 ml)
4		00:45	0	2 colheres de sopa (30 ml) 4 oz (120 ml)
5	Hora 2	01:00	6 gotas	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
6		01:15	0	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
7		01:30	0	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
8		01:45	0	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
9	Hora 3	02:00	3 gotas	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
10		02:15	0	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
11		02:30	0	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)

12		**02:45**	**0**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
13	**Hora 4**	**03:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
14	**Hora 5**	**04:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
15	**Hora 6**	**05:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
16	**Hora 7**	**06:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**
17	**Hora 8**	**07:00**	**3 gotas**	**1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)**

Guia de dosagem para protocolo de ataque cardíaco, dias 2 a 7				
Etapa	Hora	Hora / Min.	MMSl	DMSO / Água
1	Hora Inicial 1	00:00	3 gotas	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
2	Hora2	01:00	3Drops	0
3	Hora3	02:00	3Drops	0
4	Hora4	03:00	3Drops	0
5	Hora 5	04:00	3Drops	0
6	Hour6	05:00	3Drops	0
7	Hora7	06:00	3Drops	0
8	Hora 8	07:00	3 gotas	1 Colher de sopa (15 ml) 2 oz (60 ml)
Dia 8 - 21				

- Conecte-se ao Protocolo 1000, até completar o período de 21 dias.o Diminua sua dose de DMSO de 2 colheres de sopa (30 ml) para 1
  colher de sopa (15 ml) de DMSO diariamente, durante os 21 dias restantes.
- o Se não estiver progredindo, volte ao Dia 1. Inicie todo o processomais uma vez.
- Consulte o protocolo completo na página 236 para obter detalhes.

Protocolo de queima

As queimaduras causam a geração de ácido na pele e nos tecidosque foram queimados. MMS não ativado (22,4%/ o solução declorito de sódio na água) é altamente alcalino e alcalinoa água cancela o ácido, portanto, quando alguém esfrega suavemente una ‹:: tivat-e4 MMS sobre a queimadura, a maior parte do ácido será neutralizada, o que eliminará grande parte da dor. O ácido na queima pode ativar parte do clorito de sódio no MMS,oxidando assim alguns dos venenos de queimadura

e também reduzindoa dor. Normalmente, a dor desaparece instantaneamente ou em algunsminutos ao usar MMS não ativado, mas às vezes ligado

queimaduras muito ruins pode demorar mais. O tempo de cicatrização de queimaduras quando MMS não ativado é usado pode ser até 4 vezes mais rápido do que o normal. O protocolo a seguir pode ser usado para queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus.

Observe que este protocolo é uma exceção à regra geralde ativar o MMS com um ácido de qualidade alimentar. Eu recomendousando MMS não ativado em uma quantidade muito pequena, diretamente nouma picada de mosquito e algumas outras picadas de inseto (ver páginas 196, 206-208). Eu também recomendo usarMMS para queimaduras, (a quantidade depende do tamanho doqueimar). Se estiver usando MMS não ativado para uma gravação, siga as instruções explícitas abaixo. Em geral, para todos os outros protocolosneste livro, recomendamosativandoMMScomum ácido de qualidade alimentar, adicionando então a quantidade indicada deágua antes de usar.

Instruçõespara queimaduras - usando MMS não ativado

Passo 1

0 Em caso de queimadura em qualquer parte do corpo, imediatamente,ou o mais rápido possível, coloque bastante MMS não ativadona área queimada. (Se a queimadura for no rosto, tome cuidado para evitar os olhos.) Não se preocupe em obter um pequeno MMS não ativado na pele não queimada. (Veja abaixo: Você vai lavá-lo oP em cinco minutos.)

0 Com a ponta dos dedos, esfregue suavemente (mal tocando a queimadura, mas o suficiente para garantir o contato) o MMS diretamente na queimadura. A dor vai começar a diminuirimediatamente.

Passo 2

0 Não permitir que MMS não ativado permaneça no seupele por mais de cinco minutos! Deve ser enxaguadooP com água limpa, fria ou fria. Se você esquecer e

permitir que o MMS permaneça na queimadura, isso agravará a queimadura e a cicatrização demorará mais do que o normal.

etapa 3

0 Dependendo da gravidade da queimadura, a dor normalmente irá parar em cinco minutos. Se a dor não desaparecer completamente ao final de cinco minutos, você pode aplicar uma segunda quantidade de MMS não ativado, mas somente após o enxágue após a primeira aplicação. Siga o procedimento exato conforme descrito nas etapas 1 e 2 acima.

Notas

!> No caso de queimaduras graves, se você aplicou 2aplicações de MMS não ativado e a dor continua, você pode então aplicar NNS não ativado a cada meia horapor até duas horas. (Mas lembre-se, cada aplicativo deveser enxaguado após cinco minutos.)

¥ Se a dor persistir após este período de duas horas, você pode aplicar MMS não ativado mais duas vezes, mas desta vez com um intervalo de uma hora. Cada uma dessas aplicações deve estar de acordo com as etapas 1 e 2 acima.

!>E m g e r a l , a d o r v a i e m b o r a d e n t r o d e q u a t r o h o r a s , m a s s e n ã o , v o c ê p o d e c o n t i n u a r o p r o c e s s o d e l i n e a d o n a s e t a p a s 1 e2 a cada quatro horas.

¥ Depois que a dor diminuir, se você tiver acesso a Aloe vera fresco, isso pode ajudar a curar uma queimadura. Abra (longitudinalmente) uma folha da planta fresca e aplique o

gel fresco na área queimada. Isso pode ser repetido quantas vezes for necessário.

Cuidado! Lembre-se, nunca deixe o MMS desativadoem sua pele por mais de cinco minutos, sempreenxágue com água fria.

Instruções para queimaduras de sol - usando UnactivatedM M S

Passo 1

0 Em caso de queimadura solar, severa ou muito leve, é melhor borrifar MMS não ativado diretamente na área queimada.

0 Após a pulverização, esfregue suavemente o MMS não ativado sobre a pele queimada.

Passo 2

0 Certifique-se de enxaguar o MMS oP com água limpa fria ou fria em cinco minutos ou menos. Não deixe que permaneça na pele por mais de cinco minutos ou pode causar o seupele para descascar.

etapa 3

□ Com queimaduras de sol, um pouco de dor pode cessar novamente em várias horas, neste caso, aplique MMS não ativado novamente, mas por não mais do que cinco minutos e, em seguida, enxágue comágua limpa, fria ou fria.

Notas

*:> A queimadura de sol é diferente de outras queimaduras, pois é principalmentemais na superfície da pele, portanto, é tratada de forma diferente.N ã o a p l i q u e n ã o a t i v a d o M M E m a i s m o z e d o q u e S vezes no total para queimaduras solares, e não mais do que a mãe*1*tempo por hora. Nunca*deixe permanecer na sua pele por mais tempo*mais de cinco minutos.*

*b Em geral, queimaduras solares aparecem em uma hora, até*a um dia.

Protocolo de uma semana de vida

Se o médico disser que você só tem uma ou duas semanas paraao vivo, eu diria que é wolh dar uma chance ao MMS. Por que não?Ciência médican ã o funcionou e não há mais nada a perder. Tenho recebido e-mails de muitas pessoas afirmando que ressuscitaram da quase morte, quando, de acordo com os médicos, faltavam apenas uma ou duas semanas. Não há garantias na vida. Mas nunca desista de si mesmo ou de outra pessoa. Mesmo que uma pessoa tenha apenas uma hora restante, obtenha algum MMS no corpo.

No caso de uma pessoa ter de uma a duas semanas de vida, sugiro acelerar o HRP da seguinte forma:

O procedimento inicial

Comece o procedimento de piquetagem, mas, neste caso, remova todas as paradas. Ultrapassar o procedimento de piquetagem - faça-o emum dia, passe por cada etapa.

0 Tome uma dose de 1/4 de gota por duas horas.

0 Aumente para uma dose de 1/2 gota nas próximas duas horas.

0 Aumente para uma dose de 3/4 de gota nas próximas duas horas.

0 Por último, aumente para uma dose de 1 gota por mais duas horas.

Notas

¥ *Isso é oito horas no total de tomar NNS1, aumentando a queda de 1/4 da ingestão para 1 gota durante esse período de tempo.*

!> A qualquer momento durante este processo, se você tiver uma sensação adicional de enjôo, reduza a dose em 1/2 da quantidade de sua última dose. Por exemplo, se uma dose de 1/2 gota faz você se sentir mal, corte novamente para 1/4 de uma gota. Começar

*aumentandoas gotas novamente quandovocê sente que seu corpo é capaz de tolerar mais. Se for esse o caso, pode demorarmais de um dia*para passar pelo procedimento de inicialização.*Esteja atento a como o corpo está reagindo e ajuste odose em conformidade.*

Protocolo 1000, 1000 Plus e 2000

Depois de acelerar o procedimento de piquetagem, a ideia é passar para o protocolo 1000 e prosseguir paraProtocolo 1000 Plus e Protocolo 2000 o mais rápido possível, mas sem se permitir se sentir pior do que o seua doença já está fazendo você sentir.

- Depois de completar o procedimento fast-track de piquetagem descrito acima, vá para o Protocolo 1000. Comece com uma dose de 1 gota na primeira hora e aumente as gotas com cada dose, de acordo com o que seu corpo pode tolerar, até atingir 3 gotas por dose.

- Quando você atinge uma dose de 3 gotas, se tudo estiver indobem e você não está experimentando nenhumdoença, aler três a quatro doses de 3 gotas de MMS1, você pode começar a adicionar DMSO às suas doses (de acordo comInstruções do protocolo 1000 Plus).

- Depois de tomar 2 a 3 doses de MMS1 com DMSO adicionado,prossiga para o Protocolo 2000 tão rápido quanto seu corpo puder lidar com ele. Isso significa manteraumentandoQuantidadede gotas de MMS1 e DMSO com cada dose de hora em horade acordo com o que seu corpo pode tolerar. (A proporçãode DMSO para MMS1 é 3 gotas de DMSO para cada 1 gotade MMS1.) Se você não tem DMSO não deixe issopare, continue a aumentar as gotas de MMS1toda hora.

0 Após dois dias de aumento de quedas de MMS1 e DMSO,novamente, se tudo estiver indo bem, adicione MMS2 de acordo com as instruções do Protocolo 2000.

0A qualquer momento durante este processo, se você experimentardoença adicional, reduza a dose em 1/2 doquantidade de sua última dose. Comece aumentando as gotasnovamente quando você sentir que seu corpo é capaz de tolerar mais.Você quer encontrar a quantidade certa de gotas que vocêpode tolerar sem se sentir pior do que você jásentir.

Notas

¥ Lembre-se das Regras de Ouro do MMS (consulte as páginas83-84), especialmente aquele que diz que sempre que você vêa melhoria não muda nada; continue com o quevocê está fazendo. Embora este protocolo sugirafast-track, no entanto, se você estiver indo melhor, fique como que você está fazendo. Enquanto você estiver melhorando, permaneça na dosagem de NMS1, DSM0 e NMS2, seja qual for o pontovocê está - seja qual for a dosagem que traga melhora, mantenhaFazendo. Quando você chega a um ponto onde você não vê nenhummelhoria por um período de um ou dois dias, aumente seuingestão, passando para o próximo nível.

!> Não tome vitaminas ou suplementos durante este período. Espere até que os agentes patogênicos sejam erradicados, então você pode trabalhar na construção de sua nutrição.

Protocolo 3000

0 Você pode adicionar o protocolo 3000 logotanto quanto possível enquanto estiver tomando as doses orais mencionadas acima, a menos que você

já esteja melhorando, caso em que não é necessário ir para o Protocolo 3000.

0 Mas quando você não vê nenhuma melhora para uma um período de dois dias, adicione o Protocolo 3000 ao que você éjá está fazendo.

Protocolos de Suporte

0 Adicione qualquer um dos Protocolos de Apoio, um de cada vez, especialmente se eles forem adequados para ajudar na sua doença palicular. Por exemplo, se o problema for câncer de cólon, acrescente enemas. Se o problema for câncer de ovário, adicione duchas. Se o problema for câncer de pele, use o borrifador e assim por diante.

0 Continue com Suportando Protocolos se eles parecerem estar ajudando, mas volte sempre que eles não parecerem estar ajudando.

Inconsciente ou não consegue engolir

Não dê MMS a alguém que está inconsciente ou não consegue engolir. Istoé possível administrar MMS através deum gotejamento intravenoso. Eu não recomendo isso, ou o tubo a seguirmétodo, a menos que uma pessoa qualificada esteja supervisionandoo procedimento. Para um gotejamento IV, use um saco de 250 ml de solução salina IV ousolução de glicose. Coloque 20 gotas de MMS ativado nosolução. Regular o gotejamento para que entre no corpodurante um período de uma hora.Isso pode ser repetido várias vezes ao dia, mas outros suplementos e acréscimos aplicáveistodos os protocolos também devem ser usados.

Se a pessoa tiver um tubo de alimentação, você pode dar ao hinnMMSdoses direto através do tubo. Misture a dose apropriada de MMS1 (de acordo com o protocolo da pessoa) e despeje a dose no tubo. Isso pode ser feito de hora em hora. Siga o procedimento de

piquetagem conforme descrito acima emeste protocolo e continue com os outros protocolos conforme as instruções.

Dependendo da situação, no caso de alguém que está inconsciente ou que não consegue engolir aqui são outrosmaneiras de inserir o MMS no corpo: Protocolo 3000 (externoaplicação de DMSOe MMS1). O protocolo da bolsa éoutra opção se eles estão conscientes, mas têm um problemacom deglutição. Se usar a bolsa, certifique-se absolutamenteque a pessoa não consegue respirar o gás, pois isso pode causar danos. Dependendo das circunstâncias, também é possível fazer um banho de MMS. (Um banho de pés poderiatambém será útil se a pessoa não puder entrar na banheira.) Se você é o único que está doente, precisará de alguém para ajudá-lo, de preferência alguém que conheçainstruído sobreM M S . M a s s e p o r a l g u m m o t i v o a q u e l a p e s s o a não está disponível, contrate alguém em que você se sinta confiante para ajudarvocê e peça-lhes que leiam este livro.

Advogado do MMS: Com certeza, sou um grande defensor do MMS. Tenho sofrido intensamente sob cuidados médicos por 3 décadas e eles quase me mataram duas vezes porqueeles honestamente nãoTenho uma ideia do que fazer, então eles empurraram cerca de 15 prescrições diferentes de anG-depressivos a betabloqueadores e metadona por duas décadas, e eu perdi órgãos devido à sua imprudência e descuido. Eu teria tirado todas as licenças deles [se pudesse], todos os 80 médicos que supostamente me prestavam cuidados de saúde. Então, MMS, é muito bem a única coisa que eu tomo agora se eu pegar o mais leve resfriado, e tipo de infecção reconhecida no corpo de tosse a calafrios e calafrios à infecção de urina (com uva uva combinado) apenas como precaução extra para o urina ... é a melhor e mais

barata forma eTiciente e eletiva de tratar o seu corpo. Não vou ao médico há 2 anos! —Mel, Canadá

AUXILIA:Há alguns anos, uma mulher madura com AIDS totalmente desenvolvida foi trazida à nossa igreja para orar. Mypastor me pediu para ajudá-la. Como ela já havia se recusado a tomar o medicamento anti-retroviral por conta própria, coloquei-a no Protocolo 1000. Também dei a ela meu mini Yampoline sok-bounce. Como ela não conseguia andar sozinha, dei instruções para que seus parentes a ajudassem no Yampoline unGl que ela pudesse pular sozinha. Ela também tinha várias escrituras de cura que ela tinha que ler 8 Gmes diariamente, assim como com o uso de MMS e o Pampolim.

Duas semanas depois, uma mulher se encaixou na descrição de um estilo de instrutor de ginástica em nosso encontro de oração. Demorou um pouco para confirmar que se tratava da mesma sombra de uma mulher com AIDS totalmente desenvolvida! Ficamos pasmos: É VERDADE! MMS é o verdadeiro negócio! Eu sabia que o MMS funciona - mas não tão rápido - e tão completo. Naquele mesmo dia ela pulou no Yampoline por 1 hora e meia! Ela explicou que, embora a primeira semana tenha sido excepcionalmente desafiadora, ela perseverou esentidoenormemente melhor no início da 2ª semana ... e ela estava apenas com 2 gotas por hora! MMS é uma potência isolada e faz com que outros protocolos funcionem incrivelmente melhor! —Stephen, Trinidad / Tobago

Gripe: Se eu dissesse que existe um antiviral que você poderia preparar na sua cozinha para prevenir a gripe em um dia, você acreditaria em mim? Minha filha acordou ontem de manhã chorando com febre de 40 graus e calafrios, sem falar na náusea e na dor de cabeça. Pobre garota. Foi Gme chutar para o modo de cura para ela.

Ambos tomamos cerca de 5 doses de MMS no último dia. Vinte e quatro horas depois ela está sem febre e eu nuncaadoeceu - HP, Arizona

Capítulo 13

Ajustando doses de protocolo para crianças

Uma palavra para os pais

Neste livro, presumimos que todos os pais são totalmente responsáveis pela saúde de seus filhos. Idealmente, se você forvai dar MMS para uma criança, você deve ter o suficienteexperiência com ele para ter usado você primeiro. Leia este livro na íntegra e confira alguns dos links nono final do livro para mais informações e testemunhos.

No entanto, se houver uma emergência em relação ao seu filho, você pode apenas ter que confiar nas informações nestas páginas e seguir estas instruções, se desejar, mesmo se vocênão usou MMS.

Escrevemos este livro com extremo cuidado para torná-lo compreensível para você, mas esperamos que cada pessoa assuma total responsabilidade pelo uso dos dados. Fizemos o nosso melhor para apresentar a você as informações mais recentes disponíveis sobre MMS. Os protocolos neste livro foram ajustados como resultado do recebimento de feedback de milhares de usuários de MMS em todo o mundo.

Ao fornecer protocolos MMS para crianças, os mesmos princípios se aplicam a elas e aos adultos. Por exemplo, se um protocolorequer doses de hora em hora para um adulto, mas também requer doses de hora para hora

para uma criança. Tomar MMS de hora em hora é indelicado.

Além disso, se a criança sentir náuseas ou diarreia, reduza a dose em 50O / o (ou mais, se necessário) até que o problema desapareça e aumente novamente até a quantidade adequada indicada para o protocolo palicular em que a criança está.

A coisa que variapara crianças é o tamanho da dosagem - onúmero de gotas que você dá, ou o tamanho da cápsula. Oquantidade de MMS1 e MMS2 que você dá a uma criança é determinadaminado pelo peso da criança. A seguir estão as instruçõesções sobre como determinar a quantidade de MMS1 e MMS2 para as crianças tomarem quando estiverem em vários protocolos neste livro.

Procedimento inicial para crianças

O procedimento de piquetagem devesempre deve ser feito antes de a criança passar para o Protocolo 1000. Para obter informações sobre o procedimento de piquetagem da mulher, incluindo como medir uma fração de uma gota, consulte as páginas 80-81 e siga os detalhes fornecidos lá.

Procedimento inicial Guia de dosagem MMS1 para crianças				
Gotas por hora	Dia 1	Dia 2	Dia 3	4º dia
Bebês com menos de 7 libras (3,2 kg)	1/8 de queda	1/8 de queda	1/4 de queda	1/2 gota
Crianças de 7 a 24 libras (3,2-11 kg)	‹Queda e8	1/4 de queda	1/4 de queda	1/2 gota
Crianças 25-49libras (11-23 kg)	›E4 drop	1/4 de queda	1/2 gota	3/4 de queda
Crianças 50-74 libras (23-34 kg)	›E4 drop	1/2 gota	1/2 gota	3/4 de queda

Crianças 75-100Libra' (34-45 kg)	1/4 de queda	1/2 gota	1/2 gota	3/4 de queda

Protocolo 1000 para Crianças

O protocolo 1000 está tomando uma dose de MMS1 a cada hora durante oito horas consecutivas por dia. A dose máxima de adulto para o Protocolo 1000 é de 3 gotas de MMS1 por hora; no entanto, lembre-se, de acordo com as instruções para este protocolo informando na página 86, deve-se trabalhar até a dose de 3 gotas. Este mesmo princípio se aplica às crianças.

A regra básica para administrar crianças com MMS1 équando a criançapesaacima25lbs (11 kg), dê 1 gota de MMS1 (MMS ativado) para cada 25 lbs adicionais. No entanto, fornecemos chals para determinar dos-ing. Por favor, use esses chals. E novamente, lembre-se doregra de ouro do MMS - sempre que uma criança (ou alguém poresse assunto) fica enjoado, tem diarreia ou experimenta desconforto além do que a doença já écausando, reduza a dosagem em 50%, ou mais, se necessário,até que os sintomas diminuam e, em seguida, volte à dosagem adequada para o peso da criança. Geralmente issoseria em um a três dias.

Nunca vá além dessas quantidades de gotas por hora, conforme
o respectivo filhopeso, enquanto no Protocolo 1000.

Observação:*Por quanto*para*faça uma gota de 1/4, 1/2 ou 3/4 de dose, consulte o Procedimento inicial(páginas 80-81). Para fazer uma dose de 1-1 / 2 gota, faça uma dose de 2 gotas de NNS1 em 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. Despeje 1 onça do*

líquido (ou 1/4 da 1/2 xícara) e você terá uma dose igualQueda 1-1/2.

Protocolo 1000 MMS1 Guia de dosagem para crianças	
Peso	MMS1 quedas por hora
Bebês com peso inferior a 7 libras (3,2 kg)	1/2 gotapor hora no primeiro dia do Protocolo 1000, então trabalhe até 3/4 de queda por hora para os 21 dias restantes do protocolo.
Crianças de 7 a 24 libras (3,2 a 10 kg)	1/2 gota por hora para iniciar e trabalhar até 1 gota por hora durante os 21 dias restantes.
Crianças 25-49 lbs (11-22 kg)	Começarcom 3/4 de queda por hora e trabalhe até 1-1 / 2 gotas por hora para os 21 dias restantes.
Crianças 50-74 libras (22-33 kg)	Comece com 1 gota por hora e trabalhe até 2 gotas por hora durante os 21 dias restantes.
Crianças com 75 libras (34 kg) ou mais	Comece com 1 gota por hora e trabalhe até 3 gotas por hora durante os 21 dias restantes.

Protocolo 1000 Plus para crianças

O protocolo 1000 Plus para crianças é a mesma proporção que para uma dose de adulto ao adicionar DMSO. Ou seja, para cada 1 gota de MMS1 (MMS ativado) que você der a uma criança, adicione 3 gotas de DMSO. Certifique-se de ler atentamente a seção do Protocolo 1000 Plus, página 87, para ter certeza de que está misturando a dosecorretamente e adicionando DMSO na hora certa.

Protocolo 2000 para Crianças

O protocolo 2000 para uma criança funciona da mesma forma que o protocolo 2000 para um adulto, mas, novamente, a quantidade de MMS1 e MMS2 para uma

criança será diferente da de um adulto. Leia a seção sobre Protocolo 2000, página 89, bem como a seção sobre Detalhes de MMS2, na página 274.

Quando no Protocolo 2000, dê a uma criança tanto MMS1 quantoele / ela pode tolerar (mas não exceda o máximovalores no gráfico abaixo) sem adicionar aodoença que a doença já está causando. Isso requer muitoobservação cuidadosa da criança. Esteja pronto para reduzir a dose se houver algum sinal de náusea ou diarreia (novamente,além do que a doença já está causando). Emboravocê quer aumentar a dose de MMS1 para o que a criança podetolerar, há um ponto de parada. Nunca dê a criançamais do que os valores máximos de MMS1 listados abaixo, que são calculados de acordo com o peso da criança.Observe que a escala de peso para MMS1 é calculadadiferentemente do que no Protocolo 1000, porque as quantidades deMMS1 são significativamente maiores no Protocolo 2000.

Protocolo 2000 para Crianças Guia de dosagem máxima para MMS1	
Peso	GotasPor hora
10 libras ou menos (4,5 quilos a menos)	Não tome mais do que 3 gotas por hora.
10-20 lbs (5-9 kg)	Não tome mais do que 5 gotas por hora.
20-40 lbs (9-18 kg)	Não tome mais do que 5 gotas por hora.
40-60 lbs (18-27 kg)	Não tome mais do que 6 gotas por hora.
60-80 lbs (27-36 kg)	Não tome mais do que 7 gotas por hora.

Protocolo 2000 para Crianças - Doses MMS2

O protocolo 2000 exige a tomada de MMS2 em forma de cápsula, enquantotambém levando MMS1. Eu não sugiro dar MMS2 paracrianças com menos de 75 libras. Se a criança tiver mais de 75 libras e tiver umdoença com risco de vida que você pode querer considerar darele / ela

MMS2, especialmente se MMS1 não estiver disponível. Quão-nunca, não use MMS2 para crianças, a menos que a criançasabe como tomar cápsulas e pode ser confiável paraengula imediatamente, não deixe que se prolongue em seus

boca, não mordê-lo, mastigá-lo ou abri-lo na boca, pois não seria uma experiência agradável.Por favor, tenha cuidado.

Não dê MMS 2 a uma criança (apenas para 75 lbs [34 kg] e acima) a menos que você tenha lido e estudado completamente as instruções na seção sobre Protocolo 2000, página 89, e a seção MMS2 — Detalhes, página 274, para obter instruções sobre comopara fazer cápsulas de MMS2, e advertências sobre MMS2 eDMSO.

Protocolo 2000 para Crianças Guia de dosagem para MMS2	
Peso	Tamanho do MMS2Cápsula
Crianças com menos de 34 kg	Não use o MMS2 para crianças com menos de 75 libras.
Crianças 75-100 lbs (34-45 kg) e acima	Use uma cápsula # 3 cheia até 1/8 em primeiro, depois aumente em incrementos até uma cápsula de 3/4 cheia.

Protocolo 3000 para Crianças

Esta é uma adaptação do Protocolo 3000 original que pode ser usado para crianças. As quantidades de MMS1 e DMSO usadas aqui são as mesmas do Protocolo 3000 para adultos. No entanto, é o método de aplicação da mistura na pele de uma criança que é diferente. O método abaixo é mais conveniente. Familiarize-se com o DMSO e como usá-lo adequadamente antes de usar este protocolo. (Consulte o Capítulo 4 para obter mais detalhes sobre como lidar com DMSO.)

crianças Instruções para o protocolo 3000

para crianças Preparação

- Você precisará de três frascos de spray, de preferência frascos de 2 ou 4 onças / 60 ou 120 ml. Frascos de spray de vidro, se você puder pegá-los, são os melhores para DMSO. Se o vidro não estiver disponível, certifique-se de obter frascos de spray de plástico que sejam compatíveisc o m D M S O . P r o c u r e u m # 1 o u # 2 d e n t r o d e u m t r i â n g u l o n o f u n d o d a g a r r a f a . P o d e s e r p l á s t i c o P E T E o u H D P E . (S e v o c ê n ã o c o n s e g u i r e n c o n t r a r o f r a s c o d e s p r a y c o m p a t í v e l a d e q u a d o p a r a o D M S O , s e r i a m e l h o r n ã o b o r r i f a r o D M S O , m a s , e m v e z d i s s o , d a r t a p i n h a s n o D M S O c o m a m ã o .)

- Certifique-se de que os frascos de spray estão completamente limpos.

- Rotule claramente cada boztle para que seu conteúdo não sejaenganado.

- Prepare as garrafas limpas e secas da seguinte forma:

  Frasco # 1: Frasco spray MMS1 padrão - 10 gotas de MMS1 por onça de água (consulte a página 76).

  Garrafa 42: Encha a garrafa com DMSO. Você pode diluir um pouco com água purificada se a criança tiver pele sensível. Mas quanto mais forte o DMSO, melhor, desde que não haja nenhum problema com coceira ou queimação.

  Frasco 43: Encha um frasco de spray limpo com água purificada (engarrafada, destilada ou osmose reversa). Certifique-se de que está claramente marcado como água.

Aplicação de MMS1 / DMSO à pele

Antes de usar este protocolo, é melhor testar a criança paraqualquer possível alergia a DMSO (ver teste de alergia na página 59). Se não houver sinais de alergia, antes de iniciar este procedimento, peça à criança que lhe diga se sente formigamento, picadas ou queimaduras no minuto em que sentir.

Passo 1

Teste a pele

- ❑ Em um polion nu do braço da criança, borrife um únicospray da garrafa # 3 (garrafa de água) em uma área sobre otamanho da sua mão.

- ❑ Em seguida, pulverize um único spray com o frasco # 1 (MMS1)
  bem em cima da mesma área.

- ❑ Pulverize imediatamente um único spray com o frasco # 2(DMSO), bem em cima da mesma área.

- ❑ Em seguida, pegue sua mão e esfregue suavemente os ingredientes em movimentos circulares.

- ❑ Aguarde cerca de cinco minutos para ver se haverá algumardor, ardor ou coceira. Se houver algum desses,borrife um pouco mais de água na área e esfreguesuavemente.

- ❑ Se o teste não causar nenhuma queimadura, ardência ou
  coceira, vá para a Etapa 2.

- Se qualquer ardor, picada ou coceira persistir, enxágue bem a área de teste, adicione até 20º/ o água pura para o frasco de spray DMSO e repita o teste em um novoárea da pele.

0 Se ocorrer irritação pela segunda vez, dilua o DMSO fulher. Continue repetindo esse processo até que não haja irritação na pele.

Passo 2

Aplicando MMS1 e DMSO

0 Pulverize um jato de água muito leve em um dos braços da criança na parte de cima. Com a mão espalhe suavemente a água para umedecer a área. Não use muita água, mas apenas o suficiente para umedecer a pele.

0 Depois de aplicar a água, pulverize MMS1 na mesma área na parte superior do braço e, em seguida, pulverize DMSO emtopo disso. Espalhe suavemente a mistura sobre a áreacom a mão nua. (Não use luvas de borracha ou látex.)

0 Se a pele onde aplicou o spray parecer muito seca, pode adicionar um spray adicional de MMS1 e DMSO e, novamente, esfregar suavemente.

0 Depois de espalhar a mistura, deixe-a secar no braço se não houver irritação. Deixe na pele por várias horas antes de lavar.

etapa 3

0 Em umhora repita esses mesmos passos no outro braço.

Passo 4

0 Continue com essas etapas de hora em hora, cobrindo uma área diferente do corpo a cada vez. Vá para uma

perna, e depois para a outra perna, e então se tudo estiver bem vá para a

de volta, e então o estômago. Seja gentil e use bastante água se necessário para evitar dor, coceira ou queimação.

Precauções de segurança

Quero enfatizar o seguinte, especialmente ao usar este procedimento para crianças, para garantir que haja absolutamentenenhum dano causado à criança:

- Se a mistura MMS1 / DMSO queimar ou irritar a pele, isso indica que o DMSO é muito forte (vários tipos de pele podem lidar com diferentes intensidades de DMSO).

- Se sua garrafa de DMSO for muito forte, continue diluindo-a com água destilada ou purificada, até um total de 50^{O}/ o regar até que não haja nenhum problema com queimação ou dor.

- Se ocorrer irritação, pulverizeem um pouco mais de água rapidamente até que a criança diga que não há mais cabana.

- Em caso de queima, enxágue o DMSO oP com lotesde água pura (não use água da torneira para enxaguar a pele; neste caso, água purificada é melhor). Não useensaboar até enxaguar bem a área, comoO DMSO pode transportar pequenas quantidades de sabão para opele.

- Enxágue bem as mãos com água purificada aler aplicando o MMS1 e o DMSO.

Protocolo6 e 6 para crianças

Os protocolos 6 e 6 consistem em duas doses de 6 gotas de MMS1 tomadas separadamente, uma hora

apal. Este protocolo é particularmente eletivo para resfriados, gripes, dores, alergias e outras enfermidades que parecem estar apenas afirmando. É útil para uma ampla variedade de coisas. Veja a página 169 para mais detalhes e

instruções completas sobre os protocolos 6 e 6; no entanto, ajuste a dosagem para crianças de acordo com o cálculo abaixo.

Protocolo 6 e 6 para crianças	
Peso	MMS1 quedas por hora
Bebês de 12 libras (5,5 kg) e menos	1 e 1 gota de dose
Crianças 12-24 lbs (5,5-11 kg)	2 e 2 gotas de dose
Crianças 25-49 libras (11-23 kg)	3 e 3 gotas de dose
Crianças 50-74 libras (23-34 kg)	4 e 4 gotas de dose
Crianças 75-100lbs (34-45 kg)	5 e 5 gotas de dose
Pessoas com 100 libras ou mais. (45 kg e acima)	6 e 6 gotas de dose

Protocolo de patch MMSI / DMSO para bebês, crianças e pessoas com pele sensível

Por favor, leia e tenha um bom entendimento das instruções para o protocolo de patch MMS1 / DMSO padrão na página 135. Este é basicamente o mesmo procedimento, mas oquantidades de gotas / água MMS1 e o tempo para aplicar-o patch é ajustado para acomodar bebês, criançase pessoas com pele sensível.

0 Stat com 5 gotas de MMS1 (MMS ativado), adicione 5 gotas de DMSO e 10 gotas adicionais de água para diluir a solução.

0Para a primeira aplicação, não aplique o patch paramais de cinco minutos.

0Quando o adesivo for removido, observe se há irritação. Se não houver irritação após cinco minutos com o primeiro adesivo, em duas horas

aplique outro adesivo. Desta vez, você pode deixá-lo ligado por 15 minutos.

0 Se não houver irritação ou queimadura na pele na aplicação de 15 minutos seguinte, não há problema em continuar com essas aplicações.

0 Se a qualquer momento láse houver irritação ou queimação na pele, dobre a quantidade adicional de água além da que foi usada na última aplicação.

Dose de manutenção diária MMS1 para crianças

As crianças, via de regra, estão expostas a uma grande variedade de toxinasao longo do dia; brincam no chão ou no di1, colocam as mãos na boca, etc. Esta é uma das muitas razões pelas quais uma dose de manutenção diária de MMS1 pode ser prejudicial para o seu filho. Para obter detalhes completos sobre a dose de manutenção MMS1 (para adultos e crianças), consultepáginas 200-201.

Criança Livre de Doenças Freqüentes: Meu filho (4 anos) suf-com asma e outros problemas brônquicos crônicos,adoecer em média a cada duas semanas por mais de duasanos. Desde que descobriu o MMS, ele não só está livre deproblemas respiratórios, mas quando outras coisas estão "indopor aí ”ele permanece saudável graças a um principal MMS1 diáriodose de manutenção. —Veronica, México

Como ajustar o suporteProtocolos e protocolos adicionais para crianças

Os seguintes chalsexplique como ajustar todos os outros protocolos para crianças.

Bebês12 lbs (5,5 kg) e menos	
Protocol o	Dosage m
Tratamento de bolsa	Não use.
Banheiras e pedilúvios	Use 1/4 do número de gotas da dose de adulto —página 143.
Mordida de Viúva Negra	Igual aos adultos - página 217.
Mordida de aranha marrom reclusa	Igual aos adultos - página 213.
Queimaduras	Igual aos adultos - página 245.
Enema	Use 1/4 do número de gotas da dose de adulto —página 148.
Olhos / orelhas / nariz	Use 1/8 gota de MMS1 por onça de água destilada para os olhos; e 1/4 de gota por onça de água destilada para as orelhas e nariz - página 136.
Intoxicação alimentar	Use 1/4 do número de gotas da dose de adulto —página 223.
Molde / Fungo	Use doses de argila de 1/8 colher de chá / ajuste MMS1 para o peso — página 99.
Ataques cardíacos	Use 1/8 das gotas e 1/8 do DMSO que um adulto usaria. Faça também o 6 e o 6, mas para crianças com esse peso, que na verdade é 1 e 1 - página 236.
Erva indiana	Não use.
Boca e dentes	Use 1 gota de MMS1 por onça de água - página 73.
Protocolo 4000	Não use para bebês.
Garrafa de spray	Use 3 gotas de MMS1 por onça de água - página 76.

Strokes	Use 1/8 da quantidade de DMSO e faça 6 e 6 (mas para bebês, veja a dosagem acima, na verdade seria 1 e 1) e siga todas as instruções na página 227.

Crianças 12-24 lbs (5,5-11 kg)	
Protocolo	Dosagem
Tratamento de bolsa	Não use.
Banheiras e pedilúvios	Use 1/4 do número de gotas da dose de adulto —página 143.
Mordida de Viúva Negra	Igual aos adultos - página 217.
Mordida de aranha marrom reclusa	Igual aos adultos - página 213.
Queimaduras	Igual aos adultos - página 245.
Enema	Use 1/4 do número de gotas da dose de adulto —página 148.
Olhos / orelhas / nariz	Use 1/8 gota de MMS1 por onça de água destilada para os olhos e 1/2 gota de MMS1 por onça de água destilada para orelhas e nariz —Página 136.
Intoxicação alimentar	Use 1/4 do número de gotas da dose de adulto —página 223.
Molde / Fungo	Use doses de argila de 1/4 colher de chá / ajuste MMS1 para o peso — página 99.
Ataques cardíacos	Use 1/8 das gotas e 1/8 do DMSO que um adulto usaria. Também faça o 6 e 6, mas para crianças com este peso, que na verdade é 2 e 2 —Página 236.
Erva indiana	Não use.
Boca e dentes	Use 1 gota de MMS1 por onça de água - página 73.
Protocolo 4000	Não use para uma criança com este peso.
Garrafa de spray	Use 3 gotas de MMS1 por onça de água - página 76.
Strokes	Use 1/8 das gotas e 1/8 do DMSO que um adulto usaria. Também faça o Protocolo 6 e 6, mas para crianças com este peso seria 2 e 2 —Página 227.

Crianças 25-49 libras (11-23 kg)	
Protocolo	Dosagem
Tratamento de bolsa	Não use.
Banheiras e pedilúvios	Use 1/4 do número de gotas da dose de adulto —página 143.
Mordida de Viúva Negra	Igual aos adultos - página 217.
Mordida de aranha marrom reclusa	Igual aos adultos - página 213.
Queimaduras	Igual aos adultos - página 245.
Enema	Use 1/4 do número de gotas da dose de adulto —página 148.
Olhos / orelhas / nariz	Use 1/4 gota de MMS1 em cada onça de água para os olhos e 1/2 gota de MMS1 por onça de água para orelhas e nariz - página 136.
Intoxicação alimentar	Use 1/4 do número de gotas da dose de adulto —página 223.
Molde / Fungo	Use 1/2 colher de chá de doses de argila / ajuste o MMS1 para o peso - página 99.
Ataques cardíacos	Use 1/4 das gotas e 1/4 do DMSO que um adulto usaria. Faça também os Protocolos 6 e 6, mas para crianças com esse peso é na verdade 3 e 3 - página 236.
Erva indiana	Não use.
Boca e dentes	Use 1 gota de MMS1 por onça de água - página 73.
Protocolo 4000	Não use para uma criança com este peso.
Garrafa de spray	Use 5 gotas de MMS1 por onça de água - página 76.

Strokes	Use 1/4 das gotas e 1/4 do DMSO que um adulto usaria. Faça também os Protocolos 6 e 6, mas para crianças desse tamanho é na verdade 3 e 3 - página 227.

Crianças 50-74 libras (23-34 kg)	
Protocolo	Dosagem
Tratamento de bolsa	Use 1/2 do número de gotas que um adulto usaria - página 156.
Banheiras e pedilúvios	Use 1/2 número de gotas da dose de adulto - página 143.
Mordida de Viúva Negra	Igual aos adultos - página 217.
Mordida de aranha marrom reclusa	Igual aos adultos - página 213.
Queimaduras	Igual aos adultos - página 245.
Enema	Use 1/2 número de gotas da dose de adulto - página 148.
Olhos / orelhas / nariz	Use 1/4 gota de MMS1 em cada onça de água para os olhos e 1/2 gota de MMS1 por onça de água para orelhas e nariz - página 136.
Intoxicação alimentar	Use 3/4 do número de gotas da dose de adulto —página 223.
Molde / Fungo	Use 3/4 colher de chá de doses de argila / ajuste MMS1 para o peso — página 99.
Ataques cardíacos	Use 1/2 gotas e 1/2 DMSO que um adulto usaria. Faça também os Protocolos 6 e 6, mas para crianças com esse peso é na verdade 4 e 4, consulte a página 236.
Erva indiana	Siga as instruções que vêm com a erva indiana — página 165.
Boca e dentes	Use 2 gotas de MMS1 por onça de água - página 73.
Protocolo 4000	Não use para uma criança com este peso.
Garrafa de spray	Use 10 gotas de MMS1 por onça de água - página 76.

Strokes	Use 1/2 gotas e 1/2 DMSO que um adulto usaria. Faça também os Protocolos 6 e 6, mas para crianças com esse peso é na verdade 4 e 4 - página 227.

Crianças 75-100 lbs (34-45 kg) e acima	
Protocolo	Dosagem
Tratamento de bolsa	Use 1/2 do número de gotas que um adulto usaria - página 156.
Banheiras e pedilúvios	Use o mesmo número de gotas que um adulto usaria - página 143.
Mordida de Viúva Negra	Igual aos adultos - página 217.
Mordida de aranha marrom reclusa	Igual aos adultos - página 213.
Queimaduras	Igual aos adultos - página 245.
Enema	Use o mesmo número de gotas que um adulto usaria - página 148.
Olhos / orelhas / nariz	Use 1/4 gota de MMS1 por onça de água para os olhos e 1 gota de MMS1 por onça de água para orelhas e nariz - página 136.
Intoxicação alimentar	Igual aos adultos - página 223.
Molde / Fungo	Use 1 colher de chá de doses de argila / ajusteMMS1 para peso - página 99.
Ataques cardíacos	Use MMS1 e DMSO da mesma forma que adultos. Faça também os Protocolos 6 e 6, mas para crianças com esse peso é na verdade 5 e 5 - página 236.
Erva indiana	Siga as instruções que vêm com a erva indiana. - página 165.
Boca e dentes	Use 2,5 gotas de MMS1 por onça de água - página 73.
Protocolo 4000	Use uma cápsula de tamanho 4 cheia até 1/4 no início e depois aumente até 3/4 da cápsula cheia em dois dias e depois - página 171.
Garrafa de spray	Use 10 gotas de MMS1 por onça de água - página 76.
Strokes	Use o mesmo MMS1 e DMSO que os adultos. Faça também os Protocolos 6 e 6, mas para crianças com esse peso é na

	verdade 5 e 5 - página 227.

Fístula anal: Estou esperando ... dizer que você salvou meu irmão. Este ano, em maio, meu irmão sofreu de fístula anal pela quarta vez. Ele sofre de fístula anal desde 2001. A quarta vez foi este ano em maio e ele estava muito doente, não conseguia andar, suas pernas doíam, seus pés doíam e ele estava muito preocupado, ele disse que nunca se sentiu tão mal em toda a sua vida. Comecei a aquecê-lo com o protocolo 1000, ou seja, 3 gotas acGvadas de MMS a cada hora e preparei um borrifador com 40 gotas ativadas de MMS para borrifar na área afetada continuamente toda vez que secasse. Añer tomando MMS por um dia, suas pernas e pés começaram a se sentir melhor e ele conseguia ficar em pé e andar devagar. No terceiro dia, ele não sentiu nenhuma dor e todos ficamos felizes com isso. No quarto dia, ele foi às compras com sua esposa. Ele estava realmente bem. No quinto dia ele voltou ao trabalho, disse que se sentia mais forte do que nunca, cheio de energia. Assim como eu, ele agora está tomando 6 gotas de MMS ativado todos os dias para manutenção. Ele me disse que agora estava fazendo coisas que não podia fazer antes porque suas costas doíam enquanto ele se movia ou gostava de objetos ao redor. Agora ele é uma pessoa saudável. —Vincent, Itália

Diabetes: Trouxe meu amigo com diabetes e o fiz a cada hora por cinco ou seis horas porque o açúcar no sangue deleestava perto de 500. Seu açúcar no sangue desceu para 91 nessas horas. FACTO! —CP Estados Unidos

Capítulo 14

Informações adicionais importantes

Biofilmes

Um biofilme é uma camada fina e resistente de microorganismos que se formam e revestem as superfícies úmidas. Eles são colônias bem organizadas de bactérias agrupadas para formar micro-colônias. Os biofilmes podem ser formados por uma única espécie bacteriana, mas os biofilmes geralmente consistem em muitas espécies de bactérias, bem como fungos, algas, protozoários, detritos e produtos de corrosão. Essencialmente, um biofilme pode se formar em qualquer superfície exposta a bactérias e alguma quantidade de água. Na indústria, os biofilmes se formam em muitos lugares, como em tubulações de água, tanques de água e torres de resfriamento. Biofilmes também podem se formar dentro ou sobre o corpo humano e, portanto, são responsáveis por muitas doenças.

Quandoessas colônias de bactérias se agrupam, secretam um muco especial que as une em uma mistura semelhante a um filme. Quando isso acontece, outros patógenos podem se esconder neles e embaixo deles. Biofilmes podem fazera cura no corpo é mais difícil ou impossível.Eles são altamente resistentes aos antibióticos. Os medicamentos parecem ter pouco ou nenhum efeito sobre eles. No entanto, MMSpode superar o biofilme, tanto dentro como fora do corpo.

Se você tem tomado MMS e está melhorando, mas a um ritmo muito lento, pode ser uma indicação de que você tem

biofilme em algum lugar do seu sistema. A resposta é simplesmente continuar com o protocolo até que esteja se sentindo bem. Isso pode durar de alguns dias a algumas semanas e, em alguns casos, alguns meses, antes que o biofilme seja totalmente morto. Continue assim até se sentir bem.

Se você está recebendo MMS sem problemas, e todos osde repente, na mesma dosagem, você experimenta um significativoReação de Herxhiemer, você provavelmente quebrou um biofilme. A morte dos patógenos atinge você em uma grande explosão, o que causa uma reação Herxheimer. O boma novidade é que você será capaz de se livrar das toxinas quetêm causado problemas e seu corpo pode se curar.

Biofilmes na parte externa do corpo normalmente só acontecem em feridas ou feridas onde há umidade contínua.Quando estão presentes na ferida ou ferida, costumam fazer com que a cicatrização demore muito mais ou impedem a cicatrizaçãocompletamente. Para isso, sugiro usar o spray MMS1garrafa conforme indicado nas páginas 76. Em situações onde obiofilme parece ser resistente ao spray de força normalgarrafa de 10 gotas deMMS1 por 1 onça (30 ml) de água,em outras palavras, a ferida ou ferida não está cicatrizando, eu sugirovocê aumenta a quantidade de gotas no frasco de spray. Primeiroexperimente colocar 20 gotas de MMS1 por 1 onça (30 ml) de água na garrafa. Se você ainda não vê bons resultados com20 gotas por onça, aumente as gotasno spraygarrafa em incrementos. Você pode ir até 50 gotas MMS1 por onça (30 ml) de água, se achar necessário.

MMS2Ðetails

MMS2, hipoclorito de cálcio, às vezes é conhecido como PoolChoque. É vendido em lojas de piscinas e supermercados em todo o mundo. Contanto que seja

para piscinas, os fabricantes não podem colocar coisas ruins nas piscinas que afetariam os nadadores e, portanto, não podem colocar coisas prejudiciais

no hipoclorito de cálcio. O pacote vai dizer que concontém de 45% a 85% de cloro disponível.Isso não é verdade. Contanto que você tenha hipoclorito de cálciorito (não hipoclorito de sódio, que produz clo-rina) não há cloro disponível. Quando o cálcioo hipoclorito é dissolvido em água e se transforma em hipoclorito.ácido roso (HOCI) e alinão há cloro disponível.HOCI é o mesmo ácido que seu corponaturalmentegera para matar doenças e destruir venenos. Quando você toma MMS2, você está dando ao seu corpo mais de sua própria munição contra doenças. Os microorganismos em uma piscina são mortos pelo hipoclorito de cálcio que é transformado em HOCI. Os fabricantes apenas dizem que há "cloro disponível" para fazer o hipoclorito de cálcio ser vendido, já que muitos no mundo ainda pensam que o cloro é um produto seguro e eletivo para matar microorganismos - e é um erro comum confundir esses termos. O cloro, que é o hipoclorito de sódio, mata os microorganismos, mas também é prejudicial ao corpo humano. O hipoclorito de cálcio, que quando adicionado à água produz ácido hipocloroso, também mata os microorganismos, mas não é prejudicial ao corpo humano e não contém o"cloro" químico.

Instruções

Passo 1

0 Compre hipoclorito de cálcio de fornecedores de MMS em:http://waterpurificationsuppliers.is/- Também está disponívelde lojas de piscina, mercearias e às vezeslojas de despalamento.

Passo 2

0 Compre algumas cápsulas de gel ou vegetais vazias, tamanho # 1 ou # 0. Se você não conseguir encontrar estes, compre um regular

frasco de algum tipo de cápsula de vitamina em um desses mesmos tamanhos. Esvazie as cápsulas puxando-as para cima. (É melhor comprar cápsulas claras / transparentes. Algumas cápsulas vêm em cores, e a cor (tintura) podeàs vezes pode ser prejudicial.)

etapa 3

0 Pa1ialmente encher as cápsulas com o hipoclorito de cálciogrânulos. Não tente moer os grânulos mais finos. Basta usar os grânulos como estão. Permita que eles caiam livrementenas cápsulas sem embalá-las. Semprestal baixo na quantidade que você adiciona à sua cápsula e aumente suas doses gradualmente. Quando as cápsulas sãopuxado apal, um lado é sempre maior do que o outro lado. Preencha o lado maior. Em seguida, coloque o lado menorecertifique-se de empurrá-lo com segurança no lugar.

0 Para cápsulas de tamanho # 1, termine enchendo uma cápsula 1/8 da sua capacidade.Em seguida, aumente a quantidade lentamenteao longo de vários dias, até chegar a uma cápsula # 1 de tamanho real.

0 Para cápsulas de tamanho # 0, preencha uma cápsula 1/16 cheia. Aumente a quantidade lentamente ao longo de vários dias. Nãoencher uma cápsula de tamanho # 0 com mais de 3/4.

Passo 4

0sempre tomar cápsulas de MMS2 duas horas apal.

0 Beba sempre a primeira cápsula de MMS2 com 1 cheiacopo (8 onças / 240 ml) de água. Depois disso, beba pelo menos 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água, mas beba mais se precisar.

0 Quando você começar a tomar essas cápsulas, continue tomando uma cápsula na dose mais baixa. Duas horas depois, tome outra cápsula também na dose mais baixa.

- Então, duas horas depois, na terceira cápsula aumente um pouco a quantidade de MMS2 na cápsula e tome. Duas horas depois, tome a cápsula de foulh com o mesmoquantidade de MMS2 que você colocou na terceira cápsula.

- Se não houver problemas ao tomar essas 4 cápsulas, continue aumentando a quantidade de MMS2 em suas cápsulas até atingir o tamanho máximo da dose. Fique com isso como sua dose padrão de MMS2 durante o tempo em que estiver tomando MMS2. Em caso de náusea ou diarreia, reduzir a quantidade de hipoclorito de cálcio em cada cápsula em 50%. Quando esses sintomas diminuírem, aumente lentamente a quantidade para as doses sugeridasdado anteriormente.



Notas

b Se, a qualquer momento enquanto aumenta a quantidade de MMS2 nestas cápsulas, você sentir sinais de uma reação Herxheimer chegando, baixe na velocidade em que aumenta a quantidade de pó na cápsula. Não é uma corrida. Se você não pode aumentar para a dose máxima, mantenha o tamanho da dose com a qual você se sente confortável. Siga os trêsRegras de ouro.

bSe você comprou as cápsulas de NNS2 já preparadas, pode ser

necessário abrir as cápsulas e esvaziar um pouco do pó para seguir as instruções acimações.

¥Estas são as diretrizes gerais para fazer cápsulas de NNS2. Consulte o Protocolo 2000 ou Protocolo 4000 para obter instruções específicas sobre a dosagem com NMS2.

X XI é importante nunca tomar uma dose contendo um*Cápsula MME2 e DMEO ao mesmo tempo. Consulte as páginas 23-24 para obter o aviso completo sobre isso.*

Teste para ver se os líquidos são compatíveis com MMS1

Sempre que usamos um líquido diferente de água para fazer nossoDose de MMS1, precisamos saberque o líquido nãocancelar a ePetividade do MMS1. Isso significa que olíquido é compatível com MMS1. Se o MMS1 for destruídoou quase destruídopelo líquido, então dizemos o líquidonão é compatível*com MMS1.* Você pode determinar se um líquidoé compatível com MMS1, medindo os amigos pormilhões de MMS1 no líquido. Isso deve ser feito tantoimediatamente após fazer uma dose de MMS1 e novamente após uma hora medindo a mesma dose. Se a força tivernão se deteriorou além de uma quantidade de celain em uma hora, nósposso dizer que o líquido é compatível com MMS1.

Amigos por milhão é uma forma de expressar muito diluídoconcentrações de substâncias. Assim como*por cento*significa em cem, então*partes por milhão,*ouppm, significa de um milhão. Amigos por milhão geralmente descreve a concentraçãoção de algo na água ou líquido. Então, se você tiver 25ppm de MMS1 em meio copo (4 onças / 120 ml) de água, isso significa que se meio copo de água fosse dividido em ummilhões de amigos, apenas 25 desses milhões de amigos seriam MMS1.

O ingrediente ativo no MMS1 é o dióxido de cloro. Lásão tiras de teste fabricadas pela LaMotte Company que podemos usar para determinar a concentração (ppm) de dióxido de cloro em uma dose de MMS1. As tiras

são mergulhados na solução e a cor que a tira muda nos diz quantos amigos por milhão (ppm) de dióxido de cloro estão na solução. Se você quiser usar um líquido diferente de água para a sua dose de MMS1, mas não tiver certeza se isso cancelará a ePetividade de MMS1, siga as instruções abaixo para testar a compatibilidade.

Leitura das tiras de teste de dióxido de cloro de alta gama LaMottede 0 a 500 ppm. As instruções no frasco podem confundi-lo um pouco, pois apenas menciona em um lugar que a tira é para fins de teste de ppm. Em qualquer caso, siga as instruções do frasco. Certifique-se de fazer o teste onde houver bastante luz (não com pouca luz), para que você possa avaliar as cores com precisão.

Instruções

Passo 1

0 Meça 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de qualquer líquidoque você deseja testar para ver se pode usar aquele líquido para tomar uma dose de MMS1. Todos os chás, sucos, refrigerantese outros líquidos além dos mencionadosneste livro como compatível com MMS1, deve ser testado.

0Misture uma dose de 3 gotas de MMS1 e despeje nas 4 onças / 120 ml de líquido que você acabou de preparar.Mexa bem para distribuir uniformemente o dióxido de cloro nolíquido.

Passo 2

0 Remova uma única tira de teste do recipiente LaMottee mergulhe-o nas 4 onças de líquido contendo sua dose de 3 gotas devidamente preparada. (Não mova a tira enquanto estiver no líquido.)

0 Conte dois segundos usando o “um mil, doismétodo de mil ”e, em seguida, remova a tira dealíquido. (Não sacuda nenhum líquido da tiraao retirá-lo.) Faça uma contagem semelhante até dez e, em seguida, verifique a cor na tira com o giz de cores na lateral do recipiente LaMotte. Quando você usa 3MMS1 gotas em 4 onças / 120 ml de líquido, seu númeroconforme indicado pela cor na tira, deve serentre 25 e 50.

etapa 3

0 Cubra e reserve o seu líquido (fora da luz) com as 3 gotas de MMS1 e espere uma hora.

Passo 4

0 Após uma hora, faça o mesmo teste novamente com o mesmo líquido, mas com uma nova tira de teste. O número indicado pela cor na tira em comparação com o giz de cores novamente deve estar entre 25 e 50 e, se estiver, seu líquido é compatível com MMS1.

0 Se a leitura na tira cair após uma hora,isso significa que em uma hora o MMS no líquido perdeu alguma potência. Se não baixou muito, (otira não deve ler menos do que cerca de 20 quandoem comparação com a cor chal), você ainda pode usar esse tipo de líquido fornecendo toda vez que você bebe sua dose,você toma imediatamente depois de colocar o MMS1. (Como regra, você deve sempre tomar a sua dose de MMS1dentro de um minuto misturando tudo.)

Notas

¥ É importante manter a tampa das tiras de teste sempre que não estiverem em uso. Isso manterá a umidade do lado de fora, o que pode afetar as leituras.

¥ Você pode cortar as tiras no sentido do comprimento para obter 100 tiras em vez de E0.

!> Ao tocar ou manusear as tiras, certifique-se de não tocar na almofada da tira com o dedo, ou suas leituras podem não ser precisas.

As tiras de teste de dióxido de cloro de alta gama (código # 3002) fabricadas pela LaMotte estão disponíveis no mercado com duas etiquetas diferentes, embora ambas sejam do mesmo produto. (Em qualquer caso, certifique-se de verificar o número do código.) Ambas as etiquetas mostram o mesmo giz de medição na parte externa do recipiente.

onível no mercado com dois rótulos diferentes, embora ambos sejam o mesmo produto. Ambos os rótulos m

High Range Chlorine Dioxide
0 10 25 50 100 250 500
Using a cup-size sample,
immerse strip for 2 seconds.
• Keep wet fingers
out of the bottle.

Disponível na Internet em:

XLaMotte

Companhia:http://www.lamotte.com/en/

browse/3002.html

(Vá para esta página da web, escolha o distribuidor mais próximo de você e verifique com eles se eles carregam as tiras de teste.)

¥ • Também disponível em:

http://waterpurificationsuppliers.com/
DO
https://www.amazon.com(Procure por LaMotte 3002.)

Alívio da dor

Dor no corpo pode ser pormuitas razões variadas. Às vezes, é devido ao acúmulo de toxinas armazenadas nas articulações. O MMS provou eliminar a dor em um número significativo de casos. Embora pareça bom demais para ser verdade, temos muitos repols de pessoas que sofreram de dor por muitos anos e encontraram alívio com duas doses simples de MMS (Protocolo 6 e 6). No entanto, existem outras dores nas costas, na cabeça, no pescoço e nas articulações do corpo que geralmente são causadas pelos músculos puxando uns contra os outros. Isso pode causar dor extrema. Nesse caso, o MMS pode não aliviar a dor e sugiro que você dê uma olhada em um livro chamado Pain Free de Pete Egoscue. Pete tem mais de 30 clínicas em todo o mundo e seu método tem ajudado milhares de pessoas a aliviar a dor não causada diretamente por doenças.

Dor no pescoço, costas, mãos, joelhos e outras articulações podemcausar problemas tremendos. Quando os músculos se contraemum contra o outro, eles podem fazer com que a calilagemdesaparecer de suas articulações. Os médicos dirão que não pode ser reparado. Eu imploro para mergulhar. O livro Pain Freemostra exercícios simples, que eu chamo de "relax-a-cisers". Com essas posições de exercícios simples (mas possivelmente estranhas para o iniciante), você relaxa seus músculos ao pontoque eles se afastam um do outro. Eles ficam des-preso e, portanto, esta ação alivia a dor que você estáexperimentando.

Foi repelido que milhões de pessoas evitaram operações e substituição de articulações simplesmente seguindo os exercícios ensinados por Pete Egoscue em suas clínicas e livros. Se você tem dores desse tipo, demorará muito para obter essas informações e seguir os procedimentos. Normalmente a dor desaparece em algumas semanas ou menos.

Parasitas

Há um velho ditado que parece ser verdadeiro na maioria das vezes, que é: “precisamos ter equilíbrio em todas as coisas”. O fato de alguém ter descoberto alguns parasitas em seu corpo não é motivo para pular direto para tratamentos agressivos e venenosos para expulsar todos eles. Deixe-me explicar.

Primeiro, eu quero apontarque isso não pretende ser totalmente abrangente sobre o tema dos parasitas. Este é um assunto vasto e pode haver uma grande variedade de razões pelas quais os parasitas podem causar problemas no homemcorpo. Esta informação é motivo de reflexão, bem comoalgumas dicas sobre onde ficar travado ao tentar se livrar(ou reduzir) o corpo de parasitas indesejados.

Existem muitostipos de parasitas, e algumas pessoas podem se surpreender ao descobrir que nem todos os parasitas são ruins, e expulsá-los do corpo nem sempre é a melhor coisa a fazer. Existem alguns livros disponíveis hoje apontando que o corpo humano precisa de parasitas. Os parasitas nem sempre vêm de comer a coisa errada, de caminhar pela floresta, ou pela grama, ou caminhar descalço à beira-mar. Parasitas aparecem em vários amigos do corpo quando necessário devido a uma condição ruim existente. Os parasitas não comem carne ou tecidos saudáveis. Eles comem tecidos apodrecidos e

moribundos e outros microorganismos que podem estar mortos. Normalmente, eles

não estão lá para tapar a área, mas sim para limpar a bagunça. Freqüentemente, são uma das últimas defesas do corpo contra um problema grave que o está afetando.

Muitos parasitas são simbióticos. (Interação entre doisorganismos diferentes vivendo em estreita associação física,normalmente para a vantagem de ambos.) Os parasitas muitas vezes vêm de dentro de nossos corpos e, como mencionei acima, nãosempre de fora do corpo. Nós nos livramos deles restaurando a saúde do corpo, não usando vários venenospara matá-los. Venenos para parasitas também são venenos para nóse eles causam muitos danos aos nossos corpos. É mais ou menos como usar quimioterapia. Medi- alopáticocine defende venenos muito prejudiciais para tentar matar o câncerantes que o câncer mate o corpo. Pelo menos esse é oteoria, e usar venenos para matar parasitas é semelhante. euacredito que primeiro usando MMS1 para matar os patógenos e removero p e s a d o m e t a i s e t o x i n a s q u e c a u s a m d o e n ç a s é o melhor caminho a percorrer. MMS1 é capaz de corrigir a causada doença e então o corpo pode se reparar e para-os sites também podem ser expulsos no processo. Faça o melhor que puder com o MMS1 e, em seguida, considere o queé necessário fulher lidar com os parasitas, se necessário.

O primeiro passo seria seguir os protocolos deste livro. Esses protocolos superaram milhares decondições.Estabeleça no início do procedimento de piquetagem e siga conforme indicado pelo Plano de recuperação da saúde. Depois que seu corpo estiver curado, os parasitas - não tendo carne morta ou toxinas para se alimentar - morrerão, então o corpo pode expelir vermes e parasitas naturalmente pelos intestinos, se estiverem funcionando adequadamente.

Agora, depois de dizer tudo isso, lembre-se do que eu disse sobre o equilíbrio. Às vezes, uma pessoa pode ter muitos parasitas. Não estou dizendo que nunca há necessidade de expulsá-los. Existem muitas razões, muitas para citar aqui, pelas quais os parasitas podem sair do controle. Mas brevemente, como eu

disse, muitos parasitas são simbióticos - muitos vêm de dentro de nosso corpo, mas não todos. Não há dúvida de que alguns entram no corpo por meio de nossos alimentos e por outras vias. Felizmente, a natureza forneceu meios para lidar com essas coisas, se tudo estiver funcionando corretamente no corpo. Quando o ácido do estômago é normal, por exemplo, isso destrói a maioria dos parasitas e / ou ovos de parasitas que entram no corpo através dos alimentos. Os movimentos intestinais regulares também mantêm as coisas em movimento e a larva do parasita passa antes que tenha a chance de se prender ao cólon e eclodir. Quando alguém fica com prisão de ventre drasticamente e as coisas sofrem um retrocesso, é outra história. Alguns sugerem que uma dieta altamente nutritiva manterá os parasitas afastados. Portanto, há muitos porquês e motivos pelos quais algumas pessoas têm uma grande quantidade de parasitas e outras não.

Em qualquer caso, se os parasitas ficarem muito desequilibrados,grandes quantidades de parasitasd e v e s e r e n d e r e ç a d o d i r e t a m e n t e . S e u m a p e s s o a c u r o u s e u c o r p o d e d o e n ç a s o u c o n d i ç õ e s que trouxe parasitas para limpar as coisas, mas umo desequilíbrio dos parasitas persiste, então tomamos medidas extras paralivrar o corpo de parasitas é necessário. Eu sugiro maismaneiras naturais de fazer isso, em vez de usardrogas farmacêuticas.

A maioria das lojas de alimentos saudáveis tem vários remédios naturais para matar ou equilibrar os parasitas no corpo. Da mesma forma, existem muitas ervas e alimentos na natureza que cumprem esse propósito se ingeridos corretamente. Alguns pesquisadores demonstraram que os parasitas são particularmente vulneráveis a uma variedade de ervas que só são letais para eles. Investigue e descubra o que é comum em seu país e localidade.

Procure o Dr. Hulda Clark's*Purificação de ervas parasitas para iniciantes*na internet:

http://www.drclark.net/cleanses/beginners/herbal-parasite-cleanse / parasite-chat-for-adulto

Além disso, há quem use frequências elétricas para matar parasitas e isso às vezes é benéfico sem abalar o corpo. Eu acredito que a corrente elétrica fre-máquinas de freqüência funcionam bem, mas em milhares de casos eupessoalmente não encontrei muitosg e n t e q u e r e a l m e n t e p r e c i s a v a d e s t r u i r s e u s p a r a s i t a s c o m a f r e q u ê n c i a e l é t r i c a máquina. Mas, no caso de ser necessário, eurecomendo a máquina de zapper eletrônico de Pavel. Para infor-mação vá para:

www.ravozapper.com

Devo também mencionar que a máquina de Pavel pode ser ajustadaed para matar patógenos que causam uma grande variedade de doençassão diferentes de parasitas, restaurando assim a saúde assim comoMMS.

A natureza fornece muitas coisas dentro do corpo que não aprendemos a usar. A ciência moderna, para a maioria dos amigos, não tentou aprender essas coisas. Quando um corpo morre se for colocado em uma sala completamente estéril, onde não há germes, patógenos ou vermes, em poucas horas o corpo estará crivado de vermes parasitas que, em poucos dias, destruirão o corpo completamente, exceto pelo esqueleto. Todos aqueles vermes vieram de dentro do corpo, não de caminhar pela floresta. Enganamos a natureza de seu trabalho, levando um cadáver ao moluary e embalsamando-o com um veneno que o preserva e mata os vermes que, de outra forma, o tornariam em pó. A natureza fornece a decomposição do corpo de volta à natureza assim que ele morre e a natureza fornece parasitas (dos quais muitos são organismos realmente simbióticos) que ajudam o corpo a superar algumas condições extremamente ruins.

Nota: Algumas pessoas são da opinião de que existe um*conexão entre autismo, parasitas e vacinas. A suspeita de Ny é que as vacinas confundem os parasitas naturaise também criar um ambiente mais tóxico que o para-*

sites tentam limpar. Eles podem exagerar e se reproduzirduce a ponto de causar um problema no pemon eassim, contribui para os sintomas de autismo. Por desintoxicaçãoo corpo e reduzindo a população de parasitas, milhares de crianças com autismo apresentaram melhora significativa-mentos. Confira o livro de Kerri Rivera, Healing the Symp-toms conhecidos como autismo.(Consulte Links de interesse, página 319.)

Purificação de Água com MMS

MMS1 para purificação de água: Para tratar água pura e claraque você sente que deve ser purificado para matar patógenos de doenças,como água da torneira, sugiro adicionar 8 gotas de MMS1 (MMS ativado - use 50% o cítricoácidoou4% o HCl) por galãode água(ou 4 litros / 4quals).Contar30 segundos para que as gotas sejam ativadas e, em seguida, coloque a mistura em um galão de água. Misture bem, cubra e esperepelo menos uma hora antes do uso. Lembre-se de que o MMS1 não mata o cloro ou o flúor da água, mas matadoenças. Para quantidades menores de água, use menos gotas.Para 1 qual (ou litro), use 2 gotas de MMS1.

Água turva (turva) requer mais MMS1. Se você tem umum pouco de turbidez, use 12 gotas de MMS1 ativado porgalão. Uma quantidade maior de turbidez requer maiores quantidades de MMS. Use 12 a 24 gotas de MMS1 ou atémais gotas para a água do rio. Isso é algo que você vaitem que avaliar e fazer o seu melhor para acertar. Nesse caso, é sempre melhor errar do lado de muitoscai do que não o suficiente. Um gosto ligeiramente ruim resultante deo MMS1 (se você tiver que ir mais alto) não vai atrapalhar você.

MMS2 para purificação de água: a água pode ser purificadausando MMS2 tanto quanto MMS1. (Como MMS1, MMS2não mata o cloroou o flúor em

s e u á g u a m a s vai matar doenças.) Ambos MMS1 e MMS2 são usadosem todo o mundo para purificar a água na água pública

sistemas. Uma cápsula de tamanho # 1 (consulte a página 46 para o tamanho da cápsula) cheia 1/2 cheia de hipoclorito de cálcio (MMS2) pode serusado para purificarum galão de aparência normalClaroagua.Eu descobri que usar gelatina ou cápsulas vegetais é ummétodo muito conveniente de medir pequenas quantidades deMMS2 em pó. Não embale com força ou comprima oMMS2 na cápsula, mas encher vagamente a cápsula até 1/2.Abra a cápsula e despeje o pó da cápsula na água. Mexa bem até dissolver, cubra e espere doishoras antes de usar.

Água turva (turva) requer mais MMS2. Se você tiver um pouco de turbidez, use um # 1 completocápsula de tamanho de MMS2. No caso de mais turbidez, você pode usar até 2 cápsulas de MMS2 de tamanho normal # 1 para um galão de água. Use 1 a 3 cápsulas para a água do rio. Novamente, isso é algo que você terá que avaliar. Neste caso de purificação de água duvidosa, é sempre melhor errar devido a muito MMS2 em vez de insuficiente. Você pode alterar o sabor da água com 3 cápsulas, mas isso seria muito melhor do que ficar enjoado com a água. Três cápsulas de MMS2 em um galão de água não irão agradá-lo, mesmo que tenha um gosto pequenomau.

Cura animal: Meu cachorro tinha uma doença de pele grave que o deixou sem pêlo, apenas com a pele em carne viva. Tendo MMS no meu armário, decidi experimentar ... Dentro de duas semanas todo o cabelo dele cresceu e ele não tem coceira. Comecei a dar-lhe três gotas duas vezes por dia e

aumentei em uma, então ele está tomando quatro gotas pela segunda semana. Ele se recuperou totalmente com ótima saúde. Coloquei a mistura na carne dele e ele comeu tudo. Ficamos tão maravilhados que meu marido disse que se meu cachorro deixasse crescer o cabelo de novo, por que não faria meu cabelo crescer de novo? Então meu marido está cuidando disso agora. —Didi, Austrália

Capítulo 15

Animais

Protocolo para animais

Todos os protocolos deste livro podem ser aplicados à maioria dos animais (existem algumas variações para ruminantes, consulte a página 290), de cães e gatos a cavalos, hamsters e elefantes. Este capítulo sobre animais não pretende ser abrangente de forma alguma. O tempo e o espaço não permitem no momento da redação deste artigo. No entanto, gostaria de lhe dar algumas diretrizes e regras gerais para animais, que, se seguidas, permitirão que você lide com a maioria de suas doenças e problemas de saúde.

Conforme mencionado no Prefácio deste livro, aqueles de vocês que leram meus escritos anteriores sobre MMS podem notar algumas variações aqui do que publiquei no passado. Para os animais, assim como para os humanos, por meio do uso contínuo de MMS, aprendemos coisas novas. Tornou-se cada vez mais óbvio que os animais e os humanos reagem aos benefícios curativos do MMS de maneiras semelhantes.

Basicamente, todas as mesmas regrasaplicar para animais como com pessoas ao usar MMS. Ou seja, se o animal parecefique melhor com o que você está fazendo, mantenha-se atualizado com o quevocê está fazendo. Não mude nada. Se o animal parecer ficar mais doente com MMS, como diarréia ou vômito, reduza a dosagem pela metade, mas não pare. Se

você não ver resultados positivos de qualquer tipo dentro de três a quatro dias, você deve ir para

o próximo nível de protocolo. Com animais, sugiro menostempo de espera do que com pessoasantes de passar para o próximo nível do protocolo, porque normalmente os animais respondem (curam) mais rápido do que os humanos. Para a maioria dos amigos, você pode ajudar um animal com MMS da mesma forma que um humano. Se você leu e estudou cuidadosamente este livro, as mesmas regras e princípios se aplicam, com alguns pequenos ajustes.

¥ 'A dosagem oral de MMS é diferente para animais do quepara humanos e depende do seu peso.

¥ • Ruminantes (por exemplo, vacas, ovelhas, cabras, etc.) são diferentesdo que humanos, gatos, cães, etc., por terem um estômago de quatro componentes. Não tenho muita experiência pessoal com esses animais, embora o feedback que recebi daqueles fortemente envolvidos com ruminantes sugira o seguinte:

Essesanimais podem tomar doses orais de MMS1, desde que seja ativado com HCI (ácido clorídrico) e nãoÁcido Cítrico. O ácido cítrico é conhecido por causar problemaspara ruminantes. Portanto, se estiver usando doses orais de MMS1 para um ruminante, use 4º/ oHCI como ativador, ou administrar doses oraisdo CDS. Além disso, uma variação do CDS conhecida como CDI (Dióxido de Cloro Injetável) também foi usada com sucesso com esses animais. (Para obter mais informações sobre o CDI, consulte os livros de Andreas Kalcker.) Tanto a dosagem oral com MMS1 e CDS quanto as injeções com CDS foram bem-sucedidas. Aprenderemos mais com o passar do tempo, mas isso temtem trabalhado até agora.

Dosagem oral de MMS para um animal

Observação:*Todas as doses orais otNNS Para animais devem ser calculadas de acordo com o peso do animal. Veja os gráficos empáginas 300-301.*

Mal-estar geral / doença

Se o seu animal não estiver bem e não tiver sido diagnosticado com nenhuma doença palicular (ou seja, câncer, etc.), sugiro que você tente os Protocolos 6 e 6 primeiro.

Passo 1

0 Dê os Protocolos 6 e 6, mas certifique-se de que a quantidade de MMS está ajustada para o peso do animal, conforme tabela na página 301.

Passo 2

0 Se o animal está bem após você ter dado o Protocolo 6e 6 (Etapa 1 acima), o animal pode ir no dia a diadosagem de manutenção.

etapa 3

0 Se, no entanto, o animal melhorou um pouco, ou mesmo muito com um procedimento 6 e 6, mas não está totalmente bem ainda, siga a regra que diz que se as coisas estão melhorando não mude nada - continue fazendo o que está fazendo . Neste caso, no entanto, não continue com 6 gotas de doses a cada hora, mas após as primeiras 6 e 6, espere quatro horas e dê ao animal outras 6 e 6 doses (lembre-se, essas 2 doses são dadas uma hora apal e ajustadas para o peso do animal conforme o chal página 301).

0 Se o animal continuar a mostrar melhora, mas não estiver totalmente recuperado, dê 6 e 6 da manhã e 6e 6 da tarde, desde que o animal estejamelhorando, até bem. Por outro lado, se o

animal parou de melhorar com o tratamento 6 e 6, e estáainda doente, então é hora de persegui-lo no HRP informando com o Procedimento de Fixação e as doses de hora em hora.

Nota: As instruções acima são uma ligeira variação dos Protocolos 6 e 6 para humanos e passam para doses de hora em hora se duas doses de 6 gotas não trouxerem recuperação. Às vezes pode ser um grande esforço dar a um animal uma dose de hora em hora. *O mais importante é seguir os Três DouradosRegras, se você ver progressocontinuar fazendoo que está funcionando, e caso contrário, passe para o Plano de recuperação da saúde.*

Passo 4

0 No caso em que você dá a um animal 6 e 6 uma vez e eles não mostram nenhum sinal de melhora, vá direto para o procedimento de piquetagem seguido pelo protocolo1000 e continue com a SaúdePlano de recuperação, se necessário. Novamente, lembre-se de que todas as doses para o seu animal devem ser ajustadas de acordo com o peso, consulte os capítulos nas páginas 300-301.

Se o animal foi diagnosticado com um particularDoença

Passo 1

0 Se o seu animal já foi diagnosticado com uma doença específica, como pneumonia ou câncer ou qualquer outra doença, você precisará iniciar o procedimento de estaqueamento.

Passo 2

0 Depois de concluir o procedimento de piquetagem, vá para o Protocolo 1000 e progrida até o Protocolo 1000 Plus, 2000 e 3000 de acordo com o Plano de Recuperação de Saúde conforme descrito neste livro (consulte o Capítulo 5) e as Três Regras de Ouro para Animais (página 305).

Cálculo das doses e explicação das medidas para animais

O tamanho da dosagem deve ser sempre determinado pelo peso do animal. A seguir está um desafio para dosar animais. Leia este desafio com atenção, pois as diferentes quedas, mililitros e miligramas mudam no desafio. Esteja atento às mudanças. Siga as orientações abaixo:

Cup1 e Cup2: Você precisará preparar uma solução deMMS1 (MMS ativado) na água, a partir do qualvocê medirá uma quantidade de celain em gotas ou mililitros da solução para dar ao seu animal. Como afirmado acima, a dosagem para animais é determinada pelo peso doanimal. Cup1 é uma solução mais fraca de MMS1. É para pequenosanimais, porque precisam de uma quantidade muito pequena. Lá-pois a solução da qual você está tomando gotas precisa sermuito mais fraco do que para animais maiores. Cup2 é um mais fortesolução usada para animais maiores.

Medição para Cup1: Ativar 1 gota de MMS, contar 30 segundos e, em seguida, adicione 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. A partir desta solução você medirá gotas ou mililitros para dar ao seu animal, de acordo com os chals nas páginas300-301.

Medição para Cup2: Ative 8 gotas de MMS,conte 30 segundos e, em seguida, adicione 1/2 xícara (4 onças / 120 ml) de água. A partir desta solução, você medirá as quedas oumililitros para dar ao seu animal de acordo com os chals nas páginas300-301.

Nota: Use destilado, reveme osmose ou fervido*água para essas soluções. Mas lembre-se de que alguma água fervida contém flúor, cloro ou outras substâncias nocivas. Portanto, verifique sua fonte de água. Leia os rótulos e / ou verifique com o fabricante*para saber o que você está fazendo.

Protocolo para Lenda de Animais	
ml	mililitro
1000 ml	1 litro
mg	miligramas
kg	quilograma
libras	libras
Taça 1	1 gota de dose de MMS1 em 4 onças (120 ml) de água
Copa 2	Dose de 8 gotas de MMS1 em 4 onças (120 ml) de água
d-CI	cai da copa 1
d-C2	cai da copa 2
ml-Cl	ml de Cup1
ml-C2	ml de Cup2
MMS	Solução de clorito de sódio a 22,4%
MMS1	MMS ativado
d-MMS1	gotas de MMS1

ExplicaçãoAnimais de como usar os gráficos de dosagem para

Adicionando água à dose do animal: Nunca dê umanimal MMS1 (MMS ativado) sem adição de água.Cada animal é diferente e precisará de uma quantidade diferente de água para suas doses. Avalie seu animal com cuidado. Determine o que é uma bebida normal de água para aquele animal.(Em outras palavras, você deseja determinar o que équantidade normal de água que seu animal bebe em umtempo.) Adicione a quantidade de MMS1 que você determinou que éa quantidade certa para o seu animal (de acordo com o peso) de gotas de Cup1, Cup2 ou MMS1, para a quantidade de água que você determinou ser uma bebida normal de água para o animal, e faça com que o animal beba. Isso pode ser mais fácil dizer do que fazer no início. Eu usei uma pequena seringapara animais pequenos, ou uma seringa grande ou baster de

peru para animais maiores, para espremer uma dose na garganta do animal.Você pode conhecer um método melhor.

Peso marcado da coluna do animal: para usar a dosagemChat for Animals, (páginas 300-301), vá primeiro para a coluna marcada Peso do Animal. Passe o dedo pelocoluna para encontrar o peso do animal e, em seguida, vá até a coluna do protocolo que deseja. Abaixo está uma explicação completa das colunas 1 a 6 e qual o númerobers em cada coluna representa.

Coluna 1: Dosagem do procedimento inicial para animais. Tal como acontece com os humanos, sempre siga o procedimento de grampeamento para animais. Os três números nesta coluna representam o aumento gradual na dosagem. O primeiro número é a dose de fixação, o segundo número é a dose do meio e o terceiro número é a dose máxima que você daria a um animal para aquele peso palicular listado na coluna para o Procedimento de Esticamento.

Coluna 2: Protocolo de dosagem 1000 e 1000 Plus para animais. Ao fazer o Protocolo 1000 para pessoas, você aumenta gradualmente para a dose de 3 gotas; para animais, o equivalente a uma dose de 3 gotas é o terceiro algarismo dos três algarismos desta coluna (Coluna 2). O primeiro número é a dose declarada, o segundo número é a dose do meio e o terceiro número é a dose máxima que você daria a um animal para aquele peso palicular listado na coluna do Protocolo 1000.

XSempre acompanhe o procedimento de piquetagem e, em seguida, siga em frente para o Protocolo 1000, aumentando a dosagem lentamente para odose máxima para o protocolo 1000, mas não superior adose listada na Coluna 2 (Protocolo 1000) no teste para o peso do seu animal.

¥ • Se a qualquer momento você notar que seu animal está ficando mais doentevocê aumentou sua dose muito

rapidamente.Reduza a doseimediatamente em 50%. Quando a doença passa, gradualmentereconstruir até a dosagem desejada.

X seo animal não mostra sinais de melhora aler dois dias, vá para o Protocolo 1000 Plus. Isso significaadicione DMSO a cada dose oral. Continue usando as mesmas quantidades de dosagem para o Protocolo 1000 e adicione as seguintes quantidades de DMSO:

- Cup1 - adicione 3 gotas de DMSO.
- Cup2 - adicione 24 gotas de DMSO.
- Gotas de MMS1 - para cada 1 gota de MMS1, adicione 3 gotas de DMSO.

Observe que, depois de adicionar DMSO à mistura de MMS1 em Cup1 e Cup2, ele manterá a força total por apenas duas horas. Os "copos" com DMSO adicionado irãoprecisam ser renovados a cada três horas.

Coluna 3: Dosagem do Protocolo 2000 para animais. Embora o Protocolo 2000 para pessoas chame para receber MMS1 e MMS2,esta coluna é apenas para MMS1. Isso ocorre porque normalmentevocê não daria MMS2 a um animal. São rarosexceções a isso, no entanto, e incluí detalhes sobre como administrar MMS2 a animais na coluna 5. Eudados apenas dois números nesta coluna. Isso ocorre porque o princípio do Protocolo 2000 é que você se esforça para tomar comomuitas gotas de MMS1 que você puder por hora, mas sem ficar doente (neste caso, sem que seu animal fique doente).

Então, o primeiro númeroé a quantia que você começaria a darpara o seu animal. Isso pressupõe que você teve seu animal no Protocolo 1000 e trabalhou até o máximoEquivalente de dose de 3 gotas para o peso do seu animal que o Protocolo 1000 exige (de acordo com a coluna 2). Nesse ponto,você deve aumentar a dosagem conforme exigido no protocolo2000. Se você não trabalhou até a dose

equivalente de 3 gotas, pare de qualquer dosagem que você está usando e

comece a aumentar gradualmente as gotas da dose. O segundo número nesta coluna é a quantidade máxima de MMS1 que um animal provavelmente será capaz de ingerir de acordo com o peso do animal - nunca ultrapasse o segundo valor listado.

X Stat com o primeiro número dado nesta coluna e, em seguida, aumente a quantidade de MMS1 em pequenos incrementos após cada duas ou três doses, pois parece que o animal pode tomá-lo. Ou, se notar uma melhora, não altere a dose a partir desse ponto até que não haja mais melhora, então você pode aumentar lentamente, mas não ultrapasse o segundo número.

X Se a qualquer momento o seu animal tiver diarreia, vômitos ou outros sinais de aumento da doença, diminua a dosagem em 50%. A última quantidade que você deu sem que o animal ficasse doente é provavelmente a dosagem correta, então fique com essa quantidade.

X Lembre-se, neste protocolo continue dando DMSO junto com MMS1.

Coluna 4: dosagem de MMS2 para animais. MMS2 é difícil com animais e normalmente você não precisa usar MMS2,mas se o seu animal parece resistente a melhorar, você pode tentar. Nesse caso, esses são os valoresseu animal precisa a cada duas horas durante o protocolo2000 - o mesmo que os humanos. (Leia as instruções para pessoas sobre o Protocolo 2000 e adição de MMS2 nas páginas91-95.) As quantidades de MMS2 fornecidas na coluna 4 doAnimal Dosage Chat 2 (página 301), são as quantidades máximas a serem administradas. Elimine o animal com uma dosagem muito menor do que a fornecida no teste e, em seguida, trabalhepara o valor dado. Não dê mais do que issoquantidade 5 vezes ao dia, o que seria a cada duas horasem um período de 10 horas.

X Para cada mg de MMS2 na cápsula (se o seu animal engolir uma cápsula), dê 1 ml de água ao animal para engoli-la. Se o animal quiser beber mais água, deixe-o beber o quanto quiser.

X sevocê não pode fazer a cápsula descer pela garganta do seu animalvocê pode colocar o MMS2 (hipoclorito de cálcio) em sua água potável. Determine quanta água seu animal devebeba diariamente. (Isso é algo que você pode encontrar noInternet.) Pegue a quantidade total de água que seu animal temsupostopara beber em um dia, adicione 1/2 a 1 vezes a quantidade de MMS2 mg que seu animal deve tomar diariamente, conforme listadona coluna 6 - Manutenção diária (de acordo com o seupeso do animal) para a água de beber do animal.

¥ • SeVocê é serio,você precisará comprar um miligramaescala. eusugira a escala de miligramas potável de Gêmeos-20. Tem capacidade de pesar 1 miligrama até 20 gramas, o que é preciso o suficiente para a capacidade para animaispesando de uma libra a mais pesado do que um cavalo. Oo custo varia de $ 24,00 USD a $ 60,00 USD e eles podemser comprado na Internet e enviado para quase qualquer lugar do mundo. Nos EUA, você pode comprá-los na Walma1 ou online. Basta ir ao Google e inserir Gemini-20 PotableEscala em miligramas para várias empresas que vendem esteescala incrível. Se você não tem uma escala e não conseguеprimeiro, tenha em mente que uma cápsula de tamanho # 0 contém aproximadamente 300 mg de MMS2 que você pode dividir várias vezes para obter quantidades menores.

Coluna 5: Protocolo 6 e 6 dosagem para animais. Você pode achar esta coluna (protocolo) a mais indelicada e útil porque os Protocolos 6 e 6 irão superar a maioria dos problemas dos animais, junto

com o borrifador. Somentesiga as instruções sob o título GeralMal-estar / doença na página 291.

Coluna 6: Quantidades de dosagem de manutenção MMS1 paraanimais. Uma dose de manutenção diária de MMS1 pode manterseu animal está livre de toxinas, patógenos (microrganismos que causam doenças) e parasitas. Esta coluna indica oquantidade de MMS1 que seu animal deve ter para a alimentação diáriatenance, de acordo com o peso. Lembre-se, você deve misturar o MMS1 com água antes de dá-lo ao seu animal.

¥ 'Se você não tem dado MMS1 ao seu animal, e vocêdê uma dose de manutenção e ele adoece, é uma indicação de que há toxinas que precisam ser eliminadas. Neste caso, coloque o seu animal no Procedimento de Piquetagem, seguido pelo Protocolo 1000. Após completar o Protocolo 1000,continue com uma dose de manutenção diária.

Sombreamento do gráfico de dosagem do protocolo animal:

- A área branca do chal representa a Copa1.
- A área sombreada média representa Cup2.
- A área sombreada escura representa MMS1.

Gato - Herpes dos olhos: Meu gato tinha olhos crocantes todo o Gme. O veterinário prescrevia uma pomada para seus olhos quando ficava ruim, mas, além disso, ela disse que não havia nada que eles pudessem fazer. Era uma forma de herpes nos olhos do gato, provavelmente transmitido pela mãe gata. Eu tive que limpar seus olhos com um pano úmido todos os dias. Misturei uma gota de MMS ativado com água e esguichei em sua boca diariamente. Ela não gostou, mas também não vomitou. Em

duas semanas, seus olhos clarearam e permaneceram claros ... Estou feliz por ela não ter mais olhos ásperos e lacrimejantes! —Sunni, United Sutes

Dosagens de protocolo animal: Quadro 1			
	1	**2**	3
Peso do Animal	Procedimento de partida	Protocolo 1000	Protocolo 2000
1 - 2 libras (0,45 - 0,9 kg)	4,5—9—14d-C1	1.0—2.0—3.0 ml-C1	4,0—8,0 ml-CI
2 - 4 libras (0,9 - 1,8 kg)	9—18—27d-C1	2,0—3,0—4,0 ml-Cl	5,0—10 ml-Cl
4 - 6 libras (1,8 - 2,7 kg)	1,0-2,0-3,0 ml-Cl	3,0—4,0—5,0 ml-Cl	7,0—14,0 ml-Cl
6 - 8 libras (2,7 - 3,6 kg)	3,5—7—10,5d-C2	1.0—2.0—3.0 **ml-C2**	3,0-7,0 ml-C2
8 - 12 libras (3,6 - 5,5 kg)	4,5—9—13d-C2	1—2,5—3,5 ml-C2	3,5—7,5 ml-C2
12 - 16 libras (5,5 - 7,2 kg)	7—14—21d-C2	1,5—2,5—4,0 ml-C2	4,0—8,0 ml-C2
16 - 22 libras (7,2 - 10 kg)	9,5-19-28d-C2	1,5—25—3,0 **ml-C2**	3,0-10,0 ml-C2
22 - 30 libras (10 - 13,6 kg)	13-26-38 d-C2	2,0—3,5—4,5 ml-C2	4—11 ml-C2
30 - 40 libras (13,6 - 18 kg)	17—34—50d-C2	3,0—5,0—8,0 ml-C2	8,0-16 ml-C2
40 - 55 libras (18,1 - 25 kg)	23—45—65d-C2	4-7-11 ml-C2	11-18 ml-C2
55 - 75 libras (25 - 34 kg)	1,5—3,0—4,5 ml-C2	6.0-12-18 ml-C2	18-36 ml-C2
75 - 100 libras (34 - 45,4 kg)	2,0—4,0—6,0 ml-C2	8,0—16—24 ml-C2	30-50 ml-C2 **2.5–6 d-MMS1**
100 - 150 libras (45,4 - 68 kg)	3,5-7-10 ml-C2	14—28—42 ml-C2	
150 - 200 libras (68 - 91 kg)	4,5—9—13 ml-C2		
200 - 300 libras (91 - 136 kg)	7—14—21 ml-C2		
300 - 500 libras (136 - 227 kg)	22-11-33 ml C2		
500 - 1000 lbs (227 - 454 kg)	**1.5–3–4.5 d MMS1**	**6–12–18 d-MMS1**	**18–48 d-MMS1**
1000 - 1500 lbs (454 - 681 kg)	**2.5–5–7.5 d-MMS1**	**10–20–30 d-MMS1**	**30–80 d-MMS1**
1500 - 2300 lbs (681 - 1045 kg)	**3–7–10 d-MMS1**	**14–28–42 d-MMS1**	**42–112 d-MMS1**

Adicionando DMSO ao Protocolo 1000: Para cada gota de Cup1, adicione 1/2 gota de DMSO. Para cada gota de Cup2, adicione 1 gota de DMSO. Gota Foreach MMS1 adicionar 3 gotas de DMSO.

Dosagens de protocolo animal: Quadro 2			
	4	5	6
Peso do Animal	**MMS2 Dosagem Máxima**	**6 e 6**	**Manutenção diária MMS1**
1 - 2 libras (0,45 - 0,9 kg)	2 mg	.7 e .7 ml-C2	0,7 ml-C2
2 - 4 libras (0.9- 1,8 kg)	4 mg	1,5 e 1,5 ml-C2	1,5 ml-C2
4 - 6 libras (1.8- 2,7 kg)	12 mg	2,5 e 2,5 ml-C2	2,5 ml-C2
6 - 8 libras (2,7 - 3,6 kg)	16 mg	4.0 e 4.0 ml-C2	4,0 ml-C2
8 - 12 libras (3,6- 5,5 kg)	24 mg	5,5 e 5,5 ml-C2	5,5 ml-C2
12 - 16 libras (5,5 - 7,2 kg)	32 mg	8,5 e 8,5 ml-C2	8,5 ml-C2
16 - 22 libras (5,7 - 10 kg)	44 mg	12 e 12 ml-C2	12 ml-C2
22 - 30 libras (10 - 13,6 kg)	60 mg	18 e 18 ml-C2	18 ml-C2
30 - 40 libras (13,6 - 18 kg)	80 mg	21 e 21 ml-C2	21 ml-C2
40 - 55 libras (18,1 - 25 kg)	110 mg	2 e 2 d-MMS1	2 d-MMS1
55 - 75 libras (25 - 34 kg)	150 mg	3 e 3 d-MMS1	3 d-MMS1
75 - 100 libras (34 - 45,4 kg)	200 mg	4 e 4 d-MMS1	4 d-MMS1
100 - 150 libras (45,4 - 68 kg)	300 mg	6 e 6 d-MMS1	6 d-MMS1
150 - 200 libras (68 - 91 kg)	400 mg	7 e 7 d-MMS1	7 d-MMS1
200 - 300 libras (91 - 136 kg)	600 mg	12 e 12 d-MMS1	12 d-MMS1
300 - 500 libras (136 - 227 kg)	1 grama	18 e 18 d-MMS1	18 d-MMS1
500 - 1000 libras (227 - 454 kg)	2 gramas	36 e 36 d-MMS1	36 d-MMS1
1000 - 1500 libras (454 - 681 kg)	3 gramas	56 e 56 d-MMS1	56 d-MMS1
1500 - 2300 libras (681 - 1045 kg)	5 gramas	86 e 86 d-MMS1	86 d-MMS1

Medição: É útil ter em mãos um aparelho de 10 mililitrosseringa para animais menores, ou uma seringa maior de 50 mililitros para animais maiores, para medir mililitros (ml) paraseu animal. Isso geralmente pode ser comprado online, emuma loja de ração animal ou veterinário.

Água Potável para Animais

Normalmente,bebida de animala água deve ser mantidaa 1 ppm de dióxido de cloro. Isso seria 4 MMS1(MMS ativado) cai para cada galão de água limpa. (Algumas pessoas têm mais de um animal e usariam essa quantidade de água por dia, algumas pessoas podem ter apenas umanimal e precisa de menos água. Se precisar de menos água, calcule 1 gota de MMS1, por qual / litro de água.)

Para aqueles em áreas rurais ou em uma fazenda, a água ligeiramente turva precisará de mais MMS1 por galão, use 6 a 12 gotas para água ligeiramente turva por galão. Quanto mais turbidez, mais gotas são necessárias. Normalmente 4 gotas de MMS 1 porgalão é suficiente.

Se você está colocando MMS1 na água de bebida diária do seu animal, isso não é suficiente para servir como uma dose de manutenção de MMS1. Siga o desafio das dosagens de manutenção diária para o (s) seu (s) animal (es), colocando a dose na água ou administrando de outra forma.

Nota: sugiro o uso de água de vidro ou plástico de boa qualidade*tigelas para seus animais se estiverem usando NMS em suas bebidasagua. No outrolado, se você ativar MMS fimt em umrecipiente de vidro ou plástico tornando-o MMS1 e adicione água,então*aRer é a :: tivado e misturado com água, pode-se colocar em recipientes de metal que são usados frequentemente para animais. Fazer*não misture MMS não ativado (clorito de sódio) e ativaçãotordiretamente em uma tigela de*

metal ou copo de metal. Fimt a ‹:: tivateeadicione água em um copo de vidro ou plástico e coloque na tigela.

Informações adicionais importantes sobre como administrar certos protocolos para animais

Protocolo 3000 paraAnimais

O protocolo 3000 requer dois frascos de spray, o mesmo quecom humanos, um para MMS1 e um para DMSO. Para endurecer, lave a área do animal onde você vai aplicaro MMS1 e o DMSO. Na verdade, é simples; apenas pulverize umperna ou área com a quantidade de MMS1 necessária para fazero líquido chega à pele pelo cabelo. Em seguida, borrife DMSO em cima disso. Veja abaixo ideias sobre como usarum borrifador para animais. Não há problema em misturar os dois - MMS1e DMSO - no corpo, primeiro pulverizando um e depoisborrifando o outro em cima. Mas não misture MMS1 e DMSO no mesmo frasco de spray, pois eles irãoeventualmente cancelam um ao outro.

Olhos para Animais

Observe que alguns valores neste livro - como o uso de MMS1 nos olhos - foram atualizados desde que escrevi meu último livro. Para os olhos, sugiro agora o uso de uma dosagem muito mais fraca para os olhos dos animais (o mesmo protocolo que para os humanos). Consulte as páginas 136-139 para obter a explicação de fulher e para obter instruções sobre como misturar uma solução de MMS1 para os olhos.)

Boca e Dentes para Animais

Use as mesmas medidase processo para escovar os dentes do animal como para pessoas. Isso não apenas ajudará a manter a boca do seu animal fresca, mas aplicam-se os mesmos princípios que aplicam às pessoas. Lembre-se de que quase

todas as doenças são influenciadas até certo ponto, grandes ou pequenas, pela condição da boca. (Consulte as páginas 73-76.) É normal usar o frasco spray padrão (consulte as páginas 76-77) em boca do seu animal.

Problemas de pele para animais (frasco spray MMS)

O número de gotas que você coloca em um borrifador para um animal é o mesmo que para pessoas. No entanto, pulverizar um animal peludo pode ser complicado (para alguns animais mais do que para outros, dependendo do comprimento, espessura e quantidade de cabelo). Se você quiser que o líquido realmente alcance a pele, que é o objetivo, você pode fazer isso alisando o cabelo, borrife e use os dedos, se necessário, para dar tapinhas levemente e ajudar o líquido a chegar à pele. Em seguida, mova mais cerca de 1/2 polegada, aplique o cabelo novamente, borrife e assim por diante, até cobrir toda a área que precisa do spray.

Observação:*Você pode precisar depilar a área do problema, se necessário, a fim de aplicar o NNS adequadamente.*

Protocolos de Apoio e Adicionais para Animais

Para os animais, nem sempre é fácil, mas você pode usar quase todos os outros protocolos em animais, se precisar. O uso de protocolos MMS1 para olhos, ouvidos, nariz, problemas de pele (frasco de spray), adesivo e tudo, exceto as doses orais, deve ter a mesma dosagem para animais e pessoas de acordo com as instruções neste livro.

Nota: Cavalos e alguns outros*os animais não podem vomitar, por isso tome cuidado para não dar ao seu animal, especialmente umcasa, muito MME, porque deixar uma casa doente é mais perigoso do que deixar alguém doente que podevômito (porque o vômito é a maneira do corpo de se livrarde coisas indesejáveis, venenos, etc.). Porém, cavalosresponder a MMS rapidamente, geralmente mais rápido do quepessoas e eu vimos uma casa superar um*

resfriado usandoMMS1 em meia hora. Espere que a maioria dos animais respondarapidamente.

Três regras de ouro para animais

tá fazendo - enquanto você notar melhora, continue assim.

sagem que você está dando em 50%. Assim que a doença passar e o animal estiver be

próximo protocolo superior.

Cão - Crescimento e infecção da gengiva: Meu cachorro de 12 anos passou por uma cirurgia para remover um enorme crescimento gengival (epilis) que havia crescido demais em seu dente. Após a cirurgia, o local não estava cicatrizando no pós-operatório e parecia muito inflamado. Depois de um Gme, outro tumor estava se formando no mesmo local. Em vez de mandá-la de volta ao veterinário, decidi tentar o MMS. Apliquei o MMS em sua área afetada com uma escova de dentes Soñ por alguns dias e fiquei surpreso ao descobrir que não apenas a inflamação havia desaparecido, mas o novo tumor havia desaparecido completamente. Quando você olha na boca dela, não há

sinal de nada errado. Eu sou completamente normal. - Elizabeth

Para concluir

Para encerrar, lembre-se de que quase todas as doenças e problemas de saúde podem ser remediados com MMS seguindo oinstruções neste livro. Quero dizer mais uma vez queMMS não cura doenças. MMS mata patógenos e oxida venenos em qualquer lugar que possam estar, incluindo noágua do corpo. Uma vez que os patógenos são eliminados eos venenos são oxidados, através do processo normal de eliminação, o corpo lavaelesfora e então o corpoé capaz de curar e recuperar a saúde plena.

Se você seguir essas instruções, poderá recuperar a saúde em um período de tempo razoável. Nós encorajamos você a continuarue aprender mais sobre como usar o MMS. Insira as doses de manutenção do MMS em sua rotina diária, tente comer alimentos reais, naturais e inteiros, bem como incorporar outras práticas saudáveis em sua vida para que você possa alcançar e manter uma saúde ótima e prevenir doenças no futuro.

Por falar em práticas saudáveis, quero deixar vocês comtalvez duas das práticas saudáveis mais impolentes de todasTempo. Eles são - maneiras de fazer a coisa certa e ajudar uns aos outros. Ao longo dos tempos, esses dois conceitos foram expressos de maneiras variadas por quase todosgrupo étnico ou religião que você pode citar. Só isso já deve lhe dar uma pista - talvez haja mérito em viver por estespadrões. Infelizmente, no mundo de hoje, às vezes sãogrosseiramente esquecido. Mas eu encorajo você a adotar essespráticas como um companheiro integral do seu estilo de vida. Você pode descobrir que isso faz uma grande diferença na sua felicidade ena sua saúde e bem-estar. Se você sempre fizer o*coisa certa,*e ajudem uns aos outros, vocês colherão coisas positivasbenefícios.

Apêndice A

CDS, CDH Informações Básicas

Neste livro, optei por não entrar em detalhes sobre CDS (solução de dióxido de cloro) ou CDH (retenção de dióxido de cloro). Ambas são variações do MMS1, cada umaexigindo uma preparação diferente, embora todos os três sejamfeito com os mesmos dois ingredientes; MMS e um ácidoativador.

O principal objetivo deste livro é fornecer um sólidoFundação do Plano de Recuperação da Saúde usando MMS1e MMS2. Depois de entender os princípios nestelivro, você pode aplicá-los a CDS e CDH, ambos os quaispode ser usado com muitos protocolos MMS.

Estamos descobrindo coisas novas sobre MMS o tempo todo,e sobre CDS e CDH, que existem há menostempo do que MMS1. Eu ensinei sobre CDS em meu livro anterior, bem como sobre vídeos instrucionais no YouTube, e sobre CDS e CDH em seminários. Desde aquele tempo,no entanto, algumas das informaçõesmudou. (Portanto, alguns ensinamentos e vídeos anteriores estão desatualizados.) É umem progressoprocessar. Devido ao tempo e espaço, não é possívelpara cobrir adequada ou completamente CDS e CDH neste livro, e como mencionado acima, é impoluente entender os princípios gerais básicos do MMS e do Plano de Recuperação da Saúde primeiro. Mas para os interessados, por favor, vejaa seção CDS / CDH (que está sendo atualizada ao longo do tempo) em mmswiki.is para obter mais informações. Lembre-se, como acontece com o MMS1, sempre use as Três Regras de Ouro do MMS (consultepáginas 83-84) se você estiver usando CDS ou CDH.

Dito isso, aqui estão algumas informações sobre algumas das diferenças entre CDS, CDH e MMS1.

Ao longo dos anos, recebi muitos comentários de Ministros da Saúde de todo o mundo que estão muitoativa em ajudar outras pessoas a recuperar sua saúde, e dos próprios indivíduos, em relação às três formas de MMS(MMS1, CDS e CDH) e como eles têm trabalhado paraeles.

Eu quero fazer issoclaro que vimos todas as formas deO MMS ajuda as pessoas a recuperar a saúde. No entanto, existem diferenças significativas com cada um. Como MMS1 temjá foi coberto extensivamenteneste livro, abaixo está umbreve sinopse de CDS e CDH.

CDS

O CDS foi desenvolvido por um pecuarista com apoio direto e cooperação de Andreas Kalcker. (Foi inicialmente desenvolvido para uso em animais.) CDS é dióxido de cloro gasoso em água destilada e não contém clorito de sódio ou ativador. Deve ser feito com antecedência por meio de um dos vários processos de destilação e, de preferência, armazenado na geladeira. Uma mistura pré-preparada pode ser conveniente. Dependendo de como o CDS é tratado, pode durar várias semanas ou até mais.

Embora o CDS seja relativamente fácil de fazer, existem muitas variáveis que podem ter um efeito positivo no produto final. Coisas como temperatura, clima, altitude, umidade, pressão do ar e que tipo de equipamento é usado podem fazer uma grande diferença no CDS resultante. Por exemplo, se houver muito ar na garrafa ou no frasco em que está armazenado, ele pode perder potência. Cada vez que você abre a garrafa, ocorre uma liberação de gases que diminuirá a potência, e assim por diante. Aprender as técnicas de como fazer e manusear CDS não é tão difícil se alguém se dedicar a fazê-lo - mas deve-se prestar muita atenção aos detalhes.

O CDS está totalmente ativado - não há clorito de sódio residual? na solução, que é considerada por alguns como umvantagem. Pode ser mais suave para o estômago e muitos consideram ter pouco sabor em comparação com o MMS1. Em doses baixas, isso é verdade. No entanto, para recuperar a saúde do seri-doença, geralmente é necessário tomar alto níveldoses de CDS.Quando isso acontece, gosto e / ou queima na garganta pode entrar na equação, e às vezesuma reação Herxheimer.

O CDS pode ser útil para pessoas sensíveis, que por uma razão ou outra não toleram o MMS1. Vimos que, para algumas pessoas, declarar no CDS pode ser benéfico para ajudar alguém a se acostumar a tomar MMS1. O procedimento de piquetagem com MMS1 eliminou a necessidade disso na maioria dos casos. As observações acima mencionadas referem-se à ingestão interna de CDS. Algumas pessoas acham que o CDS funciona melhor no tratamento de doenças externas e muitas tiveram sucesso com isso.

A principal observação impolente de que eu e outrosusuários extensivos de CDS (que trabalharam perto de mim)percebi, é algo que chamo de*platô phe-nomena.*Aqueles que trabalham com crianças autistas usaram o CDS exclusivamente por um ano. No começo foi fácil ver oas crianças estavam melhorando,mas à medida que o tempo passava e as crianças continuavam a tomar CDS, a maioria parecia atingir um patamar em que não estavam melhorando. Eles pararam. Mas quando essas mesmas crianças foram colocadasde volta ao uso do MMS1, eles novamente tentaram melhorar.

Saúde DiversosMinistros e outros, ao usar CDS para uma variedade de doenças, incluindo câncer, também repeliram esse fenômeno. Parece que chega um ponto em que o indivíduo chega a

um impasse (isso nem sempre acontece, mas costuma acontecer), mas quando colocado no MMS1, ele começa a melhorar novamente. Então, se você usa CDS, meu conselho seria

estar ciente dos fenômenos do platô e se acontece comvocê, mude para MMS1.

Uma palavra fulher sobre CDS: Houve diferenças de opinião ao longo dos anos em relação às quantidades de dosagem de CDS e o equivalente de CDS a MMS1 para uso em nossoprotocolos. Emno passado, publicamos uma proporção de 1 mlde CDS a 3000 ppm é igual a uma dose de 3 gotas de MMS1. Cheguei a acreditar que esta é uma dosagem muito baixa para CDS. Noao mesmo tempo, passei a perceber, por vários motivos muito detalhados para explicar aqui, que um*exato*equiv-alento entre CDS e MMS1 não é possível determinarminha.

Isso se deve às razões mencionadas acima, pois a preparação e o manuseio do CDS incluem muitas variáveis. Por exemplo, você pode endurecer com uma solução de CDS de 3000 ppm, mas em algumas semanas, devido à liberação de gases toda vez que a garrafa é aberta e outros fatores, sua solução pode ficar cada vez mais fraca. Outra razão pela qual os equivalentes exatos são difíceis de determinar é a quantidade de ácido estomacal de uma pessoa. Equivalentes podem talvez ser determinados com base em testes com ácido estomacal “normal” simulado. Existem, no entanto, muitas coisas a serem consideradas, sendo uma delas se o indivíduo realmente tem ácido estomacal “normal” (a maioria das pessoas com saúde debilitada e que precisam de recuperação não tem ácido estomacal normal). Como eu disse repetidamente ao longo deste livro, se alguém seguir as Três Regras de Ouro do MMS,

Provavelmente, a razão mais impolente pela qual não podemos igualarquantidades de MMS1 e CDS é que depois de passaro estômago, MMS1 ainda tem cerca de 50% não ativadoclorito de sódio que passa para o sistema humano. Porque o clorito de sódio foi

consumido por mais de 80anos por centenas de milhares de pessoas, muitas das quais

juro por isso, devemos assumir que o clorito de sódio não ativado deve ter algum benefício para o sistema, além dissoaodióxido de cloro. (Mais sobre isso abaixo.) Como o CDS não tem clorito de sódio, não há como comparar um ao outro.

CDH

O CDH foi desenvolvido por Scott McRae e Charlotte Lackney. O CDH também é “pré-fabricado” e muito mais fácil de fazer do que o CDS. Também deve ser refrigerado. Na geladeira, dura algumas semanas a um mês, dependendo da receita usada. O CDH, como o MMS1, não é totalmente ativado, deixando um pouco de clorito de sódio livre para continuar através do estômago e entrar no sistema. Não tive muita experiência com o CDH, portanto, não posso dizer para usá-lo ou não. Recebemos repols que produziubons resultados para alguns usuários.

Minha conclusão pessoal sobre MMS1, CDS e CDH

Como afirmado acima, o CDS é completamente ativado e não contém clorito de sódio residual na solução. O CDH e o MMS1 contêm algum clorito de sódio livre que passa pelo estômago e chega ao sistema. Agora, embora algumas pessoas acreditem que a vantagem do CDS é que ele não contém clorito de sódio não ativado, eu tenho uma opinião diferente. Eu acredito exatamente o contrário.

O clorito de sódio não ativado sozinho também destrói os venenose mata patógenos. Istofoi vendido em lojas de alimentos naturaisnos Estados Unidos há 80 anos e muitos milhares de pessoas obtiveram bons resultados ao tomá-lo. Existem aqueles que agora o usam sem ativação prévia porque acreditam que o ácido do estômago é o que o ativa eeles obtêm uma quantidade de celain de bons resultados.

Quando descobri o MMS, era o MMS (clo de sódiorito) sozinho que curou os primeiros homens na selva demalária. Enquanto viajava pela selva ajudando muitosmais pessoas recuperam a saúde (principalmente da maláriae febre tifóide), era apenas o clorito de sódio queajudou. Mas a taxa de sucesso foi de cerca de 60%. Através de muita experimentação, não foi até que desenvolvi ofórmula fulher e staled ativando MMS que oa taxa de sucesso para a malária acabou sendo de cerca de 98%, ecerca de 92-94% para outras doenças.

É minha opinião, inativadoclorito de sódio penetramais profundamente nos tecidos docorpo do que mesmo MMS1,de acordo com os dados que obtive de patentesemitido no século passado. O clorito de sódio não ativado penetranos tecidos de uma maneira diferente do MMS1 e, portanto,os dois juntos parecem ser mais eletivos do que qualquer umum sozinho. É muito óbvio para muitos de nós que o MMS1 (dióxido de cloro) junto com o unactivat-clorito de sódio ed é o que obtém a melhor recuperaçãoresultados. Esta é uma evidência anedótica, mas com muitosmilhares de pessoas se recuperaram, até mesmo os cientistas precisamadmitir que serve como evidência legítima.

Mais um ponto a ter em mente é que os fornecedores de CDS e CDH, infelizmente, às vezes fornecem informações imprecisas sobre como usá-los. Se você usa CDS e CDH, visite nosso site mmswiki.is para obter as informações mais recentes.

Em conclusão, quero dizer que o MMS em todas as formas continuaàs vezes é um mistério. O importante éencontre o que funciona melhor para você. Lembre-se de sempre usaras Três Regras de Ouro do MMS (páginas83-84). Se estiver usandoCDS ou CDH, e você não está vendo os resultados desejados,estude

cuidadosamente o Capítulo 8 deste livro e / ou consideremudando para MMS1.

Apêndice B

Igreja Genesis II de Saúde e cura

A Igreja de Saúde e Cura Genesis II foi formada para servir à humanidade. Até onde sabemos, a Igreja de Gênesis II é a primeira igreja já estabelecida com este propósito. A Igreja agora tem (em 31 de outubro de 2016) mais de 1.700 Ministros da Saúde treinados em mais de 120 países. Multidõesd e v i d a s f o r a m s a l v o a t é o m o m e n t o , e o s u p r i m e n t o d e m i l h õ e s f o i i n t e r r o m p i d o o u Adveled.

A palavra gênesis no nome da Igreja significa o início. O número II significa produzir um(novo) segundo começo - é a intenção da Igrejapara ajudar a fazer um mundo melhor. As palavras saúde ecura significa que a Igreja está trabalhando para*trazendo saúde para o mundo.*A palavra igreja indica um grupo de pessoas com as mesmas crenças e propósito*concernente a servir a humanidade.*

O propósito da Igreja é ajudar as pessoas a ficarsaudáveis e, se não forem, ofereça informações que possam usar para si e para suas famílias, se assim escolherem, para ficarem saudáveis.

OA Igreja de Saúde e Cura Genesis II é uma Igreja não denominacional e acolhe pessoas de todas as esferas da vida, religiões e sistemas de crenças de todas as outras religiões não violentas de Ealh. A Igreja não exige que ninguém mude suas crenças e práticas espirituais, mas todos os membros estão unidos no objetivo comum e no desejo de ajudar a humanidade. O único pré-requisito para se tornar

ser um membro da Igreja de Saúde e Cura Genesis II está sendo apoiado pelas seguintes crenças:

- Fazendo boas ações
- Boa saúde para toda a humanidade
- Fazendo o que é certo
- Liberdade para toda a humanidade
- Iluminando outras pessoas com a verdade
- Ajudando uns aos outros
- Vivendo com integridade

Qualquer um que apoie essas crenças é bem-vindo para se tornarum membro da Igreja.

apêndice C

Dieta ácido-alcalina

Muitos hoje promovem uma dieta alcalina. OO conceito básico é que todas as doenças vivem em ambientes ácidos e morrerão quando estiverem em um ambiente alcalino. Assim, a ideia é que ao tornar seu corpo alcalino, você pode matar qualquer doença que tenha presente em seu corpo e viver uma vida saudávelvida. Apenas o oposto é verdadeiro. Esta teoria carecefatos científicos por trás disso. A premissa básica mais impolanteise é totalmente falso e pode ser verificado por qualquer pessoa que queirapara abrir os olhos.

Exceto pelo sistema digestivo, todo o corpo humano éalcalino. Quase todas as doenças humanas existem nas áreas alcalinas do corpo, exceto no sistema digestivo. A maioria das doenças humanas, exceto algumas raras no sistema digestivo, são alcalinas, não ácidas. Verifique as referências listadas abaixo.

Alcalinidade e acidez em todo o corpo humano não sãocriado pelo nível de pH dos alimentos que se ingere. O corpo usa a química para ajustar o nível de pH. A acidez descrevea quantidade de íons de hidrogênio em qualquer solução do corpo,e alcalinidade descreve a quantidade de hidrogênio-oxigênioíons em qualquer solução do corpo. O corpo tem a capacidade total de ajustar o nível de íons hidrogênio (acidez), ou o nível de íons hidrogênio-oxigênio (alcalinidade), em qualquer lugar emo corpo que é necessário para se ajustar. A comida que você come ou a água que você bebe não tem efeito nesses níveis, ou seja,até que você os exagere a ponto de ficar doente.

Provavelmente, existem mais de 100 sites que promovem a dieta alcalina. Muitos deles vendem água alcalina. Seu corpo deve manter uma condição alcalina baixa em todos os lugares

exceto o sistema digestivo. Cada órgão do corpo tem um nível alcalino diferente para que o corpo funcione adequadamente. Seu sangue é mantido em pH 7,41 para aleries e pH 7,3 para veias. Isso é alcalino, não ácido, e não pode ser alterado. Em nenhum lugar do corpo você pode alterar esses níveis exatos de pH ou alcalino. Beber água alcalina de pH 9,5 apenas faz o corpo trabalhar mais para se livrar da alcalinidade extra, o que o corpo faz naturalmente. Quando sua urina se torna alcalina, isso significa meramente que o corpo está carregando a alcalinidade de que não precisa. Isso nãosignifica que você está saudável.

Os sites da teoria da dieta alcalina dizem que você deve comer frutas e vegetais que formam alcalinos, mas quase todas as frutase os vegetais são ácidos. Quando você coloca frutas e vegetais ácidos em seu estômago, o estômago aumenta a acidez adicionando ácido clorídrico, mas quando essas frutas e vegetais vão do estômago para o intestino, ocorpo libera uma enzima que os torna todos alcalinos. Nada escapa a esta função do corpo. Sem alcalinoalimentos ou água alcalina podem mudar isso.

Aqui está uma lista feita pelo FDA de mais de 200 vegetais, frutas, carnes e outros alimentos - mostrando que todos esses alimentos são ácidos. Lembre-se de que qualquer valor abaixo de 7 pH é ácido e acima de 7 pH é alcalino. Confira:

http://www.Fda.gov/Food/FoodborneIIInessContaminants / CausesONIInessBadBugBook / ucm122E61.htym

Não posso desmascarar todos os vários tratamentos de câncer que não funcionam, nem listar todos aqueles que funcionam. Mas menciono a teoria alcalina aqui, pois milhares de pessoas estão obtendo dados errados de dezenas, talvez até 100 sites.

Os links abaixo são sites que contam fatos que você pode verificar, contando a verdade sobre a teoria ácido-alcalina das doenças.

O pH do sangue. Na internet acesse o Google ou qualquer mecanismo de busca e coloque na busca “pH de sangue”. Você receberá muitas respostas, mas todas serão iguais.

https://sciencebasedpharmacy.wordpress.com/2009/11/13 / your-urine-is-not-a-window-to-your-body-ph-balancing-a-failed -otype /
Esta é uma explicação completa de porque você não pode mudaro pH do seu corpo.Cada área de pH está solidamente no lugar enão equilibra contra outros pH do corpo. Muito bemexplicação.

http://www.chemistry.wustl.edu/-edudev/LabTutorials / Buffer / Buffer.html
Experimento Equilibra Ácido-Base, por Rachel Casiday eRegina Frey, Depalmentof Chemistry, Washington University St. Louis, MO 63130.

http://wikipedia.org/wiki/blood
Sangue - Wikipedia, a enciclopédia gratuita.

http://curezone.com/forums/fm.asp?i=840037Sistema digestivo e nível de pH. Este artigo está bem documentado, dando 24 trabalhos de pesquisa mostrando o nível de pH dotodo o sistema digestivo e mostra que o estômago é altamente ácido e o intestino delgado é alcalino.

http://en.wikipedia.org/wiki/PH
O pH dos fluidos corporais e dos órgãos é rigidamente regulado em um processo denominado homeostase ácido-base. Você não pode alterar o pH do corpo.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1627797A l k a l i n e p H Homeostase inBacteria: New Intuições.Mostra que bactérias patogênicas (doençacausando) sobrevive em ambiente alcalino.

http://textbookofbacteriology.net/
nutgro_4.htmlObserve que os neutrófilos são difíceis de encontrar porque oortografia apenas adiciona um "e" no finalda palavra neutro-phil, mas este é o link para um dos muitos sites que explicam neutropiles como micróbios causadores de doenças. Existem
210 neutroppilesque são doenças que causam viver em um
pH alcalino.

http://en.wikipedia.org/wiki/
AlkalinedietaMais teoria ácido-alcalina.

http://www.clinchem.org/content/41/10/1522.full.pdf
Composição do fluido intersticial. Regulação do pH para 7,3 para
7,4

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive / 2010/09/11 / alkaline-water-interview.aspxA1ícle: Água Alcalina: Se você se apaixonarEste "Water Fad"Você poderia causar alguns danos graves.

Links de interesse

Este livro é a informação oficial mais recente de Jim Humblesobre o MMS em outubro de 2016.

Existem sites que vão além do que apresentamos neste livro. Poderíamos listá-los aqui, mas com o passar do tempo,os links mudarão. Novos sites surgirão que deveriam terjá estive aqui. Considerando a natureza dinâmica da Internet,colocar uma lista estagnada de sites neste livro seria rapidamentedesatualizado.

Portanto, decidimos fornecer a você um link que terásites que você pode desejarVerificação de saída. Acesse aqui

também uma lista completa de links para mídias sociais, boletins informativos, depoimentos e mais informações de Jim Humble:

http://www.mmswiki.is/index.php/Links_of_Interest

Faremos o possível para manter essa lista atualizada.

Para maiores informações:

http://
www.mmswiki.ishttp://
www.jimhumble.is

Contato:healthrecovery@jimhu

mble.is3imHumble

Books:http://www.jhbooks.org

MMSSuppliers Ao redor do mundo:

http://www.waterpurificationsuppliers.is

Faaga crônica: Itirei MMS por cerca de duas semanas e meia e devo dizer que estou muito intrigado. Eu lidei com febre crônica por muitos anos e tentei muitas coisas diferentes, mas eu senti que teria certeza de ter alguns eleitos positivos muito rapidamente. Eu estava com o nariz entupido para os caras e, alguns dias depois de sujar as gotas, meu nariz estava limpo e eu senti que tinha mais energia. Minha concentraçãoGon também melhorou significativamente. No geral, estou me sentindo muito melhor do que antes ... Muito obrigado por tomar o Gme para fornecer material para os perdedores que precisam de alguma aula eletiva para ajudá-los com seus problemas de saúde. —Rchie

PulmãoCâncer: Eutenho meu próprio tesouroparaIeYeatmentde câncer de pulmão. Tenho o meu próprio diagnóstico médico "Inter DiaCor". Com problemaswitsweaGng tosse seca, febre, nervosismo, dor intensaem Ie meio das costas, difícil desono e dor ao deitarIeleñ lado, decidi fazer uma análise completa do organismo. Encontrei uma grande contaminação de bactérias e vírus em cada pulmão, mas principalmente emIeleN Também encontrou uma troca gasosa alveolar fraca e pequena. Resolvi usar o protocolo MMS 1000. Análise ConYol: Trabalhei 15 dias eIe o resultado foi 50% menos microorganismo, ainda con Gnuei com MMS. Fiz a análise há 30 dias e o resultado foi 100% pulmão limpo. Continuei a beber MMS por 20 dias devido a parasitas emIe cerebralconex, o cérebro, e no final fui capaz de reparar todos os problemas em 52 dias. Inicialmente, a carga viral era de 86,1% e finalmente 4,6%. Tenho todas as

imagens de tais evidências. Eu tenho pessoas mais
velhaswitbone pode- ce,toxemiagrave,depressãosemelhantesOsucessoparadesvio
em30dassoéruyamazing!—BTCroaCa

MMS ajudou minha infecção de herpes / vaginose / levedura: Ifoi diagnosticadowitHerpes cerca de quatro meses atrás e lat foi provavelmente a notícia mais difícil de ouvir ... Eu sabia que meu pai estava usando MMS por motivos de saúde anteriores, mas não tinha ideia do que era incrívelcoisas latMMS poderia ajudar seu corpo a lutar. Meu pai comprou-me o livro e alguns frascos de MMS para me deixar arrebatado. Estou feliz e orgulhoso de dizer que fiz um exame de sangue dois meses depois e o testei deu negativo. Eu não nkei por dois meses, eu seguiIe protocolo, mas demorei cerca de dois meses para ter coragem de ver se o que eu tinha feito funcionou. Estou impressionado com MMS eIe questõesque ajuda seu corpo. Quando estava lidando com herpes, também tive vaginose bacteriana e uma infecção por fungos, que desapareceram. —Gage, United Sutes

AlzheimerI d o : e u estou familiarizado com o Alzheimer, por isso, quando os sintomas ocorriam, eles eram familiares para mim. Eu percebi que não estava lidando com a situação socialmente, e estava classificando para ter muitas lacunas na minha memória (e, portanto, desengorduramento). Porque eu tinha ouvido falar do MMS sendo usado para curar demenGa, decidi que não tinha nada a perder. Eu segui o protocolo por um mês, aumentando lentamente até a dose completa de 3 gotas a cada hora por 8 horas, e aplicando o regime de wille, por todo o período, (é importante observar o último se isto é d o s e e s t á f a z e n d o v o c ê s e n t i r indisposto, corte emOu seja, doses por dia emantenha-o baixo por 2 dias e com o tempo para aumentar para o nível que você pode tolerar, mas não pare todos os togeler). Ao

final do tratamento de Byle, notei uma mudança notável em meu cogniGon e, à medida que o Gme prossegue, meu estado continua a melhorar. Sinto-me uma nova pessoa, estou novamente social, feliz e ansioso por cada novo dia. —Sam

Infecção Sinusal: ITêm tido uma condição sinusal há anos. Meus seios da face sempre estavam bloqueados, principalmente emIe manhã. Eu também fiquei com sangue no Gssues quando assoei meu nariz para aliviarIe bloqueios. Inicialmente, eu estava usando MMS porque estava sempre com fome e por causa do peso do latover.Iedark depois de ler histórias de sucesso de povos mais antigos. O resultado da minha tomada de MMS foilat minha fome consistente foi embora e para minha surpresaIe a condição do seio também foi embora. Há tanto tempo que estou com sinusite que parecia normal. Em retrospectiva, acredito que bo1 foram causados por candida. —Chris, United Sntes

Stage4Câncer: Em março, um homem de 80 anos foi diagnosticado com câncer 4 de abril. Eu assisti à consulta médica e fui informado que ele tinha apenas dois filhos de graça para viver. Eu disse, ou seja, cara, que poderia ajudá-lo e resmungueiIe Protocolo MMS1 para câncer 4. Após duas semanas fazendo uso do MMS1, ele se sentiu muito melhor e começou a ganhar peso novamente. Ele também sugeriu ganhar ao MMS2 quatro Gmes por dia. Hoje, 30 de abril, ele se sente mais bonito do que nunca e ganhou mais de 4,5 quilos de peso! Ele já deveria estar morto, mas sem desvios para MMS1 e MMS2. —Robert

HepaGas C: Dois anos atrás, fui diagnosticado com Hep C. Usei o MMS por pouco mais de um mês e minhas leituras agora estão boas. Como um benefício adicional,

meus pulmões ficaram limpos, vários condíGons da pele e vírus adicionais desapareceram, a pele marrom ficou branca e o cabelo branco ficou castanho. Deus te abençoe, Jim. —JM, Estados Unidos

Arthrids in Wrist Gone: Itenhoconhecido de MMS há anos, mas não Ie protocolo para câncer. Eu achei que usar o protocolo de câncer para um tumor maligno de mama de 2 anos de idade, este ano, sem sabersobre Ieprotocolopara artriGs. Para minha surpresa, ou seja,As artrizes em meu pulso esquerdo e mão desapareceram.Entrei no site e, vejam só, os antigos também o usavam com sucesso para artriGs. Uma das dicas que gostaria de fazer aqui é que não fui influenciado de forma alguma pelos relatórios anteriores. A dor dos artríGs pode não ser fatal, mas diminui o prazer da vida. Obrigado Jim Humble. —Judil E., Estados Unidos

Doença de Crohn: Eu tive Crohn por quatro anos. Tomei MMS por uma semana e meus sintomas diminuíram. Eu parei de usar meu remédio para ver o que aconteceria.Tenho estado bem desde então. —RW., Estados Unidos

Candida sistêmica: Por anos eu tenhotive um problema com a sensação de enjôo e mais vigorosoexercício.Tem piorado progressivamente em relação ao Gme. Suspeitei de Candida sistêmica, mas nunca fui diagnosticada. Tentei o protocolo 1000 e adicionei DMSO. Três semanas depois, eu estava pronto para testar a eficácia deste

Peatment. Tenho me exercitado muito nas últimas duas semanas, sagacidadeintervalos apropriados, e me sinto ótimo! Não tive nenhuma indicação de meus problemas anteriores. A propósito, tenho 72 anos, mas agora me sinto como se tivesse 20 anos. MMS realmente funcionou para mim. —Richard

NOTAS

Sobre o autor

Jim Humble começou seu trabalho na área de saúde aos 20 anos, quando se tornou gerente de uma loja de alimentos naturais em Los Angeles, Califórnia. Ele escreveu um "Teste de Avaliação Nutricional" de 200 perguntas que determinou as vitaminas, minerais, proteínas e gorduras em que o corpo de uma pessoa pode ser deficiente. O teste foi posteriormente computadorizado e foi considerado por muitos como oa maioriaexatométodo do determinar deficiências conhecidasno

A Hora. Ao longo dos anos, Jim tem manteve seu interesse em saúde alternativa,e trabalhou com inúmeras modalidades de cura, incluindo curar seu próprio pescoço quebrado em tempo recorde usando ímãs. Ele é autor de muitos livros de sucesso e seus desenvolvimentos atuais são descritos neste manual de instruções.

Jim começou sua carreira na indústria aeroespacial, onde rapidamente se tornou um engenheiro de pesquisa. Ele trabalhou no primeiro míssil intercontinental, escreveu manuais de instruções para os primeiros computadores de tubo de vácuo, trabalhou em eletrônica de controle de rádio secreta,e dezenas de outros projetos eletrônicos de última geração na Hughes Aircraft Company, Northrop Aircraft, General Motors Research Defense Laboratories e outros.

Após 20 anos na indústria aeroespacial, Jim foi para a mineração de ouro, onde desenvolveu métodos de recuperação de ouro que substituem o uso de mercúrio para ajudar a superar problemas de saúde para pequenos mineradores. Ele escreveu 5 livros sobre o assunto de recuperação de ouro de seus minérios. Em 1996, durante a prospecção de ouro na América do Sul, ele descobriu o que veio a ser conhecido como MMS, uma fórmula simples para a saúdequ e erradicamalária. Nos anos que se seguiram, ele trabalhou para melhorar ainda mais a fórmula. Eventualmente, um grupo missionário o convidou para a África, onde ele ajudou com sucesso mais de 5.000 casos de malária e vítimas de outras doenças a se recuperaremsaúde deles. Desde aquela época, centenasde milhares de pessoas usaram o MMS

para recuperar a saúde de uma ampla gama de doenças.

Para maiores informações:
www.mmswiki.is
WWW-J!
"Mhumble.is

Contato:*healthrecovery@jimhumble.is*

3

Tive vários problemas de saúde e todos eles estão finalmente resolvendo devido ao MMS. Tive uma úlcera na perna de 27 anos que tinha vários centímetros de comprimento e agora desapareceu. Demorou 1 mês para limpar. Meus seios da face finalmente estão limpos, então eu não tusso mais até vomitar. Minha artrite está MUITO melhor. O fungo em meus pés sumiu. Minhas gengivas não doem mais. Minha visão está realmente melhorando para que eu possa dirigir novamente. Este produto é incrível. Até a neuropatia em meus pés é menos dolorosa. Eu estava tomando 22 comprimidos, 3 vezes ao dia, para todos os meus problemas de saúde. Agora só tomo suplementos. Deus te abençoe Jim Humble! —Joshua J.

MMS tem sido o tratamento mais eficaz para a doença de Lyme. Quase 6 anos de sintomas agonizantes após inúmeras picadas de carrapatos, milhares de dólares em médicos e remédios naturais e agora este pequeno frasco de MMS que me custou cerca de 12 e durou 3 meses, deu um grande alívio aos sintomas da doença de Lyme. —Dianne E., Austrália

Curou 3 cães (todos terminais), primeiro teve linfoma, estava a horas de morrer, 1 gota de MMS a reviveu (um milagre). O segundo cachorro tinha câncer de pulmão e a curou. O terceiro cão teve insuficiência hepática, curou-a. Também recomendou MMS a um amigo com fibromialgia, ele era deficiente; não mais ... ele agora está melhor e saudável. Graças a Deus pelo MMS. —RB

Tenho tomado MMS1 e 2 para tratar meu câncer de ovário em estágio 3. Tem sido maravilhoso. Recentemente, meus exames de sangue revelaram que meus marcadores tumorais estavam agora na faixa normal, então comecei a tomar uma dose de manutenção. —Vanessa

Os benefícios do MMS são incríveis. Disseram-me que eu tinha câncer de próstata ... depois de apenas 6 semanas de MMS, minha leitura de PSA caiu e meu médico ficou surpreso com a melhora. - KGW, Espanha

Uso o MMS há cerca de 7 anos. Tenho quase 77 anos e gozo de boa saúde. Graças ao MMS, não fiquei doente por mais de 1 dia nos últimos 7 anos, pois ao primeiro sinal de doença de qualquer tipo que tomo o MMS. Acho que Jim Humble merece um Prêmio Humanitário por seu trabalho altruísta com o MMS. —Len B., Canadá

Para mais depoimentos:
www.mmstestimonials.is

Para maiores informações:*www.mms wiki.iswww.jimhumble.is*

Contato:
healthrecovery@jimhumble.is

82 2. 5 0
IS BN 9 78 -0 -9 908 94 5 -2 -0
5 2 2 5 0>
9 780990 894520